

John Adams Library,




IN THE CUSTODY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF N^o.

★ *Adams*

134.20







ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS

APHORISMI.

*OUVRAGES de M. LORRY , qui se
trouvent chez le même Libraire.*

- Tractatus de morbis cutaneis , in-4°. 14 liv.
De melancholiâ & morbis melancholicis ,
2 vol. in-8°. 10 liv.
Essai sur les alimens , pour servir de com-
mentaires aux livres diététiques d'Hippo-
crate , nouvelle édition , 2 vol. in-12. 6 l.
Essai sur la conformité de la médecine an-
cienne & moderne dans le traitement des
maladies aiguës , traduit de l'anglois de
Barker , in-12. 3 liv.
Sanctorii de medicina statica aphorismi , com-
mentaria notasque addidit A. C. Lorry ,
in-12. 3 liv.
Mead opera ex interpretatione A. C. Lorry ,
2 vol. in-8°. 14 liv.
Wintringham notationes & observationes in
R. Mead monita & præcepta medica ,
in-8°. 5 liv.

*On trouve chez le même un assortiment de
Livres d'Histoire naturelle , de Médecine ,
Anatomie , Chirurgie , Chymie , Pharmacie ,
&c. &c.*

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS

APHORISMI,

Hippocratis et Celsi locis parallelis
illustrati, studio et curâ JANSSONII
ab ALMELOVEEN, D. M.

*Quibus accessit LUDOV. VERHOOFD
Index locupletissimus.*

Loca parallela ex BOERHAVII Commentariis, notulas
addidit, Editionem curavit

ANNA CAR. LORRY, D. M.



PARISIIS,

Apud THEOPHILUM BARROIS juniorem,
ad ripam Augustinianorum.

M. DCC. LXXXIV.

A small, stylized decorative mark or ornament located at the bottom center of the page.

xx Autumn

134.20

P R Æ F A T I O.

VANAM fortè videbimur operam impendisse, qui Hippocratis Coi Aphorismos, recusos toties, memoriâ et mentibus Medicorum hærentes, novo labore in publicum prodire voluerimus. Verùm utilitati publicæ, non privatæ gloriæ, consultum est. Cùm enim deesset ex Parisiensi typographiâ libellus utilis, indignum judicabamus ab Exteris mutuari ex Hippocraticis operibus unum quodvis; cùm ea dudum sibi propria fecerit, in exponendo et evolvendo Me-

dicinæ Principe , Medicorum Parisiensium indefessa sedulitas. Paratos prætereà ad Philiatorum vota , et parvo comprehensos volumine , exoptabat habere Aphorismos , artis promovendæ cupidissimus Bibliopola D. Didot. Hinc cùm me circa institutum consuleret , velletque nitidissimæ editioni pretium conciliare ; nulla mihi alia visa est , aut ad libelli formam præstantior , aut ad Auctoris sensum accuratior , quàm quæ , tradente Theodoro Janssonio ab Almeloveen , olim prodiit Editio. Plurima fuêre quæ rem persuaderent. Versio accurata , loci ex Hippocratis libris conformes , suo quique loco redditi , undè elucescat

P R Æ F A T I O. vii

quantum sibi ipsi constiterit Hippocrates ; Index denique locupletissimus , et qui ad breves concisasque sententias reperiundas aptissimus est. Hinc illam aliis antepondere , vixque mutatam typis nostris credere decretum est.

Primus igitur noster labor in id incubuit , ut loca à Jansonio citata exactè ad Hippocratis et Celsi qui sæpius Hippocratem latinè exscripsit , opera conferrentur , emendarentur plura , ut illâ saltem diligentia , antecedentes editiones , hæc nostra posset superare.

Vincenda fuere longa hæc fastidia ; verum ulterius progressi , operæ pretium facturos credidimus ,

viii] P R Æ F A T I O.

si loca ex Boerhaavio consona non tæderet excitare. Scilicet Vir eximius dum observationi theoriam jungere studet, novum Hippocratis operibus splendorem afflavit. Inde factum est ut, tum in ejus operibus, tum in luculentis, æqualis dicam, an discipuli ejus Cl. van-Swieten Commentariis, omnes ferè obscuriores Aphorismi reperiantur illustrati. Hos indicare et ad editionem Parisiensem referre æquum erat.

Obscuriora pauca supererant, quæ quoniam Novitiorum animum tardare potuissent, detraxissent forsitan Medicinæ Hippocraticæ fiduciam, et discendi aviditatem operoso studii fastidio vicissent. Hæc

brevibus notis ad Recentiorum sensum explananda existimavi ; alia verò attingere nefas putaverim , quòd illa cum veritate et experientiâ consonare , hæc verò utrique repugnare facilè videantur , vel illis qui Medicinam primis labris degustaverint. Præterea temerarium mihi fuisset , commentaria affectare , jam toties in hunc libellum edita , cùm à renovatæ Theoriæ Medicæ temporibus , plures et ætate et doctrinâ insignes , Aphorismos Hippocratis commentariis fuerint prosecuti , quorum capiti multâ cum laude hærentem coronam detrahare institutum non erat ; imò contrà quibus justam rependere laudem , ut jucundum , sic

x P R Æ F A T I O.

promptum esse debet, inter quos excellunt Philippus Hecquet, ex Lyceo nostro, apud Batavos Gorterus, apud Germanos Riegerus, nuperrimèque brevius, sed ornatè, distinctè, compositè, ex Academiâ Patavinâ Andreas Pasta.

Verùm omnibus facilè palmam præripiat indefessus circa Aphorismos et criticè et medicè perpendendos Cl. Lefebvre de Villebrune labor; quàm multa nova in utilitatem Medicinæ protulerit vir cui sincerâ eruditione parem vix inveneris, sentiet facilè quicumque veterum monumentorum sphalmata, variationes, addita et omissa voluerit attentius inspicere. Textum ejus impensè laudamus; nec

P R Æ F A T I O. xj

tamen ei semper consentire licuit in edendo libello qui mentibus omnium hæret, et quasi usu sacer evasit.

Dum verò novam Aphorismorum Hippocratis editionem molimur, non illud nobis consilium est Philiatris illos, quasi extractam ex universo Hippocrate medullam, aut quasi erutos ex contracto Auctore thesauros exhibere, quibus accuratè perpensis, cætera vilescant. Ausus est sæculo proximè exacto Hippocratem sic contrahere Burnetus; imò, et idém, quanquam modestè magis, Sponius Lugdunensis tentavit; sed macilentum, exsuccum, jam omni exutum Philosophiâ quæ fecerat

xij P R Æ F A T I O.

ἰσοθέον , uterque reddidit. Merentur quæ diurnâ æque ac nocturnâ Medicorum manu versentur, pleraque eorum operum quæ Hippocratis nomine circumferuntur , quanquam sæpè alieni vestigia laboris, adulteræque manûs miscelam, sagacioribus odorari facilè fuerit. Quo quidem piaculo non immunes sunt Aphorismi , auctoribus Galeno et Mercuriali : quippe plura iis à Medicis ante Galenum scribentibus addita fuisse , imò ab Hippocratis doctrinâ aliena fuisse ipsis inserta , iis consentientibus , fatendum est ; quanquam eos esse veram Magni Hippocratis , et genuinam sobolem ab omnibus concedatur.

P R Æ F A T I O. xiiij

Utinam verò ex illâ quæ summi Viri operibus propria est simplicitate , ad calcandum iter ab illo titutum accedantur animi ! constetque tandem quænam sit Philosophia Medica quæ ab evidentibus inchoata principiis , rudis primùm apparet , et titubans , mox ad immensos progreditur fructus , sine ullo hypotheseon fuco , sine ullo verborum fastu , qualis inter manus Coæ Scholæ atque Hippocratis effloruit, cùm nondum intumuerant superbiâ scholæ , et docendi libido , discendi aviditatem non extinxerat.

Errores certè suos passus est Hippocrates , nec ii sumus qui cum Suidâ arbitremur ipsum numquam

xiv P R Æ F A T I O.

falli potuisse. Plurimos Recentiorum sagax sedulitas reclusit naturæ fontes , Auctori nostro incognitos, unde ingentia in Medicinam fluxêre commoda. Dies diem docet. Sed ea quæ , velut opinionum commenta , temporum spatio non contabuêre , pro naturæ judiciis accipienda sunt. Quanquam verò aliqua ex veteri Medicinâ recentibus inventis , aliqua experientiæ minùs forsàn responsare fateamur , non minus tamen , aut injusta , aut temeraria videatur Aloysii Sinapii olim Medici Poloni in Hippocratis Aphorismos censura. Hic dum nodum in scirpo quærit cavillator pessimus , singulos carpit , in id unum intentus ut antidota verbo-

sis ornata strophis , medendi methodo , sine quâ Medicina rationalis nulla est , substituat : demens , qui dum salutiferæ Artis præcepta convellere audet , fidem sibi derogat , quasi postremi tantummodò ævi Scriptoribus Medicinam natura reservaverit ; quam contrà ex ipsâ humanitatis infirmitate sobolescentem , grandævi Medicinæ Patres adaugendam , perficiendam , sed nullatenus inveniendam Nepotibus transmisere. Quicumque enim solo veritatis amore ducti , huic scientiæ animum applicuere mirum est quantum inter se consentiant , quantâ concordîâ Auctori nostro debitas rependerint laudes. Quo quidem rerum aspectu , novum decus il-

lucescit Hippocrati, arti verò nostræ firmitas atque robur conciliatur, contra procacium jocos et insultantium jurgia. Quæcumque enim sera detexit Recentiorum theoria, apprimè consonare visa sunt Vetustiorum Auctorum observationibus; ut forsitan in nullâ aliâ Arte concordia major, uniformitas æqualior reperiantur. Sic quæ de aere, locis, et aquis, deprehensa observanti Hippocrati fuerant, à Toricellii inventis demonstrantur. Sic quæ à circulo sanguinis invento, de nutritione corporis comperta sunt, optimè cum Theoriâ ejus de victu in acutis quadrant. Sic multa è Præsagiis ejus, recentioris theoriæ jubare af-

P R Æ F A T I O. xvij
flata , splendidiùs enituêre : undè
constet quantum in illustrandâ , et
amplificandâ Medicinâ , Vir sum-
mus contulerit. Nec vereor , ne
me malefidus livor ejus amore
insanientem calumnietur , si ipsi
hos Lucretianos versus apposue-
rim :

Tu pater es rerum inventor , tu patria
nobis
Suppeditas præcepta , tuisque ex inclyte
chartis ,
Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
Omnia nos itidem depascimur aurea dic-
ta ;
Aurea , perpetuâ semper dignissima vitâ.

Ne tamen leviori fulta auctori-
tate , nostra hæc dona contempta
relinquantur , præmoneatur Lec-

xviii P R Æ F A T I O.

tor, Viros celeberrimos opem implorantibus nobis non defuisse. Tum verò accepti beneficii immemor forem, si non hîc recorderer, horarum quas emendando, perficiendo, nostro labori impendere non recusavêre Cl. Collegæ D. DORIGNY, tùm etiam DD. COQUEREAU et HALLÉ; quorum alter amicitiae cupidinem artis promovendæ, alter litterarum græcarum studio auctoris cultum et amorem jungere amat. Hi sæpè vigiliis suis hæsitantem et labantem, consiliis firmavêre laboribusque adjuvêre: illustria certè pignora, quibus libellus noster ita gloriatur, ut si quid insit boni, illis; si quid mediocris, mihi soli arbitrer imputandum.

P R Æ F A T I O. xix

Desunt tamen huic nostræ Editioni , quæ simul venales prostabant , selectæ è Celso Sententiæ , quia scilicet indignum credidi elegantissimum Auctorem sic contractum exhibere , favereque illorum desidiæ qui plus verbis se quàm rebus delectant. Norunt herclè rerum Medicarum gnari , quanti sit pretii Celsus , quantum mereatur , qui non semel , sed bis , et ter legatur integer. Hunc adeant tirones , hunc commendent professores.

Nec jucundum minùs existima-
vi concordia Hippocratis loca ab
Almeloveen citata ad cujusque sectionis calcem , priùs expensa , imò et
aucta ablegare ; quod ut Typogra-

xx P R Æ F A T I O.

phiæ facilius , sic etiam legentibus
minùs moræ injicit. Aliàs alii me-
liùs. Nobis satis sit publicæ utilitati
consuluisse , fastidiosis et operosis
laboribus.

F I N I S.

HIPPO-

HIPPOCRATIS

APHORISMI,

GRÆCÈ ET LATINÈ.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Α'ΦΟΡΙΣΜΟΙ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

α'. **Ο** βίβρ βραχὺς, ¹ ἢ ᾧ τέχνη μακρὴ, ² ὃ ᾧ καρὸς ὀξύς, ³ ἢ ᾧ πείρα σφαλερὴ, ἢ ᾧ κρείσσις χαλεπή. ⁴ δεῖ ᾧ ἔ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεόντα, ἀλλὰ καὶ τ' νοσέοντα, καὶ τὰς ^α παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

β'. ¹ Ἐν τῇσι ταραχῇσι τ' κοιλίῃς, καὶ τοῖσιν ἐμέτοις, ² τοῖσιν αὐτομά-



HIPPOCRATIS APHORISMI.

SECTIO PRIMA.

1. **V**ITA brevis, ¹ ars longa, ² occasio præceps, ³ experimentum periculosum, ⁴ iudicium difficile. ⁴ Oportet autem non modò seipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, et ^a præsentem, et externum.

2. ¹ In perturbationibus alvi, et vomitibus ² spontè ortis, ³ si quidem, qualia

4 H I P P. A P H O R.

oportet purgari , purgentur , confert ,
et facile ferunt : sin minùs , contrà. ⁴
Sic et vasorum evacuatio , si quidem ,
qualem fieri decet , fiat , confert , et
facile ferunt : sin minùs , contrà. ⁵ Res-
picere igitur oportet et regionem , et
tempestatem , et morbos , ^a in quibus
convenit , aut non.

3. In gymnasticæ disciplinæ deditis
¹ ^a boni habitus ad summum pro-
gressi , periculosi , si in extremo ste-
terint : ² non enim possunt in eodem
statu manere , neque quiescere. Cùm
verò non quiescant , neque ultrà possint
in melius proficere , reliquum est ut in
deterius ruant. Horum igitur causâ ,
bonum habitum solvere confert haud
cunctanter , quò rursùs nutritionis
principium sumat corpus. Neque con-
fidentiae ad extremum ducendæ : ³
periculosum enim : sed qualis natura

τως γινομένησιν, ³ ἢν μὲν, οἷα δεῖ κα-
θαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρεται τε, καὶ
δύσφορως φέρουσιν· ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. ⁴
ἔτω δὲ καὶ ἡ κενεαγείη, ἢν μὲν, οἷω δεῖ
γίγνεσθαι, γίγνηται, συμφέρει τε, καὶ
δύσφορως φέρουσιν· ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον.
⁵ ἐπιδιδέσκειν ἔνδεον καὶ χάριν, καὶ ὥρην,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νέεσθαι, ^a ἐν ἧσι δεῖ, ἢ ἔ.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμνασικοῖσιν ^a αἱ ἐπὶ
ἄκρον δυνάμει, σφαλεραί, ἢν ἐν τῷ
ἐχάτῳ ἔωσιν. ² ἔτι δὲ δύναμις μῦθον ἐν
τῷ αὐτῷ, ἐδὲ ἀτρεμύνειν· ἐπεὶ δὲ σὺν
ἀτρεμύνουσιν, ἐδέτε δύναμις ἐπὶ τὸ βέλ-
τιον ἐπιδιδόναι, λείπειται ἔνδεον τὸ χεῖ-
ρον. τέλειαν ἔνδεον εἵνεκα τὴν δυνάμειν λύειν
συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρ-
χὴν ἀναθρέψῃ λάθῃ τὸ σῶμα· μηδὲ
τὰς ἐμπροστίας ἐς τὸ ἐχάστον ἄγειν· ³
σφαλερὸν γάρ. ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἡ φύσις ἢ
ἐμέλιον· ὑπομῦθον, ἐς τέλος ἄγειν.

6 H I P P. A P H O R.

⁴ ὡσαύτως ἢ καὶ αἱ κενώσιες αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἄβυσσας, σφαλεραί· καὶ πάλιν αἱ ἀναθήψεις αἱ ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔσται, σφαλεραί.

Δ'. ¹ Αἱ λεπτὰ καὶ ἀκριβοῦς διάλται, ἔν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθει, ² καὶ ἐν τοῖσιν ὀξείσιν, ἔμὴ ἐπιδέχεται, σφαλεραί· ³ καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχαλον λεπτὴν ἀφίγναι διάλται, καλεσπαί. καὶ ⁴ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἀφίγναι, καλεσπαί.

Ε'. ¹ Ἐν τῇσι λεπτῇσι Διαιτήσιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντες· ² διὸ μᾶλλον βλάπτουσι. πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα, ὃ ἂν γίνηται, μέγα γίνεται μᾶλλον (ἐν τῇσι λεπτῇσι) ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδρότερησι Διαιτήσιν. Διὲς τὸ καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλερὰ αἱ πάνυ λεπτὰ καὶ καθεστηκυῖα καὶ ἀκριβοῦς διάλται, ὅτε

S E C T I O I. 7

fuerit ejus qui perferet , eò usque du-
cendæ. + Sic & evacuationes ad ex-
tremum ducentes , periculosæ. Et
rursùs reféciones , cùm extremæ fue-
rint , periculosæ.

4. ¹ Tenuis et severiori normæ ad-
strictus victus, et in longis morbis sem-
per , ² ^a et in acutis , ubi non conve-
nit, periculosus. ³ Et rursùs ad extre-
mum tenuitatis progressus victus, dif-
fícilis. ⁴ Nam et repletiones ad extre-
mum progressæ, difíciles sunt.

5. ¹ In tenui victu delinquant
ægri: ² ob id magis læduntur. Omne
enim delictum , quod admittitur ,
multò majus fit (in tenui) quàm in
paulò pleniore victu. Propterea etiam
sanis periculosus est valde tenuis ,
ponderatus et exquisitus victus ; quia

8 H I P P. A P H O R.

delicta graviùs ferunt. Ob hoc igitur tenuis et exquisitus victus periculosus magis, quàm paulò plenior.

6. ^a Ad extremos morbos, extrema remedia exquisitè optima.

7. ¹ Ubi igitur peracutus est morbus, ² statim extremos habet labores, et ^a extremè tenuissimo victu uti necesse est. Ubi verò non, sed plenius cibare licet, tantùm à *tenui* recedendum, quantùm morbus remissior extremis fuerit.

8. ¹ Cùm morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. Considerare oportet etiam ^a ægrotantem, num ad morbi vigorem

τὰ ἀμαρτανόμῳ χαλεπώτερον φέρουσι.
Δὲ τὸ ἐν αὐτῇ λεπταὶ καὶ ἀκριβοῦς δίδαι-
ται σφαλερὰ ἐς τὰ πλείστα τῷ μικρὸν
ἀδρότερον.

ς'. ^α Ἐς δὲ τὰ ἔχαια νεσθήματα, αὐ-
τῶν θεραπεῖαι ἐς ἀκριβοῦς κρί-
νεται.

ζ'. ¹ Ὅκως μὲν ἐν πάτοξυ τὸ νόσημα,
² αὐτίκα τὸ ἐχάτως πόνως ἔχει, καὶ
τῇ ἐχάτως λεπτοτάτῃ ^α Διὰ τὴν ἀνα-
καῖον χρέεσθαι· ὅκως ἢ μὴ, ἀλλ' ἐνδύ-
χεται ἀδρότερος Διὰ τὴν, τοσούτον ὑπο-
καταβάλλειν, ὅσον ἂν ἢ νῦν μαλ-
θακώτερον τῷ ἐχάτως ἦ.

η'. ¹ Ὅκως ἢ ἀκμάζει τὸ νόσημα,
τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ Διὰ τὴν ἀνα-
καῖον χρέεσθαι.

θ'. Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ ^α καὶ τὸ
νοσήσιον, εἰ ὁξυκρίσις τῇ Διὰ τὴν πρὸς
B

την ἀκμὴν τῆ νύκτος, ¹ ἢ ἐ πότερην
ἐκείνος ἀπαυδήσῃ πρότερον, καὶ ὅτε
ἐξαρκέσῃ τῇ Διαιτῇ, ἢ ἡ νύκτος πρό-
τερον ἀπαυδήσῃ ἐ ἀμβλυνέεται.

1. ^a ¹ Ὅκόσοισι μὲν ἔν αὐτίκα ἡ
ἀκμή, αὐτίκα λεπτῶς Διαιτᾶν· ὁκό-
σοισι δὲ ἐς ὕστερον ἡ ἀκμή, ² ἐς ἐκείνο
καὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀφαρρέειον. ἔμ-
προθεν δὲ πιωτέρως Διαιτᾶν, ὥς ἂν
ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

1α. ¹ Ἐν δὲ τοῖσι παρῥυσμοῖσιν
^a ὑποσέλλεσθαι χρή· τὸ προσιθέμεν γὰρ,
βλάβη. καὶ ὁκόσα κατὰ περιόδους παρῥ-
ξύνεται, ἐν τοῖσι παρῥυσμοῖσιν ὑπο-
σέλλεσθαι χρή.

1β. ^a ¹ Τὰς δὲ παρῥυσμὸς καὶ τὰς
καταστάσεις δηλώσασιν αἱ νύκτοι, ἐ αἱ
ῶραι τῆ ἑτέρας, ἐ αἱ τῆ περιόδου πρὸς
ἀλλήλας ἐπιδόσεις, ἥν τε καθ' ἡμέρην,

S E C T I O I. 11

victu sufficiet , ¹ ^b et an priùs ille deficiet , et victu non sufficiet , an morbus priùs deficiet , et obtundetur.

10. ^a ¹ Quibus igitur statim vigor morbi adest , statim tenuiter alendi. Quibus verò in posterum vigor , ² his ad illud , et paulò ante illud *tempus* subtrahendum. Antea verò uberiùs alendum , ut sufficiat æger.

11. ¹ In exacerbationibus *cibum* ^a subtrahere oportet. Exhibere enim , noxium est. Et quæcunque per circuitus exacerbantur , in exacerbationibus subtrahere oportet.

12. ^a ¹ Exacerbationes autem et constitutiones indicabunt morbi , et anni tempora , et periodorum ad invicem *collata* incrementa , sive quo-

12 H I P P. A P H O R.

tidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis quæ *mox* apparent *eadem* indicantur, velut ² in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbo*, eum abbreviat; si verò postea appareat, producit. Et urinæ ³, et alvi excrementa, et sudores, cùm apparent, vel judicatu faciles, vel difficiles, ⁴ vel breves, vel longos morbos *fore* indicant.

13. Senes facillimè jejunium ferunt, secundò ^a ætate consistentes, minimè adolescentes, ^b omnium minimè pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

14. ¹ Quæ crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent ^a alimento: sin minùs, corpus consumitur. ^b Senibus autem paucus

ἦν τε παρ' ἡμέρῳ, ἦν τε καὶ ἀπὸ πλείονος χρόνου γίνωνται. ἀτὰρ ἐ τοῖσιν ἐπιφανομήροιςιν, ² οἷον ἐν πλοῦρι-κοῖσι πλύετον, ἦν αὐτίκα ἐπιφάνηται δόχοιμός, βραχύνει. ἦν δ' ὕστερον ἐπιφαίνηται, μηκύνει. ³ καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρωῖτες, ἐ δύκερτα, καὶ δύσκερτα, ⁴ καὶ βραχέα, ἐ μακροῦ τὰ νησέματα, ἐπιφανόμενα δηλοῖ.

ιγ'. Γέρνεις δύφορώτατα νησείῳ φέρει· δό' τερον, ^a οἱ καθεστηκότες· ἡκιστα, μειράκια· ^b πάντων δ' ἐ μάλιστα, παῖδια· τετέων δ' ἐ αὐτέων, ἅπερ ἂν τύχη αὐτὰ ἐαυτῶν προθυμότερα εἶναι.

ιδ'. ¹ Τὰ ἀυξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἐμφυτον θερμόν· πλείστης ἔν δ' εἶται ^a τροφῆς. εἰ δ' ἐ μὴ, τὸ ζῶμα ἀναλίσκειται· ^b γέρει δ' ἐ ὀλίγον τὸ θερμόν·

Δ' αὖ τὸτο ἄρα ὀλίγαν ὑπεκκαυμάτων
δέοντα· ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσθέννυται·

² Δ' αὖ τὸτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρου-
σιν ἔχ' ὁμοίως ὀξέες· ³ ψυχρὸν γὰρ τὸ
ζῶμα.

ιέ'. ¹ ^a Αἱ κοιλία χερμῶν^Θ καὶ
ἥρος θερμότητα φύσει, ἔ' ὕπνοι μα-
κρότατοι. ἐν ² ταύτησιν ἔν τῇσιν ἄρῃσι
καὶ τὰ πρὸς ἄρματα πλείω δοτέον. καὶ
γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλείον ἔχει·
τροφῆς ἔν πλείονος δέοντα· σημεῖον,
^b αἱ ἡλικίαι ἔ' οἱ ^c ἀθληταί.

ις'. ^a ¹ Αἱ ὑγραὶ δίαίτα πᾶσι τοῖσι
πυρεταίνουσι συμφέρουσι· ² μάλιστα δ' ἐ-
παυδίοις, καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν ἔτως
εἰθισμένοις διαιτᾶσθαι.

ιζ'. ¹ Καὶ οἷσιν ἅπαξ, ἢ δις, καὶ
πλείω, ἢ ἐλάσσω, καὶ κατὰ μέρος· ² ^a δο-

calor : propterea paucis fomitibus indigent, à multis enim extinguitur. Idcirco ² etiam febres senibus non similiter acutæ. Frigidum ³ enim est corpus.

15. ^{1 a} Ventres hyeme et vere naturâ sunt calidissimi, et somni longissimi. ² In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Indicium sunt, ^b ætates et ^c athletæ.

16. ^{a 1} Victus humidus febricitantibus omnibus confert, ² maximè verò pueris, et aliis tali victu uti consuetis.

17. ¹ Et quibus semel aut bis, et plura vel pauciora, et per partes offerri conducat, videndum. ^{2 a} Conce-

dendum autem aliquid et consuetudini, et tempestati, et regioni, et ætati.

18. Æstate^a et autumnno cibos difficillimè ferunt : ¹ hyeme facillimè, deinde vere.

19. His qui per circuitus exacerbantur^a nihil dare *oportet*, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante judicationes.

20. Quæ judicantur et judicata sunt perfectè, neque movere *oportet*, neque ¹ innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, ² sed sinere.

21. Quæ ducere *oportet*, ¹ quo maximè vergant, eò ducenda, ² per loca convenientia.

22. ¹ Concocta purgare et movere *oportet*, ² non cruda, ³ neque in principiis, ⁴ nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

τέον δέ τι καὶ τὰ ἔθει, καὶ τῇ ἀρῇ, καὶ
τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίῃ.

ιη'. Θέρεος, ^α καὶ φθινοπώρῃ, σιλία
δυσφοράταλα φέρῃσι· ¹ χειμῶνος, ῥήϊσα·
ἦρος δούτερον.

ιβ'. Τοίοισιν ἐν τῇσι περιόδοις παρ-
ξυνομήνοισι ^α μηδὲν δίδόναι, μηδὲ
ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῷ προ-
αδεσίῳ, πρὸ τῷ κελσίῳ.

κ'. Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκε-
ρμμένα δρόσιως, μὴ κινέειν, ¹ μηδὲ νεω-
τεροποιέειν, μήτε φαρμακείῃσι, μήτ'
ἄλλοις ἐρεθισμοῖς, ² ἀλλ' ἔαν.

κα'. Ἄ δεῖ ἀγῆν, ¹ ὅκω ἀν μάλιστα
ῥέπῃ, ταύτῃ ἀγῆν, ² ἀλλ' οὐκ ἐν
φερόντων χωρίων.

κε'. ¹ Πέποντα φαρμακδέειν, καὶ
κινέειν, ² μὴ ὡμὰ, ³ μηδὲ ἐν δρόχῃσιν,
⁴ ἢ ἐν μὴ ὀργῇ. τὰ δὲ πλεῖστα σὺν ὀργῇ.

κγ'. ¹ Τὰ χαρέοντα μὴ τὰ πλήθει
τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χαρὲν, οἷα
δεῖ, καὶ φέρει δύφώρας. ² α καὶ ὅκα δεῖ
μέχρι λειποθυμίας ἄγειν, ³ καὶ τὸτο
ποιέειν, ἣν ὁξαρκέσει ὁ νοσέων.

κδ'. ¹ Ἐν τοῖσιν ὁξέσι πάθουσιν ὀλι-
γάκις, ² καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇσι φαρμα-
κείησι χρέεσθαι, ³ καὶ τὸτο προεξου-
κρινήσαντας ποιεῖν.

κε'. Ἦν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, κα-
θαίρωνται, συμφέρει τε καὶ δύφώρας φέ-
ρσι. τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.



23. ¹ Quæ prodeunt non copiâ sunt æstimanda , sed si prodeant qualia oportet , et facîle ferat. ² ³ Et ubi ad animi deliquium ducere oportet , hoc ³ etiam faciendum , si æger sufficiat.

24. ¹ In acutis affectionibus rarò , et in ² principiis , purgante utendum , atque hoc ³ diligenti priùs adhibitâ cautione faciendum.

25. Si , qualia purgari oportet , purgentur , confert et facîle ferunt : si verò contraria , difficulter.



N O T Æ
IN APHORISMOS
HIPPOCRATIS,

Qui difficiliore nec adeo obvii
sensûs sunt.

S E C T I O P R I M A.

APHOR. I. ¹ LOC. in Hom. l. i. =
² Loc. in Hom. liv. i. — II Præd. xxix,
 8. — I. Morb. iv, 1, 2. = ³ Humor. j,
 6, 7. — Artic. ix, 7. = ⁴ I. Epidem. ij
 93, 94. — VI. Epid. ij, 78, ad 82.
 = ^a Cels. iij, 5, p. 127, l. 20. vj, 6,
 §. 14, p. 358, l. 8. — *Vide* van-Swie-
 ten, tom. ij, p. 53-54, edit. Paris.

APHOR. II. ¹ I. Prædict. xx, 8. —
 Verat. 9. = ² I. Epid. ij, 47. = ³ Aphor.

vj, 15. — Aphor. j, 25. = + Humid.
 Us. v, 11. — Vict. Acut. v, 24. xxj, 5.
 = ⁵ Aphor. j, 17. — Humor. j, 14 ad
 19. — II. Morb. Mul. iv, 1, 11. — Epist.
 Democ. ad Hipp. 30 ad 34. — Orat.
 Theff. filii, 130. — I. Diæt. ij, 12, 13 et
 sequ. = ^a Cels. præf. j, pag. 18, l. 33.
 iij, 4, pag. 119, l. 31. v, 26, §. 6,
 pag. 284, l. 31. — *Vide* van-Swieten,
 tom. ij, p. 82, 346, 434, 472, 671, tom.
 iij, p. 100.

APHOR. III. ¹ Epistol. Hipp. ad Damag.
 ij, 209. = ² IV. Morb. x, 15, 16. =
³ Aph. ij, 51. = ⁴ Aphor. ij, 22, 51.
 — Vet. Medic. xvij, 1. — Vict.
 Acut. xvij, 10. = ^a Cels. ij, 2, pag.
 48, l. 5. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p.
 137, 420, tom. ij, pag. 385, 613.

⁷ *Εὐεξία* est *virium excessus*, Plethoram
 per se inducens, nisi retundatur. Hoc
 enim verbo non omninò optimam sani-
 tatem intelligit Hippocrates. Sic etiam
 sub nomine gymnastices, non exerci-
 tium salubre est intelligendum, sed di-
 ligens illa corporis cura, quâ, spretis

officiis civilibus , qui abutebantur , jure ab antiquis Philosophiæ præceptoribus explosi sunt , undè non *in exercitantibus* scribendum erat , sed *in gymnasticæ de-
ditis*.

APHOR. IV. ¹ Aph. j, 5. — Præcept. xj, 4. = ² Vict. Acut. xx, 6, 7. = ³ Aph. j, 3. ij, 51. = ⁴ Aph. vj, 39. — Æginet. lib. j, c. 32. = ⁵ Cels. iij, 2, p. 114, l. 3, iij, 15, pag. 145, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 98, 503. t. iij, p. 344.

Tenue , exquisitè tenue, summè tenue , tria sunt victûs genera quæ distinxit Hippocrates, pro vehementiâ morbi ad vires dimicantis Naturæ comparatâ , in libro *de Victûs ratione in Morbis acutis*. Sic autem est intelligendus hic aphorismus. *Diata exquisitè tenuis in morbis longis semper , in acutis , ubi non convenit, periculosa est. Insuper omnis diata ad tenuitatis extremum deducta semper officit. Sed et repletio nimia non caret incommodis*.

APHOR. V. ¹ Aph. j, 4. = ² Vet. Medic. xv, 9 , ad 14. — Vict. Acut. xx,

6, 7, 11. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 98, 503, tom. iij, p. 343.

Virium prostratio, acrium accumulatio, humorum putredo, tria sunt severæ nimis diætæ incommoda, quibus graviora nulla vel ab ipsâ ingurgitatione pertimescenda sunt. Ars enim vacuare potest, replere verò solius est naturæ. — *Vide* Boerhaav, Inst. Med. §. 756, 757.

APHOR. VI. ^a Cels. ij, 11, pag. 84, l. 8. iv, 19, pag. 232, l. 15. — Loc. in Hom. xxxvj, 14. lv, 7 ad 11. — Articul. j, 9. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 420. tom. ij, pag. 613, tom. iij, pag. 67, 569.

APHOR. VII. ¹ Aph. iv, 10. = ² I. Epid. iij, 29, 33. — II. Epid. j, 24. = ^a Cels. iij, 6, pag. 131, l. 33. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 64, 100, 330, 411.

APHOR. VIII. ¹ Viêt. Acut. xvij, 11. xx, 1, ad 6. — Aph. ij, 29. — Gal. de Opt. Sect. ad Thrasy. cap. 39. —

Vide van-Swieten, tom. j, p. 23. tom. ij, p. 66, 100.

APHOR. IX. ¹ Vict. Acut. xix, 5, ad 10. — Aph. j, 23. — Humor. iij, 87. = Cels. iij, 4, pag. 120, l. 7. ij, 10, pag. 78, l. 13. iij, 6, pag. 131, l. 21. v, 26, pag. 295, l. 21. = ^b Cels. iij, 4, pag. 119, l. 34. — Van-Swieten, tom. ij, pag. 98.

APHOR. X. ¹ Vict. Acut. xix, 8, 9. = ² Affect. xlij, 3. = ^a Cels. iij, 2, pag. 114, l. 1. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 100.

APHOR. XI. ¹ Aph. j, 19. — de Naturâ Human. xvij, 31. — Humor. iij, 82. — Loc. in Hom. xxxix. 1. — Affect. xlij, 3. lij, 14. — Vict. Acut. x, 2. = ^a Cels. iij, 4, pag. 122, l. 21. iij, 5, pag. 126, l. 19. — Coelius Aurelianus de Morb. Acut. l. ij, pag. 29. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 94, 503. —

Vide in omnes hosce Aphorismos de victu in acutis luculentissima Th. Glass, Medici Angli, Commentaria, Comm. v. in

quo optimè, et ad exquisitam, tum Hippocratis doctrinam, tum Recentiorum theoriam, rem omnem Vir sagacissimus exposuit.

APHOR. XII. ¹ II. Epid. j, 26 ad 30. = ² Aph. v, 8, 15. — Prænot. xij, 1, 12; xiv, 11. — Coac. Pr. iij, 132, 143. — III. Morb. xxj, 33, 34. — Affect. viij, 19. — Vict. Acut. vij, 1. = ³ Aph. iv, 71. — Coac. Pr. v, 82. — I. Epid. iij, 10. = ⁴ Vict. Acut. vj, 6, 7. = ^a Cels. iij, 4, pag. 122, l. 17.

Singula et universa hæc signa præcipuum constituunt Prognoseôn Hippocraticarum argumentum, quæ in capita distribuere Duretus et, dilucidius adhuc, sed propriis observationibus non adeo dives Prosper Alpinus, lib. *de præsagiendâ vitâ et morte ægrotantium*. Lege hîc attentè quidquid de hoc aphorismo scripsit in notis, doctè ut solet, Cl. de Villebrune.

APHOR. XIII. ^a Cels. præf. j, pag. 19, l. 21, 23; j, 3, p. 32, l. 24. = ^b Cels. præf. lib. j, p. 19, l. 21. — *Vide van-Swieten*, t. j, pag. 69; tom. ij, p. 99.

Senes ad existentiam solam aluntur; ætate consistentes etiam ad robur; pueri verò ad existentiam, robur et incrementum. In rigido sene languens vitalis circuitus paucissima absumit.

APHOR. XIV. ¹ Art. xxij, 2. — I. Diæt. xxviiij, 5, 6, 7. — Natur. Hum. xxiv, 7, 8. = ² Aph. iij, 27. — I. Morb. xx, 15, 16; xxj, 16. = ³ I. Diæt. xviiij, 9, 10, 11; xxviiij, 20. — I. Morb. xx, 14, 24. — Morb. Sac. x, 10. = ^a Cels. j, 3, p. 32, l. 28. = ^b Æginet. j, 23. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 99, 733; t. iij, p. 70.

Languet in senibus vis circuitûs et impetus humorum. Secretiones crudæ sunt et glutinosæ. Hinc senes frigent et ad sensum et ad thermometrum.

APHOR. XV. ¹ Humor. v, 4. — Aer. Aq. Loc. ij, 2. = ² Aph. j, 18. — Salub. Diæt. j, 2, 26. — IV. Morb. xvij, 9. = ^a Cels. j, præf. pag. 19, l. 23. — Cels. j, 3, p. 33, l. 7. = ^b Cels. j, præf. p. 19, l. 21. — Ægin. j, 53. — Plin. xj, 53. = ^c Cels. j, præf. pag. 19, l. 25. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

IN SECTIONEM I. 27

Ventres hyeme ad thermometrum calidiores non sunt. Sensus verò docet ventriculum hyeme ad capescendos cibos plus alacritatis et appetitûs experiri. Leviores sentimur, licet gravitas ad stateram aucta sit; somno longiori et placidiori fruimur; æqualior fit succorum nutritium applicatio; vires organorum auctæ alimenta validiora sibi postulant, non copiam eorum majorem. Juvenes et exercitati plus absumunt, plus ergò alendos se postulant.

APHOR. XVI. ¹ Insomn. xv, 13, 15, 16, 17. — III. Morb. xxxj, 11. — Loc. in Hom. xxxix, 1. = ² Salub. Diæt. ij, 5 ad 11. = ² Cels. iij, 6, p. 130, l. 32. — *Vide* Boerhaav. Aphor. practici, 587. Van-Swiet. tom. ij, p. 92, 196.

In febre major solidorum tensio, celerior humorum agitatio; hinc liquidissimi expressio, reliqui incrassatio, sitis, caloris productio, victum humidum postulant.

APHOR. XVII. ¹ Vet. Medic. xviiij, 4, 5, &c. — Vict. Acut. v, 19, 20; xix, 6. = ² Aph. ij, 49, 50. — I Diæt. ij, 10 ad 21. — III. Diæt. j, 10, 13 ad 15. — Natur.

hum. xvij, 30 ad 34. — Humor. j, 14; viij, 23. — Sal. Diæt. ij, 10. = ^a Cels. j, 3, pag. 24, l. 25; iiij, 4, pag. 119, l. 30; et iiij, 5, pag. 126, l. 24, 29. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

APHOR. XVIII. ¹ Aph. j, 15. — Humor. viij, 24. = ^a Cels. j, 3, p. 33, l. 23 et 29. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 101.

APHOR. XIX. Aph. j, 11. — Hum. iiij, 82. = ^a Cels. iiij, 4, pag. 122, l. 21; iiij, 5, pag. 127, l. 5, 10; iiij, 6, p. 133, l. 17.

APHOR. XX. ¹ Humor. iiij, 83. — Natur. Hum. xix, 8. — II Epid. j, 17. = ² Aph. ij, 29. — *Vide* Authores de Crisibus passim. — Van-Swieten, tom. ij, p. 53, 81 et 369.

APHOR. XXI. ¹ Humor. j, 2, 24; iiij, 85. = ² VII. Epid. xxxij, 4. — Aphor. vij, 61. — Loc. in Hom. xxxiiij; lv, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 131, 369, 711; tom. iiij, p. 102.

APHOR. XXII. ¹ Aph. iv, 13. — Humor. iij, 84. — Humor. j, 3. — V Epid. xxv, 12. — VII. Epid. xxxij, 1. = ² Aph. vij, 68. = ³ Aph. j, 24; ij, 29. — Loc. in Hom. xxxviiij, 9, 10. — VII Epid. xxxij, 5. = ⁴ Aph. iv, 1, 10; v, 29. — I. Morbor. Mulier. lxiiij, 11.

Constituto semel erethismo, natura semper ad concoctionem hostilis materiæ vergit, in illud intenditur tota. Concoctio peracta dicitur, ubi organis continentibus laxatis, irritante fluidorum indole mitificatâ, omnia ad excretionem secundum naturæ leges delabuntur, et proprio quasi motu feruntur. Tunc tantummodò purgandum; alioquin naturæ detrahes, non morbo, ut lib. *de Humoribus* exposuit Hippocrates. Exceptio tamen huic regulæ datur, si materia exundans, non cocta, sed motu rapta incondito et spontaneo feratur ad organa excretoria. Rarò id evenire pronuntiat Hippocrates, quod forsàn in primævis hominibus magis sobriis verum fuit, nunc sæpiùs id accidere aiunt ferè omnes. — *Vide* Sydenham, sect. j, cap. iv. Van-Swieten, t. ij, p. 131. Hollerium in hunc

30 NOTÆ IN APHOR.

Aphorismum; Ballonium, lib. ij. Epidem. Baglivium passim; et præcipuè Th. Glass, Comment. 7°. de alvi dejectione et vomitu.

APHOR. XXIII. ¹ Humor. iij, 86, 87. — Aph. j, 25. = ² Loc. in Hom. xxxix, 9. — Vict. Acut. lij, 8, 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 194.

Ingens sæpè sub minimâ mole latet malignitas. Sæpè atomus pestifera totam humorum molem contaminat. Pauca quidem per vomitorium sub febrium initio tollebat Sydenhamus, sed fructu tanto, ut, si abstinuisset à medicamento, vires labefactaret diarrhœa. Quod autem spectat deliquium animi, non semper naturæ imbecillitatem arguit, si cætera secundum ordinem benè se habeant; sed sæpè actuosæ naturæ impetum, sæpè plethoræ cacochymicæ vacuationem, fatiscente vasorum turgescientium tono nimio. *Vide* Sydenham, sect. j, c. 4.

APHOR. XXIV. ¹ Humor. iij, 97. — Purgant. iv, 1; v, 4. = ² Aph. iv, 10. — Aph. j, 22. — Vict. Acut. xlij,

I; xxxvj, 3 et seq. = ³ I. Morb. Mul. xxij, 9.

In acutis affectibus, vel incipiente morbo, vel absolutâ naturæ dimicatione, tantummodò locum obtinere possunt purgantia. Incipiens morbus solida nondum constrictit erethismo febrili; turgēt imò sæpè materies, ruens ad effluxum. Recedente sub finem morbi erethismo, supersunt hostiles reliquæ quibus liberandum est corpus. Per purgantia hîc non intelligenda sunt quæ alvum sine irritatione subluunt, ut cassia, tamarindi, nec ipsam, Sanctorio teste, perspirationem conturbant. Horum pleraque Veteribus erant aut incognita, aut usitata parùm, forsan ideo quòd fortiora primævorum hominum corpora iis non commoverentur.

APHOR. XXV. Aph. j, 2, 23; iv, 3.
— Humor. ij, 49. — VI. Epid. iv, 30.
— *Vide* van - Swieten, tom. j, p. 12;
tom. iv, p. 557.



ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

α'. Ἐν ᾧ νεσθήμεσσι ὕπνῳ πό-
νον ποίει, θανάσιμον· ἢν δ' ὕπνῳ
ἀφιλέη, ἔθανάσιμον.

β'. Ὅκω παραφροσύνῃ ὕπνῳ ἄ-
ταύη, ἀγαθόν.

γ'. Ὑπνῳ, ἄφρυπνίῃ, ἀμεφό-
τερα εἰς μετέωρα μᾶλλον γρηόματα,
κακόν.

δ'. Ὁὐ πλησμονή, ἔλιμὸς, ἐστὶ
ἄλλο ἐπ' ἐν ἀγαθόν, ὅ, τι ἂν μᾶλλον
τὸ φύσει ᾖ.

ε'. Κόπῳ, αὐτόματι φράζεσσι νέ-
σας.

ς'. Ὅκῳσι πονέοντες τι εἰς σώματι
τὰ πολλὰ τῶν πόνων ὅτε ἀφ' ἀνογίαι,
εἰ τρέψουσιν ἢ γνώμῃ νοσέει.

S E C T I O S E C U N D A .

1. **Q**UO ¹ in morbo ² somnus laborem facit, lethale : si verò somnus juvet, non est lethale.

2. Ubi somnus delirium ² sedat, bonum.

3. ¹ Somnus, ² vigilia, utraque modum excedentia, malum.

4. ¹ ² Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, ² quod naturæ modum excedat.

5. Spontanæ ² lassitudines morbos denuntiant.

6. Quicumque aliquâ corporis parte dolentes dolorem ferè non sentiunt, ² his mens ægrotat.

7. Quæ longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet: ¹ quæ verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiori alimento uti. Si verò cibum non capienti hoc eveniat, ² evacuatione opus habere nosse oportet.

9. Corpora, ubi quis purgare voluerit, facilè fluentia reddere oportet.

10. Impura corpora quò magis nutritiveris, eò magis lædes.

11. Facilius est repleri potu ^a quam cibo.

12. Quæ in morbis post crisin relinquuntur, ¹ ^a recidivas facere solent.

13. Quibus crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est: ^a sub-

ζ'. Τὰ ἐν πολλῇ χρένῳ λεπτονόμῳα
 σώματα νωθρῶς ἐπαναλρέφειν δεῖ·¹
 τὰ δ' ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

η'. Ἦν ἐκ νέσσε τροφὴν λαμβάνων
 τις μὴ ἰχύη, ¹ ζημῶνδ' ὅτι πλείονι
 τροφῇ τὸ σῶμα χρέεται· ἦν δ', τροφὴν
 μὴ λαμβάνοντι, τῷτο γίνηται, ² χρεὶ
 εἰδέναι ὅτι κενώσιος δεῖται.

θ'. Τὰ σώματα χρεὶ, ὅκῃ ἂν τις βέ-
 ληται καθάρειν, ^a ὄργα ποίειν.

ι'. Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σωματίων
 ὅκοσον ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάψεις.

ια'. Ῥᾶον πληρῶσθαι ¹ ποτὶ, ἢ σι-
 τίς.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμῳα ἐν τῇτι
 νέσσοισι μετὰ κρείσιν, ¹ ^a ὑποτροφὰς
 ποίειν εἴωθεν.

ιγ'. ¹ Ὀκόσοισιν ἢ κρείσις γίνεται,
 ταλίοισιν ἢ νιξ δύσφορος ἢ πρὸς ἑ

παρῳξυσμῶ· ^α ἢ ᾗ ἐπιῶσα δ' ὀφρατέρη
ὥς ἐπιτοπολύ.

ιδ'. ^ι Ἐν τῇσι τ' κοιλίσ ρύσειν αἱ
μεταβολαὶ τῆς Διαχωρημάτων ἀφελέ-
σιν, ^α ἢ μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλη.

ιε'. ^ι Ὅκ' φάρυγξ νοσέει, ἢ φύ-
μαλα ἐν τῷ σώματι ἐκφύειν, σκέπ-
τεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσεις· ἢ γὰρ χο-
λώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυννοσέει· ἢ ᾗ
ὅμοιαι τοῖσιν ὑγιαίνουσι γίνωνται, ασ-
φαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

ισ'. ^α Ὅκ' λιμὸς, ὃ δεῖ πονέειν.

ιζ'. ^α Ὅκ' ἂν τροφὴ παρὰ φύσιν
πλείων ἐσέλθῃ, τῷτο νῦσον ποιέει· δη-
λοῖ ᾗ ἢ ἰήσις.

ιη'. Τῶν τρεφόντων ἀθρόως καὶ τα-
χέως ταχέως καὶ αἱ Διαχωρήσεις γί-
γνονται.

sequens verò levior plerumque.

14. ¹ In alvi profluviis mutationes excrementorum juvant, ^a nisi in prava mutantur.

15. ¹ Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: si enim biliosæ fuerint, corpus unà ægrotat: si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

16. ^a Ubi fames, non oportet laborare.

17. ^a Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.

18. Eorum quæ confertim et celeriter nutriunt celeres etiam fiunt egestionēs.

38 H I P P. A P H O R.

19. Acutorum morborum non omnino^a tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

20. Quibus,^a dum sunt juvenes, alvi sunt humidæ, iis senescentibus siccantur. Quibus verò, dum sunt juvenes, alvi sunt siccae, his senescentibus humectantur.

21.^a Fainem vini potio solvit.

22.^{1 a} A repletione quicumque fiunt morbi, evacuatione sanantur; et quicumque ab evacuatione, repletione:² et aliorum contrarietas sanat.

23. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

24. Septimorum^a quartus est index. Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus verò undecimus: is enim quartus est alterius septimanæ.

ιβ'. Τῶν ὀξέων νησημάτων ἔ παμπαν ^α ἀσφαλέες αἱ προσβλυσόμεναι, ἔτε ἔθ θανάτου, ἔτε ἔθ ὑγείης.

κ. Ὀκόσοισι ^α νέοισιν ἔστιν αἱ κοιλῖαι ὑγραί εἰσι, τετάρτοις ἀποξηράσκουσι ξηραίνον. Ὀκόσοισι ἔ νέοισιν ἔστιν αἱ κοιλῖαι ξηραὶ εἰσι, τετάρτοις πρεσβυτέροις γινομένοις ὑγραί.

κα'. ^α Λιμὸν θάωρηξιν λύει.

κβ'. ^α Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκόσα ἐν νησημάτῳ γένηται, κένωσις ἐστίν. Ἐ ὀκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή. ^β καὶ ἔθ ἄλλων ἢ ὑπεναντίως.

κγ'. Τὰ ὀξέα ἔθ νησημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκάδεκα ἡμέρησι.

κδ'. Τῶν ἐπὶ τὰ ἡ ^α τετάρτη ἐπίδηλῳ. ἐτέρῃς ἐβδομάδῳ ἢ ὀγδόῃ ἀρχή. θεωρητὴ ἢ ἡ ἐνδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἔστι τετάρτη ἢ ἐτέρῃς ἐβδομάδῳ. θεωρητὴ ἢ

πάλιν ἢ ἑπτακαίδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι
τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαδεκά-
της, ἐξδόμη ἢ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

κε'. Οἱ θερμοὶ ^α τετραπλοῖοι τὰ
πολλὰ γίνονται βραχέες· οἱ ἢ φθινοπω-
ρινοὶ, μακροὶ, ἔ ¹ μάλιστα οἱ πρὸς τὴν
χειμῶνα συνάπτοντες.

κς'. ¹ Πυρετὸν ^α ἐπὶ σπασμῷ βέλ-
τιον γνῆσθαι, ² ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

κζ'. ¹ Τοῖσι ^α μὴ κτλ λόγον κερ-
ζουσιν ἔδει πιστεύειν, ἐδὲ φοβεῖσθαι
λίγω τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως.
τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοις τέων ὄντων ἀδέσποτα,
καὶ ἔ πάνυ τοι διαμρύνειν ἐδὲ χρονίζειν
εἴωθε.

κη'. Τῶν πυρεσόντων μὴ παντάπα-
σιν ἐπιπολάως, ¹ τὸ διαμρύνειν καὶ μη-
δὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ² ἢ καὶ συν-

Notandus rursùm decimus septimus : hic enim est quartus quidem à decimo-quarto, septimus verò ab undecimo.

25. Quartanæ æstivæ ^a plerumque fiunt breves: autumnales verò longæ, ¹ et maximè quæ prope hyemem incidunt.

26. ¹ Febrem convulsioni supervenire melius est, ² quàm convulsionem feбри.

27. ¹ His, ^a quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valdè quæ præter rationem fiunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodùm permanere, neque durare solent.

28. Febricitantium non omninò leviter ¹ permanere, et nihil remittere corpus, ² aut etiam magis quàm pro

42 H I P P. A P H O R.

ratione colliquefieri, ^a malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, ^b hoc verò infirmitatem.

29. ¹ Incipientibus morbis, ² si quid movendum videatur, move: ³ vigentibus verò, quiescere melius est.

30. Circa principia et fines omnia sunt debiliora: circa vigores verò, vehementiora.

31. A morbo bellè comedenti nihil proficere corpus, malum est.

32. Ut plurimùm omnes qui malè habent, circa principia quidem benè comedentes, et nihil proficientes, ad finem rursùs cibum non appetunt: ¹ qui verò circa initia quidem cibum omninò non appetunt, postea autem benè appetunt, meliùs liberantur.

33. In omni morbo ^a mente valere,

τήκεαζ ^a μαλλον τῷ κτ' λόγον, μοχθη-
ρόν. τὸ μὲν γδ' μεῖκτο ^b νέσε σημαίνε,
τὸ δ' ἀσθενέειαν.

κθ'. ¹ Ἀρχομένων τῶν νέσων, ² ἢν τι
δοκέη κινέειν, κίνει· ³ ἀκμαζουσῶν δ',
ἡσυχίῳ ἔχειν βέλτιον ὅτι.

λ'. Περὶ τὰς δρχὰς καὶ τὰ τέλη
πάντα ἀσθενέστερα· πρὶν δ' τὰς ἀκμὰς
ἰχυρότερα.

λα'. Τῷ δ' ἄρρωστίης εὐσιτέοντι μη-
δ' ἐν ὀπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

32. Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύ-
λως ἔχοντες, κατ' δρχὰς μὲν εὐσι-
τέοντες, καὶ μηδ' ἐν ὀπιδιδόντες, πρὸς
τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν· ¹ οἱ δ' κατ'
δρχὰς μὲν ἀσιτέοντες ἰχυρῶς, ὕπερον δ'
εὐσιτέοντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

λγ'. Ἐν πάσῃ νέσῃ ^a τὸ ἐρρώαζ

τὴν Διάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς
προσφορὰς, ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐναντίον,
κακόν.

λδ'. Ἐν τῇσι νέσοισιν ἥσων κινδυ-
νεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τ' φύσις, καὶ
τ' ἡλικίης, ἐτ' ἐξίς, καὶ τ' ὥρης
ἢ νέος ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰ-
κείη κατὰ τι τῶν.

λε'. Ἐν πάσῃσι τῇσι νέσοισι, τὰ
ὡς τ' ὀμφαλὸν^α καὶ τὸ ἥττον πά-
χος ἔχειν, βέλτιον ὅτι· τὸ δὲ σφόδρα
λεπτόν^β καὶ ἐπιτετηκός, μοχθηρόν. ὅπισ-
φαλές δὲ τὸ τοιῦτον, καὶ πρὸς τὰς κάτω
καθάρσιαις.

λς'. Οἱ ὑβρινῶς ἔχοντες τὰ σώματα
^α ἐν τῇσι φαρμακείῃσι καθαρόμυθοι
ἐκλύον^γ ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ
χρεώμυθοι.

et benè se habere ad ea quæ offeruntur , bonum est : contrarium verò malum.

34. In morbis minùs periclitantur ii quorum naturæ, et ætati, et habitui, et tempori magis similis fuerit morbus, quàm ii quibus horum nulli *fuerit* similis.

35. In omnibus morbis, ¹ quæ *partes* ad ^a umbilicum et inum ventrem *sunt*, crassitudinem habere, melius est: valdè autem tenues et ^b eliquatas *ipsas habere*, malum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36. Qui sana habent corpora, ^a pharmacis purgati citò exsolvuntur, *ut* et qui pravo utuntur cibo.

37. Qui benè valent corpore, ¹ purgatu sunt difficiles.

38. Paulò deterior et potus et cibus, jucundior autem, eligendus potiùs, quàm meliores quidem, sed ingratiore.

39. ¹ Senes ut plurimùm quidem ^a juvenibus minùs ægrotant: ² quicunque verò ipsis ^b morbi fiunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40. Raucedines, et gravedines, *in* valdè senibus non coquuntur.

41. Qui sæpè et vehementer, absque manifestâ causâ, animo linquntur, ex improvise moriuntur.

42. Solvere ^a apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem verò, non facile.

43. Ex ^a iis qui strangulantur et resolvuntur, nondum autem sunt mor-

λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες ¹
 Φαρμακεύεσθ' ἐρῶδες.

λη'. Τὸ σμικρῷ χεῖρον κὺ πόμα, ἔ-
 σιτίον, ἡδίον ῥ, τῶν βελγιόνων μὲν,
 ἀηδεσέρων ῥ, μᾶλλον αἰρετέον.

λθ'. ¹ Οἱ πρεσβύτῃ ^a τῶν νέων τὰ
 μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἥσων· ² ὅσα δὲ ἂν
 αὐτέοισι χρόνια ^b νεσήματα γένητῃ, τὰ
 πολλὰ ξυναποθνήσκει.

μ'. Βράτχοι ἔ κόρυζαι τοῖσι σφό-
 δρα πρεσβύτησιν ἔ πεπαίνοντῃ.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις ἔ ἰχυ-
 ρῶς, ἂν δὲ φανερῆς προφάσιθ, ὅξα-
 πίνης τελευτῶσι.

μβ'. Λύειν ^a λ'πωληξίλιν, ἰχυρὴν
 μὲν, ἀδύνατον· ἀσθενέα ῥ, ἔ ρήϊδιον.

μγ'. ^a Τῶν ἀπαρχομένων ^a, ἔ κατὰ
 λυομένων, μηδέπω ῥ τεθνηκότων, οὕκ

ἀναφέρουσιν ¹ οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἦ παρὰ τὸ
σώμα.

μδ'. Οἱ παχέες ^a σφόδρα καὶ φύσιν
ταχυθάνατοι γίγνουν) μᾶλλον τῶν ἱχνῶν.

με'. Τῶν ὀπλητικῶν τοῖσι νέοισιν
ἀπαλλαγὴν αἰ μελαγχολία, ¹ μάλιστα
τῇ ἡλικίᾳ, ² καὶ τῇ χαρίαν, εἰ τῇ
βίῳ, ποίεσσι.

μς'. Δύο πόνων ἅμα γινομένων, μὴ
καὶ τὸ αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος
¹ ἀμαυροῖ τὸ ἕτερον.

μζ'. Περὶ τὰς γλυέσιας τῆς πύας οἱ
πόνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνει μᾶλ-
λον, ἢ γλυομνία.

μη'. Ἐν πάσῃ ^a κινήσει τῆς σάματις,
ὅποτεν ἀρχῇ) πονεῖν, τὸ ἀναπαύειν
εὐθὺς ἀκοπον.

μθ'. Οἱ εἰθισμένοι τὰς συνήθειας πό-

tui, non se recolligunt, ¹ quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui naturâ ^a sunt valdè crassi, magis subito moriuntur, quàm graciles.

45. Epilepticis pueris, mutationes, ¹ maximè ætatis, ² et regionum, et vitæ, liberationem faciunt.

49. Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior ¹ obscurat alterum.

47. Circa puris generationes, dolores et febres magis accidunt, quàm ipso facto.

48. In omni ^a corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere, statim lassitudinem curat.

49. Consueti solitos labores ferre,

50 H I P P. A P H O R.

etiamsi fuerint debiles, ^a aut senes, insuetis, robustis *licèt* et juvenibus, faciliùs ferunt.

50. A multo tempore ^a consueta, etiamsi fuerint deteriora, ^b insuetis minùs turbare solent: ¹ oportet igitur etiam ad insolita se vertere.

51. Multùm, et derepentè ¹, vacuare, ² ^a aut replere, aut ³ calefacere, ^b aut ⁴ frigefacere, aut alio quocunque modo corpus ⁵ movere, ^c periculosum est. ⁶ Enimverò omne multum (i. e. *nimum*) naturæ est inimicum. ⁷ Quod verò ^d paulatim *fit*, tutum est: tum aliàs, et si quis ⁸ ex altero ad alterum transeat.

52. Omnia ex ratione ^a facienti, et non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, ^b manente eo, quod visum est ab initio.

SECTIO II. 51

ν85 φέρειν , καὶ ὥσιν ἀσθενέες , ^α ἢ γέροντες , τῶν ἀσυνήθων , ἰχυρῶν τε καὶ νέων , ῥᾶον φέρουσι .

ν'. Τὰ ἐκ πολλῶν ^α χρόνους συνήθεια , καὶ ἡ χεῖρα , τῶν ἀσυνήθων ^β ἥσσαν ἐνοχλεῖν εἴωθε . ¹ δεῖ ὅν ἐς τὰ ^ε ἀσυνήθεια μετὰβάλλειν .

να'. Τὸ καὶ πολὺ , καὶ ἑξαπίνης , ¹ κενῶν , ^α ἢ πληρῶν , ³ ἢ ^β θερμαίνειν , ⁴ ἢ ψύχειν , ἢ ἄλλως ὁκασῶν ⁴ τὸ σῶμα ^ε κινεῖν , σφαλερόν . ⁶ καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον . τὸ ⁷ κατ' ὀλίγον ^δ , ἀσφαλές . καὶ ἄλλως , ἢν καὶ τις ⁸ ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτέρον μετὰβαίνει .

νε'. Πάντα καὶ λόγον ^α ποιεῖοντι , καὶ μὴ γινομένων τῶν καὶ λόγον , μὴ μετὰβαίνειν ἐφ' ἑτέρον , ^β μόνον δὲ δόξαν δὲ ἀρχῆς .

νγ'. Ὀκόσοι τὰς κοιλίας ἡ ὑβρὰς ἔχουσι, νέοι μὲν ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσι τῶν ξηρὰς ἐχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσι· ξηραίνοντι γὰρ, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀπογηρεύσκει.

νδ'. Μεγέθει δὲ ἡ σῶμα ἡ ἐννεάσαι μὲν, ἐλδύθειον καὶ σὺν αἰδέες· ἐγληράσαι δὲ, δύχρητον καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.



53. Quicumque alvos habent humidus, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem verò, pejus liberantur : siccantur enim ut plurimum alvi senescentibus.

54. Procerò corpore ^a juventutem quidem degere, liberale est, nec deformè : insenescere verò, incommodum, et parvis deterius.



N O T Æ

I N

SECTIONEM SECUNDAM.

APHOR. I. ¹ I. Epid. iij, 8. — II. Epid. iij, 12. — Aph. iv, 67. — I. Prædict. xv, 5, 17. — VI. Epid. viij, 5. = ^a Celf. ij, 6, pag. 55, l. 32. — *Vide* van-Swieten, tom ij, pag. 398.

Lassitudines à somno, artubus quasi fractis, sæpè eis accidunt qui insueta et immodica exercitia experti sunt. Norunt id equites novitii. Secùs, hærere in ultimis vasis excrementitios humores significant, perspirationemque cohiberi. Id etiam convalescentibus à morbo post cibos justo pleniores accidit.

APHOR. II. Epid iij, 11, 12. = ^a Celf. iij, 18, pag. 152, l. 4.

IN SECTIONEM II. 55

APHOR. III. Aph. vij, 71. = ¹ Humor. iij, 78. — Coac. ij, 35. — VI. Epid. vj, 6. = ² Cels. ij, 4, pag. 51, l. 4. & l. 7. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 42.

APHOR. IV. ¹ VI. Epid. viij, 16. — II. Morb. xvj, 13. — Aph. ij, 22. — ² Aph ij, 51. = Vet. Medic. xv, 10, 15. = ³ Cels. j, 2, p. 23, l. 26.; 3, p. 24, l. 32.

APHOR. V. Aph. iv, 31. — ³ Gal. de opt. Sect. ad Thrasy. cap. 31. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 695 et 710; tom. ij, p. 63, 391; t. iij, p. 553, 601.

Quotiescumque stant integræ functiones, nec vis solidorum labefactatur, nec pondus humorum augescit, alacresumus et leves. Minuantur solidorum vis et tonus, augeatur humorum moles, utrimque pondus accedit: hinc verum et ad stateram; illinc relativum et ad sensum. Jam non sufficit novo ponderi corpus; fatiscunt crura, brachia, cervix; sanitas labascit. *Vide* aureum Sanctorii Opus, præcipuè Sect. j et v.

APHOR. VI. ^a Cels. ij, 2, pag. 48, l. 24; ij, 7, pag. 62, l. 27. — *Vide* van-Swieten; tom. j, pag. 5; tom. ij, p. 194; tom. iv, p. 455.

APHOR. VII. Aliment. xj, 6, 7. =
¹ Aph. ij, 11, 18. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, p. 655.

Diuturniores morbi naturæ robur extinguunt, breves prosternunt tantum.

APHOR. VIII. ¹ Aph. ij, 31; iv, 41, 45. vij, 64. — Coac. j, 179. = ² Aph. ij, 22.

Non refert quidas sumas, sed quid concoquas. Copiosior cibus vires opprimit, non reficit. Hinc tot Hippocratica præcepta de comparatione inter vires et cibos instituendâ. Si, rectâ mensurâ adhibitâ, cibus non reficit, signum est quòd quâ semel imbutum est corpus, labes morbosa alimenti corrumpit materiem; vacuetur ergo. *Vide* Versionem Cl. de Villebrune.

APHOR. IX. Aph. iv, 13; vij, 70.

=^a Cels. iij, 18, p. 155, l. 1. — *Vide*
van - Swieten, tom. ij, p. 131; tom. iv,
p. 395 et 655.

Totius methodi medendi in acutis fun-
damentum est sententia illa, cùm in illo
consistat purgationis rectè institutæ mys-
terium, ut mobilissima vacuentur. Mo-
biliora autem sunt quæ fluidiora.

APHOR. X. Aph. vij, 65, 67. —
Vet. Med. xij, 11, 12; xix, 6 ad 17,
— Præcept. xj, 4. — II. Morb. xvj,
13; xxj, 16 ad 20.

Falsa foret conclusio quæ indè tota-
lem in morbis abstinentiam deduceret.
Contrarium mille locis edocuit Hippe-
crates; præsertim cùm plus noxæ videt
in nimis tenui quàm in pleniore diætâ.
Sed Aphorismus noster indicat ad ne-
cessitatem talia corpora nutrienda esse,
non ultrà.

APHOR. XI. Vet. Medic. xij, 3, 9.
— Aliment. xj, 5. — Aph. ij, 7, 18.

== ^a Cels. j, 2, pag. 23, l. 29. —
Vide van-Swieten, tom. ij, p. 92.

Alimentum liquidum vulgò, nec sine exceptione tamen, materiam tenuiorem præbet, solvendam facilè, adeoque et plus imp'entem, et vacuationi promptiori aptam.

APHOR. XII. ¹ Humor. vij, 16, 17. — II. Epid. j, 81; iij, 72. — IV. Epid. xvij, 20. — VI. Epid. ij, 32; iij, 62. — II. Morb. xvj, 12, 13; xx, 20; xxxvij, 19. — Aph. iv, 36. == ^a Cels. ij, 14, pag. 89, l. 16. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 52.

Vel ejusdem morbi recidivam facit materies illa, vel alium morbum. Sic furunculos atque abscessus variolæ, sic asthmata peripneumonix relinquunt; sic hepatitis in hæmorrhoidas vertitur.

APHOR. XIII. ¹ VI. Epid. ij, 42. — I. Epid. iij. — III. Epid. iij, 66. == ^a Cels. iij, 5, pag. 124, l. 32. — *Vide* Boerhaav. Inst. Med. 931, et seq.

Vide van-Swieten, tom. ij, pag. 79.

APHOR. XIV. ¹ II. Epid. ij, 3. — Aph. j, 2. = ² Aph. iv, 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 356.

APHOR. XV. ¹ Aph. iij, 26. — *Vide* Sanctorium, sect. j, passim. *Vide* van-Swieten, tom. ij. p. 606.

Morborum qui parti alicui incumbunt origo triplex. Vel enim illam, illæso cæteroquin corpore, invadunt; vel totius corporis læsi symptomata, unam præcipuè partem occupant; aut demum, dum desæviunt in unam, cæteras, quasi metastasi factâ, liberant. Cuique horum casuum sua sunt signa. Sed universalem affectionem designat excrementorum omnium perversio.

APHOR. XVI. ² Cels. j, 2, pag. 24, l. 17.

APHOR. XVII. Aph. ij, 22. — Vet. Med. viij, 16; xij, 10; xij, 11, 24;

xix, 6, 31. — I. Diæt. iij, 15. — III. Diæt. xv, 1, 6. — Loc. in Hom. Lij, 8, 9. — Sanit. tuend. ad Demet. 6. — Affect. xxviiij, 1, 2. — Morb. Sacr. xviiij, 30. — Epist. Abderit. ad Hip. 40. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 32. — *Vide* versionem et textum Cl. de Villebrune.

APHOR. XVIII. Aph. ij, 7, 11. — Aliment. xj, 4, 5. — VI. Epid. v, 37, 53. — 18 et 19. *Vide* Sanctor. sect. iij, 60.

APHOR. XIX. Decent. Ornat. x, 7, 8. =^a Cels. ij, 6, p. 57, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 53, 432.

APHOR. XX. Aph. ij, 53. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 336.

Si, ob acutiorem fibrarum intestinalium sensum, alvus sit juveni laxior, senescenti tardabitur. Si juniore ob siccitatem tardior fuerit, senescenti laxabitur.

APHOR. XXI. ^a Cels. j, 3, p. 26, l. 29.

IN SECTIONEM II. 61

APHOR. XXII. ¹ Natur. Human. xvij, 11, 12, 13. — San. tuend. ad Dem. 7. — VI. Epid. viij, 16. — Aph. ij, 8. — Flat. ij, 9, ad 16; iij, 2, 3. = ² Aph. ij, 8. — Vet. Medic. xxxiij, 18. — Loc. in Hom. lj, 6; liij, 2; liv, 6. — I. Epid. ij, 95. — Morb. Sacr. xvij, 30, 32, 33, 35. = ^a Cels. j, 3, p. 28, l. 5. — *Vide* van-Swieten; t. j, pag. 345; t. ij, pag. 256.

APHOR. XXIII. Aph. ij, 19. — Judicat. iv, 12. — Coac. j, 190, 211. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 84.

Lege hîc attentè meditandam Meletiï expositionem, quam nobis in hunc aphorismum noscendam tradidit Cl. de Villebrune, toties nobis laudandus.

APHOR. XXIV. Aph. iv, 36, 71. — Septimest. viij, 6. — Judicat. ij, 7, ad 12. — Prænot. xx, 5, ad 10. = ^a Cels. iij, 4, pag. 121, l. 1, ad 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 421, 425, 427, 430.

Doctrinam hanc fusè et doctè defendit in observatis suis inter recentiores Cl. de Haën Rat. Med. tom. j; impugnavit doctè et modestè Cl. Le Roy,

62 NOTÆ IN APHOR.

Monspeliensis Professor, libro de Prognosi. Plura certè in Edicto Hippocratico vera sunt. Sed observatis illius plura addere fas erat, plura detrahere quæ dies meliùs docuit. *Vide* autores prædictos Duretum, Hollerium in Hipp. Aphor. Glass, Freind, Desmars, Aubry et alios.

APHOR. XXV. ¹ Nat. Human. xxix, 5, 6, 7. — I. Epid. iij, 17. — Coac. j, 236. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 9; iij, 16, p. 147, l. 7. — *Vide* Sydenham, Sect. j, cap. 5. Ballonium, Epidem. lib. ij. Van-Swieten, tom. ij, pag. 461.

APHOR. XXVI. — ¹ I. Morb. vj, 13, 14. — Aph. iv, 57; v, 5, 70. — Coac. j, 231; iij, 80. — San. tuend. ad Dem. 10. = ² Aph. vij, 13. — Coac. ij, 207; iij, 82. — Judicat. xij, 11. = ^a Cels. ij, 8, p. 70, l. 2 et 5. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 321.

APHOR. XXVII. ¹ I. Prædict. vj, 16; vij, 7. — II. Prædict. xxix, 6. — Coac. j, 73; iij, 100, 109, 110. — II. Epid. iij, 132. = ^a Cels. ij, 7, pag. 60. l. 12.

IN SECTIONEM II. 63

et ij, 14, pag. 89, l. 16. — *Vide* Galen. de dieb. critic. Van-Swieten, tom. ij, pag. 85, 156; tom. iij, pag. 68.

APHOR. XXVIII. ¹ Humor. iij, 17. = ² Aph. v, 55. — Humor. iij, 52. = ^a Cels. ij, 2, p. 48, l. 8; et ij, 4. p. 51, l. 21. — ^b Cels. ij, 5, pag. 53, l. 24; et ij, 7, p. 58, l. 19.

Quâ proportionem morbi materiem subigit febris, eâdem et vim corpori infert. Si igitur minùs quàm par est tenuetur illud, retinetur intus expellenda labes, novas, datâ occasione, molitura insidias. Si verò magis quàm pro ratione colliquescat; corporis fabricam, non morbum, a febre destrui, sana corrumpi, cuncta putredine intus grassante diffluere signum est.

APHOR. XXIX. ¹ Aph. ij, 30. = ² Aph. j, 22, 24. — II. Morb. Mul. xxiv, 16, 17, 18. = ³ Loc. in Hom. xxxviij, 9, 10, 11. — Purgant. iv, 1. — I. Epid. iij, 29. — II. Morb. xij, 34, 35. — III. xxiv, 57, 58, 59. — *Vide* Van-Swieten, t. ij, p. 66.

Lij

APHOR. XXX. Aph. ij, 29. — *Vide* van Swieten, t. ij, p. 65.

APHOR. XXXI. Aph. ij, 8. — Coac. j, 179. — *Vide* van-Swieten, t. I, p. 3.

APHOR. XXXII. Coac. j, 179. =
¹ Aphor. vij, 6.

In priori casu vires ex præpostero cibo sumpsit morbus, illumque corrumpit. In altero, restituta fuit legitimæ diætæ ministerio sanitas; cujus indicium est alimentorum appetitus.

APHOR. XXXIII. De Medic. iij, 9. — Coac. j, 72. =^a Cels. ij, 3, p. 49, l. 32.

APHOR. XXXIV. Aph. viij, I, 8. — Humor. vj, I ad 5. — Dieb. Judicat, j, II ad 15. — VI. Epid. viij, 43 ad 46. — Affection. vij, 3. — *Vide* van-Swiet. t. iij, p. 11, 70.

In corpore prædisposito, causa minus vehemens majora creat symptomata, sed quæ tollantur facilius. Causa levis infanti convulsionem accersit promptè

IN SECTIONEM II. 65

sanandam : gravissima est causa , quæ senem in motus convulsivos rapit. Per hyemem eâdem exardeat vehementiâ febris ardens ac furente Syrio ; nonne ultimum furoris gradum obtinuit causa , quæ , contradicentibus omnibus , emicare facit symptomata maxima ?

APHOR. XXXV. ¹ Prænot. x, 2. — Aph. ij, 28. — I. Morb. Mul. lxxvij, 9. = ^a Cels. ij, 3, p. 49, l. 21. = ^b Cel. ij, 4, p. 51, l. 16.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 37; iv, 16. — Verat. us. j, 2. — Epist. Dem. ad Hip. 16. = ^a Cels. ij, 13, p. 87, l. 24.

APHOR. XXXVII. Aph. ij, 36; iv, 16. — Verat. us. j, 5, 12. = ¹ Aph. iv, 5.

APHOR. XXXVIII. De Art. xij, 10. — VI. Epid. iv, 26. — IV. Morb. xij, 7. — Affection. xlij, 1, 2. — Vict. Acut. xv, 1, 2; xvij, 2, 4. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 93; t. iij, p. 655

APHOR. XXXIX. ¹ I. Morb. xx, 13, 15. = ² Aph. v, 7. = ^a Cel. ij, 1, p. 43, l. 14. = ^b Cels. ij, 8, p. 73, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 651.

Resistit fortiùs incumbenribus morborum acutorum causis senilis rigiditas: sed si cedere semel coacta fuerit, deficit flexilitas, deficit tonus qui vires resituat.

APHOR. XL. *Vide* van-Swieten, t. i, pag. 89.

APHOR. XLI. Coac. j, 83.

Inhæret scilicet cordi causa morbi immedicabilis.

APHOR. XLII. ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij, p. 276, 283, 284.

APHOR. XLIII. ¹ Morb. Sac. viij, 18. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 645; t. iij, p. 273. — *Vide* interpretationem Cl. de Villebrune in notis ad hanc sectionem.

APHOR. XLIV. ^a Cels. ij, 1, p. 47.

IN SECTIONEM II. 67

l. 24. — *Vide* van-Swieten , t. ij , pag. 284, t. iij , p. 257.

APHOR. XLV. Aph. v , 7. — II. Prædict. xvj , 1, 2, 3. — Morb. Sac. xij , 6. =¹ Aph. iij , 28. =² VI. Epid. v , 36. — *Vide* van-Swieten , t. iij , p. 435 , 436.

APHOR. XLVI. ¹ Humor. xj , 16 , 17. — Aliment. j , 11. — *Vide* van-Swieten , t. ij , p. 226.

APHOR. XLVII. Vet. Medic. xxxij , 8 , ad 12. — Prænot. xvij , 8. — De Ulcerib. ij , 8 , ad 11. — *Vide* van-Swieten , t. j , p. 208 , 606 , 640 , 645 ; t. ij , p. 42 , 106.

Legatur hîc curiosè quid Damascius de Archæo Helmontiano protulit, apud Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVIII. Aph. II , 22. — Præcept. xij , 4. — Natur. Human. xvij , 14 , 15. — Flatib. ij , 14. =^a Cels. j , 3 , p. 25 , l. 11 , et p. 26 , l. 33. — *Vide* van-Swieten , t. ij , p. 109.

APHOR. XLIX. II. Diæt. xlv, 2, 3, 4. =^a Cel. j, 3, p. 25, l. 7.

APHOR. L. II. Diæt. xlv, 4. — Humor. iij, 115. — Humid. us. iij, 8, — Vict. Acut. xvij, 2, ad 6; xxxij, 5, 6. — Aph. j, 17. =¹ Aph. ij, 22, 51. =^a Cels. j, p. 3, 27, l. 1. =^b Cels. j, 3, p. 25, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 285; tom. ij, p. 102, 127; tom. iij, p. 639.

APHOR. LI. Vict. Acut. xvij, 12, xxij, 15. =¹ Aph. j, 2; vj, 27, 39. =² Aphor. j, 3, 4; ij, 4, 17; vj, 39. =³ Aph. iij, 1; v, 16. =⁴ Aph. iij, 1; v, 17, 18, 20, 22, 23, 24. =⁵ Aph. ij, 14. =⁶ Aph. ij, 4. — Veter. Medic. xvij. — I. Præcept. xij, 4. — I. Morb. Mulier. xxxij, 4; xcviij, 15. =⁷ II. Diæt. xlv, 5. — Natur. Human. xix, 7, 8. — Humor. viij, 17, 18. — Humid. us. iij, 5. — VI. Epid. ij, 47. — Affect. xlij, 3. — Vict. Acut. v, 22; x, 8. =⁸ Aph. ij, 50, 52. =^a Cels. ij, 16, p. 92, l. 19. =^b Cels. j, 9, p. 40, l. 7. =^c Cels. j, 3, p. 24, l. 28. =^d Cels. j, 3, p. 25, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 54; t. ij, p. 127.

IN SECTIONEM II 69

APHOR. LII. Loc. in Hom. xx, 11, 12. =^a Cels. iij, 1, p. 112, l. 25. — Coel. Aurel. tard. passion. iv, 3, p. 454. =^b Cels. iij, 9, p. 138, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 138.

APHOR. LIII. Aph. ij, 20. =^a Cels. j, 3, p. 33, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 336.

APHOR. LIV. Præcep. xj. 10. =^a Cels. ij, 1, p. 43, l. 17.



ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

α'. Αἱ ¹μεταβολαὶ ^a τῶν ὥρέων μά-
 λιστα τίχθισι νοσήματα · ² καὶ ἐν τῇσιν
 ὥρησιν αἱ μεγάλαι μεταλλαγαὶ ἢ ψύ-
 ξις, ἢ θάλαψις, ἐκ τ' ἄλλα καὶ λόγον
 ἔστω.

β'. Τῶν φυσίων αἱ μὲν πρὸς ^a θε-
 ρον, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς
 πεφύκασι.

γ'. Τῶν νόσων ^a ἄλλαι πρὸς ἄλλας
 εὖ ¹ ἢ κακῶς πεφύκασι · καὶ ἡλικίαι
 τινὲς πρὸς ὥρας, καὶ χώρας, καὶ αἰτί-
 τας.

δ'. Ἐν τῇσιν ὥρησιν, ὅταν ^a αὐ-
 τῆς ἡμέρης ὅτε μὲν θάλαψις, ὅτε δὲ
 ψύξις γίγνηται, φθινοπωρινὰ ^a τὰ νο-
 σήματα προσδέχεται χρή.

S E C T I O T E R T I A .

I. ¹ ^a M U T A T I O N E S *anni* temporum maximè pariunt morbos : ² et in ipsis temporibus magnæ mutationes tum frigoris , tum caloris , et cætera pro ratione eodem modo.

2. Naturarum aliæ quidem ^a ad æstatem , aliæ verò ad hyemem , benè aut malè sunt constitutæ.

3. Morborum ^a alii ad alios benè ¹ aut malè se habent : et ætates quædam ad tempora , et regiones , et victus.

4. In temporibus , quando eâdem die , modò calor , modò frigus fit , autumnales ^a morbos expectare oportet.

5. Austri^a auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. Quum hic dominatum tenuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò aquilonium fuerit *anni tempus*, tusses, ^a fauces *asperæ*, ^b alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, talia in morbis oportet expectare.

6. Quando æstas veri similis est, sudores^a in febribus multos expectare oportet.

7. In¹ siccitatibus^a febres acutæ fiunt.² Et, si quidem annus majore parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem,³ ut plurimum tales etiam morbos expectare oportet.

8. In constantibus^a temporibus,

ε'. Νότοι^α βαρυήκοοι, ἀχλυάδες, καρηδαρκοί, νωίροι, ἀλαλυστικοί. ὁκόταν ἔτως δυνατεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάχυσιν. ἢν ᾗ βόρειον ἢ, βῆχες, ^β φάρυγγες, κοιλίᾳ σκληραὶ, δυσπρίᾳ, φρικώδεις, ὀδύνα πλυσρέων, σιθέων. ὁκόταν ἔτως δυνασέῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι προσδέχεσθαι χρή.

ς'. Ὁκόταν θέρῃ γένῃ^η ἢ ὁμοιον, ἰδρωτάς^α ἐν τοῖσι πυρελοῖσι πολλὰς προσδέχεσθαι χρή.

ζι'. ¹ Ἐν τοῖσιν ^α αὐχμοῖσι πυρελοὶ ὀξέες γίνον^η. ² καὶ ἢν μὴ ἔτι πλέον ἢ τὸ ἔτε^{ον} τοιστέον ἔον, οἷον τὴν καλῶσασιν ἐποίησεν, ³ ὡς ἔπιτοπολὺ καὶ νιστήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι.

η'. Ἐν τοῖσι ^α καθεστῶσι καμροῖσιν,

ἢν ἀραίως τὰ ἀραιὰ ἀποδίδωσιν ,
 δύσαθές , καὶ δύσκρινές , αἱ νῆσοι
 γίνονται· ἐν δὲ τοῖσιν ^β ἀκαλλαστάτοισιν ,
 ἀκατάστατοι , & δύσκριτοι.

θ'. ^ι Ἐν ^α φθινοπώρῳ ὀξύτα) αἱ
 νῆσοι , καὶ θαναλωδέστα) τὸ ἐπίπαν·
^β ἢ δὲ ὑγιεινότεον , καὶ ἥκιστα θανα-
 τῶδες.

ι. Τὸ φθινόπωρον ^α τοῖς φθίνουσι
 κακόν.

ια. Περί δὲ τῶν αἰρέων , ἢν μὲν ὁ χει-
 μὼν ^α αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένη) , τὸ
 δὲ ἔαρ ἐπομβρὸν & νότιον , ^ι ἀνάγκη δὲ
 θέρε) πυρεῖς ὀξείας , & ὀφθαλμίας ,
^α καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι , μάλιστα δὲ
 τῇσι γυναῖξιν , & ἀνδρῶν τοῖσιν ὑγροῖσι
 τὰς φύσεις.

ιβ. Ἦν δὲ νότιος ὁ χειμὼν , ^α καὶ
 ἐπομβρ) , & εὐδι) γένη) , ^ι τὸ

si tempestivè tempestiva reddantur; constantes, et judicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus^b autem, inconstantes, et difficiles judicatu.

9. In ¹ ^a autumno morbi acutissimi, et perniciosissimi omninò: ² ^b ver autem saluberrimum, et minimè exitiale.

10. Autumnus ^a tabidis malus.

11. Quod ad *anni* tempora, si quidem hyems ^a sicca et aquilonia fuerit, ver autem pluviosum et australe, ¹ æstate necesse est febres acutas oriri, et ophthalmias, ² et dysenterias, maximè autem mulieribus, et viris naturâ humidis.

12. Si verò hyems australis, ^a et pluviosa, et tranquilla sit, ¹ ver au-

tem siccum et aquilonium, mulieres, quidem, quibus partus in ver *incidit*, ex omni occasione abortiunt: quæ verò pepererint, infirmos et morbosos pariunt pueros, ita ut, vel statim *illi* pereant, vel tenues et morborum vivant. Cæteris verò mortalibus dysenteriae, et ophthalmiae siccae oriuntur; senioribus autem catarrhi breviter perimentes.

13. Si verò æstas sicca ^a et aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus ^b et australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, et tusses, et raucedines, et gravedines: quibusdam verò etiam tabes.

14. Si verò ^a aquilonius et sine pluviis *autumnus* fuerit, iis quidem qui naturâ sunt humidi, et mulieribus, commodus *erit*: reliquis verò erunt

ἡ ἄρ' αὐχμηρὸν ἐ βόρειον, αἱ μὲν γυναικες, ἥσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἥρ, ἐκ πάσης προφάσις ἐκλιτρωσκουσιν· αἱ δ' ἂν τέκωσιν, ἀκραλέα καὶ νοσώδεα τὰ παῖδιά τίκουσιν, ὥστε ἡ παραυλικά διπλόκωσθαι, ἡ λεπλά ἐ νοσώδεα ζῆν ἐόντα. τοῖσι ἡ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεντερίαι, ἐ ὀφθαλμίας ξηραὶ γίνονται· τοῖσι ἡ πρεσβυτέροισι καλιάρροι συντόμως διπλόκωσθαι.

ιγ'. Ἦν ἡ τὸ θέρ^α αὐχμηρὸν καὶ βόρειον γέννη, τὸ ἡ φθινόπωρον ἔπομβρον^β καὶ νότιον, κεφαλαλγία ἐς τὴν χειμῶνα γίνονται, ἐ βήχες, καὶ βράγχοι, ἐ κόρυζαι· ἐνίοισι ἡ ἐ φθίσιες.

ιδ'. Ἦν ἡ^α βόρειον ἡ ἐ ἄνδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἔστι τὰς φύσεις, ἐ τῇσι γυναιξί, ξύμφορον· τοῖσι ἡ λοιποῖσιν ὀφθαλμίας ἔσονται ξηραὶ, καὶ

πυρελοί ὀξέες, ἔ κόρυζα (χρόνια)
ἐνίοισι ἔ μελαγχολία.

ιέ. Τῶν ἔ καλασασίων ἔ ἐνιαυτῷ,
τὸ μὲν ὅλον οἱ αὖχμοι τῷ ἐπομεδριῶν
εἰσιν ^α ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσων θανα-
τώδεις.

ις. Νεσήματα ἔ ἐν μὲν τῇσιν ^α ἐπομε-
δρήσιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεῃ, πυρελοί τε
μακροί, καὶ κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπε-
δόνες, ¹ ἔ ἐπίληπτοι, ἔ δ' ὑπόπληκτοι,
καὶ κυνάγχαι. ἐν ἔ τοῖσιν ^β αὖχμοῖσι,
φθινώδεις, ὀφθαλμία, δ' ἰθρίτιδες, τρα-
χηρία, ἔ δυσεντερία.

ιζ'. Αἱ ἔ καθ' ἡμέραν καλασάσιες,
αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώματα ^α ξυ-
νισῶσι, ἔ εὐτόνα, ἔ εὐκίνητα, ^β καὶ
εὐχροα, ἔ εὐκοώτερα ποίεσσι, καὶ
τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὄμματα
δάκνουσι. ἔ ὡς τ' ἑώρακα ἀλγυμῶ

ophthalmiæ siccae, et febres acutæ, et gravedines (diuturnæ); nonnullis verò etiam melancholiæ.

15. Ex anni verò constitutionibus, in universum quidem siccitates pluviosis ^a sunt salubriores, et minùs lethales.

16. Morbi autem in pluviosis ^a quidem plerumque fiunt, et febres longæ, et alvi fluxiones, et putredines, ¹ et epileptici, et apoplectici, et anginæ. In siccitatibus ^b verò tabidi, ophthalmiæ, arthritides, urinæ stillicidia, et dysenteria.

17. Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem ^a corpora compingunt, et robusta, ^b et facilè mobilia, et benè colorata, et meliùs audientia faciunt, alvos etiam siccant, et oculos mordent; et dolorem circa tho-

racem, si quis præexistat, majorem faciunt. ^c Austrinæ verò corpora dissolvunt, et humectant, et auditus graves, et capitis gravitates faciunt, et vertigines in oculis, ¹ et corporibus motum difficilem, et alvos humectant.

18. Secundùm tempora autem, vere quidem, et primâ æstate, pueri, ^a et his ætate proximi, optimè degunt, et maximè sani sunt. ¹ Æstate verò, et parte quadam autumnii, senes. Reliquo sed autumnio, et hyeme, qui medii sunt ætatæ.

19. Morbi autem quilibet fiunt quidem ^a in quibuslibet *anni* temporibus ¹ nonnulli verò in quibusdam ipsorum potius et fiunt, et exacerbantur.

20. Vere ^a, quidem insanix, et

ἢν τι προϋπάρχη, μᾶλλον πονέουσιν. αἱ
 ὃ νότιοι ^α ἀλλύουσι τὰ σώματα καὶ
 ὑγραίνουσι, ἔ βαρυηκοΐας τε ἔ καρηθε-
 ρίας ποιεῖουσι, ἔ ἰλίγγους ἐν τοῖσιν ὀφ-
 θαλμοῖσι, καὶ ¹ τοῖσι σώμασι δυσκινή-
 σιην καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

ιγ. Κατὰ ὃ τὰς ὥρας, ἔ μὲν ἦρθε,
 ἔ ἄκρως ἔ θέρεθε, οἱ παῖδες, ^α καὶ
 οἱ τελέων ἐχόμμοι τῇσιν ἡλικίῃσιν,
 ἄριστά τε ἀλλάγουσι, ἔ ὑγιαίνουσι μᾶ-
 λιστα. ¹ ἔ ὃ θέρεθε, ἔ ἔ φθινοπώρα
 μέχρι μὲν τινθε, οἱ γέροντες. τὸ ὃ λοι-
 πὸν ἔ φθινοπώρα, καὶ ἔ χειμῶνθε, οἱ
 μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσι.

ιδ. Νεοσήματα ὃ πάντα μὲν ἐν ^α πά-
 σῃσι τῇσιν ὥρησι γίνεθ, ¹ μᾶλλον δὲ
 ἑνίαι κατ' ἑνίας αὐτέων ἔ γίνεθ, καὶ
 παροξύνεθ.

κ. Τε μὲν γὰρ ^α ἦρθε τὰ μανικὰ,

καὶ τὰ μελαγχολικά, ¹ καὶ τὰ ἐπιληπ-
 τικά, ² καὶ αἵματι ρύσιες, ἔκυ-
 νάγχα, ἔκόρυζα, ἔβράγχοι, καὶ
 βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχήνες, καὶ
 ἀλφοὶ, ἔ^β ἔξανθήσιες ἐλκιάδες πλεῖ-
 σαι, καὶ φύμαλα, ³ ἔ^δ ἔρθελικά.

κά. Τῷ ᾧ θέρεσθαι, ἐνιά τε τέλειων,
 καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες, ¹ καὶ καῦσοι,
 καὶ τριτάτοι πλεῖστοι, καὶ τεταρτάτοι, καὶ
 ἑκτατοὶ, καὶ ἀγέρροισι, καὶ ὀφθαλμίσιν,
 καὶ ὧτων πόνοι, καὶ στομάτων ἐλκιάσεις, ἔ
 σηπεδόνες αἰδοίων, ἔ ἰδρωα.

κε'. Τῷ ᾧ φθινοπάρει, ἔ^γ θει-
 νῶν τὰ πολλὰ, ¹ καὶ πυρετοὶ τεταρ-
 τῆται, καὶ ^α πλάνητες, ² ἔ^δ σπλήνες, καὶ
 ὑδρωπες, ³ ἔ^δ φθίσιες, καὶ σφαγγυρία,
 ἔ^δ λειεντερία, ἔ^δ δυσεντερία, καὶ ἰχτιάδες,
 καὶ κυνάγχα, καὶ ἄσθμαλα, ἔ^δ εἰλεοὶ,

S E C T I O I I I . 83

melancholiæ, et ¹ epilepsiæ, ² et sanguinis fluxiones, et anginæ, et gravedines, et raucedines, et tusses, et lepræ, et impetigines, et vitiligines, et ^b pustulæ ulcerosæ plurimæ, et tubercula, ³ et articulorum dolores.

21. Æstate verò, et horum nonnulla, et febres continuæ, ¹ et ardentes, et tertianæ plurimæ, et quartanæ, et ^a vomitus, et alvi fluxus, et ophthalmiæ, et aurium dolores, et oris exulcerationes, et pudendorum putredines, et sudamina.

22. Autumno autem, et ex æstivis multa, ¹ et febres quartanæ, ^a et erraticæ, ² et lienes, et hydropes, ³ et tabes, et urinæ stillicidia, et lenteriæ, et dysentericiæ, et coxæ dolores, et anginæ, et asthmata, et volvuli,

et epilepsiæ , et insaniæ , et melancholiæ.

23. ¹ Hyeme ² verò , pleuritides , peripneumoniæ , lethargi , gravedines , raucedines , tusses , ² dolores pectorum , et laterum , et lumborum , et capitis dolores , vertigines , ³ apoplexiæ.

24. In ætatibus autem talia eveniunt. Parvis quidem ¹ et recens natis pueris aphthæ , vomitus , tusses , vigiliæ , pavores , umbilici inflammationes , aurium humiditates.

25. Ad dentitionem verò ¹ accedentibus gingivarum pruritus , febres , ¹ convulsiones , alvi profluvia ; et maximè ubi caninos dentes producunt , et iis qui inter pueros sunt crassissimi , ² et qui alvos duras habent.

26. Iis autem qui ætate sunt majore

κὲ ὀπληψία, ἐ τὰ μανικά, κὲ τὰ με-
λαγχολικά.

κγ'. ¹ Τῷ ᾧ ^α χειμῶν, πλούριτι-
δες, ὤειπνύμονία, λήθαργοι, κό-
ρυζα, βράγχει, βῆχες, ² πόνοι ση-
θέων, ἐ πλούρέων, καὶ ὀσφύ, καὶ
κεφαλαλγία, ἱλιγγοί, ³ ἀποπληξία.

κδ'. Ἐν ᾧ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε ξυμ-
βαίνει. τοῖσι μὲν σμικροῖσι ^α κὲ νεογνοῖσι
παυδίοισιν, ἄφθα, ἑμέλοι, βῆχες,
ἀγρυπνία, φόβοι, ὀμφαλῶ φλεγμο-
ναί, ὥτων ὑγρότητες.

κέ. Πρὸς ᾧ τὸ ^α ὀδοντοφυεῖν προσάγ-
σιν, ἔλων ὀδαξισμοί, πυρετοί, ¹ σπασ-
μοί, ἀφάρροια. ἐ μάλιστα ὅταν ἀνά-
γωσι τὰς κυνόδοντας, ἐ τοῖσι παχυ-
τάτοις τῶν παιδίων, ² ἐ τοῖσι σκληρὰς
τὰς κοιλίας ἔχουσι.

κε'. Πρεσβυτέροις ᾧ γλυκομήνοισι,
P

παρίσθμια, ^a σπονδύλας & κτ' τὸ ἰνίον
 εἶσω ὥσιες, ἄσθματα, ¹ λιθιάσιες,
² ἔλμινθες στρογγύλαι, ἀσκαρίδες,
 ἀκροχορδόνες, ³ σαλυσιασμοὶ, (σραγ-
 γείαι,) χοιράδες, καὶ τᾶλλα φύ-
 ματα, μάλιστα ἢ τὰ προειρημμένα.

κζ'. Τοῖσι ἢ ἔτι ^a πρεσβυτέρησι,
 καὶ πρὸς τὴν ἡδὴν προσάγασσι, τειλέων
 τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλ-
 λον, καὶ ἐκ ῥινῶν αἵματι & ῥύσιες.

κή. Τὰ ἢ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι
 πάθεα κρίνε', τὰ μὲν ἐν ^a τεσσα-
 ράκοντα ἡμέρησι· τὰ ἢ ἐν ἑπτὰ μηνί·
 τὰ ἢ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι· τὰ ἢ πρὸς τὴν
 ἡδὴν προσάγασιν. ¹ ὅσα δ' ἂν ἀγα-
 μείνη τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῇ
 παρὰ τὸ ^b ἡδᾶσκειν, ἢ τῇσι θήλεσι
 παρὰ τὰς & καταμηνίων ῥήξιας, χρονί-
 ζειν εἶωθε.

jores, ^a tonsillæ *inflammatae*, verticuli in occipitio introrsum extrusiones, asthmata, ¹ calculorum generationes, ² lumbrici rotundi, ascarides, verrucae pensiles, ³ satyriasmī, (stranguriæ,) strumæ, et cætera tubercula, maximè verò suprà dicta.

27. Ætate verò adhuc ^a provectionibus, horum quidem multa, et febres diuturnæ magis, et ex naribus sanguinis fluxiones.

28. Plurimæ quidem affectiones in pueris judicantur, aliæ ^a in quadraginta diebus, aliæ in septem mensibus, aliæ in septem annis: aliæ *ipsis* ad pubertatem accedentibus. ¹ Quæ verò in pueris permanserint, neque solutæ fuerint circa ^b pubertatem, aut in fœminis circa menstruorum eruptiones, diu perseverare solent.

29. Juvenibus autem , sanguinis spuitiones , ¹ ^a tabes , febres acutæ , ² epilepsiæ , et cæteri morbi , maximè verò suprà nominati.

30. Ultra hanc ætatem verò ^a *progressis* , asthmata , ¹ pleuritides , peripneumonix , lethargi , phrenitides , febres ardentes , ² alvi profluvia diuturna , cholerae , dysenterix , lenterix , hæmorrhoides.

31. Senibus autem ^a , spirandi difficultates , catarrhi tussiculosi , ¹ stranguix , dysuriæ , ² articulorum dolores , nephritides , vertigines , apoplexiæ , mali *corporis* habitus , pruritus totius corporis , vigiliæ , alvi , et oculorum , et narium humiditates , visûs hebetudines , glaucedines , auditûs gravitates.



κθ'. Τοῖσι ᾗ νενήσκεισιν, αἵματι
πτύσεις, ¹ ^α φθίσεις, πυρετοὶ ὀξείες,
² ἐπιληψία, ἔταλλα νεσθήματα, μά-
λισα ᾗ τὰ προειρημμένα.

λ. Τοῖσι ᾗ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ^α ταύ-
την, ἄσθμα, ¹ πλυσίτιδες, πει-
πονδυμονία, λήθαργοι, φρενίτιδες,
καῦσοι, ² ἀρρώγια χρόνια, χολέρα,
δυσεντερία, λειντερία, αἰμορροΐδες.

λά. Τοῖσι ᾗ ^α πρεσβύτησι, δύσ-
πνοια, κατάρροι βηχώδεις, ¹ τραγχε-
ρία, δυσχερία, ² ἄρθρων πόνοι, νε-
φρίτιδες, ἱλιγγοί, ἀποπληξία, κα-
χεξία, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλα,
ἀγρυπνία, κοιλίης, καὶ ὀφθαλμῶν,
καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμολυωπία, γλαυ-
κώσεις, βαρυκοΐα.



N O T Æ

I N

SECTIONEM TERTIAM.

APHOR. I. ¹ Octimestr. iij, 29. —
 Humor. vj, 5; viij, 15, 16. — Aër.
 Aq. Loc. j, 19. — Vict. Acut. xvij, 9.
 — Morb. Sac. xij, 7. = ² Aph. ij, 51.
 — II. Diæt. vj, 7. — Humor. vij, 7. =
^a Cels. j, 3, p. 33, l. 32. — II. 1, p.
 42, l. 21. *Vide* Ballonium I. Sydenham,
 Sect. j, cap. ij. Huxham, de aere &c. t. j;
 Prolegomen. Ramazzin. et alios passim.

Nec licet hic prætermittere quæ de
 Tempestatum apud antiquos divisione
 congessit Riegerus in hunc Aphorismum.

APHOR. II. Vet. Medicin. xxxvij,
 14. — I. Diæt. xxv, 12. — III. Diæt.
 j, 6. — Aër. Aq. Loc. xxxiv, 9; lvj,

IN SECTIONEM III. 91

7, 8. — Morb. Sac. xvij, 24. =^a Cels. j, 9, p. 39, l. 18. — *Vide* van-Swie-ten, t. v, pag. 140.

APHOR. III. Humor. viij, 11, &c. =
Aph. viij, 6; Aph. ij, 34. =^a Cels. ij, 1, p. 43, l. 12.

Versionem Foesii non accepimus, licet eam jam dudum Galenus indicaverit, assenserintque Galeno Mercurialis, Heurnius, Hollerius. Textui enim ab omnibus accepto consona non est. Potest verò propositio de morborum cum intemperie corporis jam positâ consensu intelligi.

APHOR. IV. Humor. vj, 5, 6; vij, 7. =^a Cels. j, 3, p. 33, l. 32; et ij, 1, p. 42, l. 21.

APHOR. V. Humor. viij, 1. — Morb. Sac. xv, 3, 8, 19, ad 22. =^a Cels. ij, 1, p. 44, l. 27. =^b Cels. ij, 1, p. 44, l. 22.

Auster tepore humido plumbeus vasa laxat, et vires exsolvit; perspirat

tionem, imminutâ vasorum actione, tum et auctâ humiditate retinet intûs : hinc qui ab aggesto et putrefacto humore pendet morbi. Stringit solida Aquilo, humores compingit ; hinc qui à stricto inflammatorio deducuntur morbi : hi verò in eam partem decumbunt quam ventus in eam directus constringerit, ut docuit vir, si quis alius, in Medicinâ inventor Sanct. Sanctorius ; nec adeo tamen certa ventorum actio, cùm, Austro flante, gelu dirum anno 1709 observaverint. Nec prætermittendum est observasse, à quâ regione Venti in nos impetum faciant ? An à mari tepidiore ? An à montibus nivosis ? An subito defervescant ? An diù perflent ? — *Vide Hippocratem de aëre locis et aquis, et Huxham in prolegomenis, t. j, & Hist. de l'Académie des Sciences, an. 1710.*

APHOR. VI. Humor, vij, II. ^a Cels.
1, p. 45, l. 28.

Hyeme aggeritur, ob minorem perspirationis efficaciam, humor pituitosus. Æstate diffilari debuerat. Si verò frigidior

IN SECTIONEM III. 93

dior illa, et similis veri fuerit, exundabit humor ille; nisi stimulo febris excitus sibi moliatur per sudores exitum.

APHOR. VII. ¹ Humor. viij, 6. —
 II. Epid. j, 10. = ² Humor. ix, 8. =
³ Aph. iij, 19. = Cels. ij, 1, p. 45, l. 5.
 — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 453.

APHOR. VIII. Humor. vij, 3, 15. —
 II. Epid. j, 20, 21. = ^a Cels. ij, 1, p. 42, l. 19. = ^b Cels. ij, 1, p. 43, l. 5.
 — *Vide* van-Swieten, t. v, p. 140.

APHOR. IX. ¹ II. Prædict. xij, 4. —
 II. Epid. j, 15. = ² II. Epid. j, 23. = ^a
 Cels. I, 3, p. 33, l. 23; et ij, 1, p. 42, l. 19 et 29. = ^b Cels. ij, 1, p. 42, l. 17. —
Vide van-Swiet. t. ij, p. 460, 461, 730.

Effœtum, diluente vehiculo orbum, exustum sanguinem, fessa laxataque vasa aggreditur inæqualis Autumni temperies. Natura debilis, periodus incerta ad perniciem concurrunt. Vere, sanguis aquosior, vasa flexilia, nervi è sopore redi-vivi, natura fortior, periodus constan-

tior, ad salutem, datâ operâ, consentiunt.

APHOR. X. Aph. iij, 22. — II. Prædict. xij, 3. — VI. Epid. vij, 77. =
^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 3.

Suaderent Ver ipsis infensissimum accuratæ J. Huxham Observationes de Aëre et Morbis Epidemicis.

APHOR. XI. Aër. Aq. Loc. xxv, 7. =
¹ II. Epid. j, 10. =² Aër. Aq. Loc. xxv, 13. =^a Cels. ij, 1, p. 45, l. 12.

Præsenti Aphorismo, ut et sequentibus, expenduntur effectus, qui varias tempestatum vices sequuntur, quoties ab instituto naturæ aberrat temporis constitutio, nec τὰ ὁρατὰ ὁρατῶς apparent. Mechanica frigoris, caloris, ariditatis, humiditatis actio experimentalī Hippocratis expositioni responsat exactè. Laxatio fibrarum, perspirationis reſtentio, motûs imminutio, sequelæ sunt frigoris humidi. Siccitas contrà et densitas humorum, fibrarum tensio, perspiratio enormis, calidam et siccam tem-

pestatem comitantur ; madidis advolans
 alis Notus æstum simul et humiditatem
 infert, undè fibris laxitas, humoribus
 metuenda putredo. Boreas contrà omnia
 gelu constringit, fibras compingit et hu-
 mores. Ex hisce primariis secundariis
 effectus variarum aëris constitutionum,
 quoties nec debito ordine variant, nec
 certo tempore sibi succedunt, facile de-
 ducuntur ; modò, dùm mechanicæ ac-
 tioni harum Atmospheræ qualitatum at-
 tendimus, sensilitatis etiam ratio ha-
 beatur, quæ, cùm fibrarum mobilitatem
 regat, in subitis temporum mutationibus
 præstat plurima. Sed hæc omnia nemo
 plenius aut doctius exposuit Joanne Hu-
 xham, de Aëre et Morbis Epidemicis
 vol. j, Prolegom. Addemus tamen quod
 jam et Sydenham, et Freind, et alii no-
 tarunt ; observatoribus Medicis, dum
 constitutiones morbosas prædominantes
 exponunt, curæ id impendêre, ut non tan-
 tùm unius tempestatis vices afferant,
 sed plures sese mutuò excipientes con-
 ferant et expendant.

APHOR. XII. Aër. Aq. Loc, xxvj, 4.

5, 6. =ⁱ Nat. Human. xiiij, 7. =^a Cels. ij, i, p. 45, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 567.

APHOR. XIII. Aër. Aq. Loc. xxviii, 4, 5. =^a Cels. ij, i. p. 45, l. 31. — *Vide* hic luculentas Cl. de Villebrune annotationes.

APHOR. XIV. Aër. Aq. Loc. xxix, 1, 2. =^a Cels. ij, i, p. 46, l. 1.

APHOR. XV. Aër. Aq. Loc. iij, 3. =^a Cels. ij, pag. 42, l. 29. — *Vide* Huxham de aëre &c. t. ij, præf. p. vij.

APHOR. XVI. ⁱ Morb. Sac. xv, 1, 2. =^a Cels. ij, i, p. 45, l. 7. =^b Cels. ij, i, p. 45, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. iij, pag. 362.

Duplex morborum ab imbribus origo, solidorum inertia, aquosior humorum compages. Hinc coctionis atque criseos tarditas, humidi perspirabilis redundantia; unde stases, putredines in variis partibus. A siccitate contrà, densum inflammatorium, vasorum strictura, humorum acrimonia.

IN SECTIONEM III. 97

APHOR. XVII. ¹ Aph. v, 16. =
^a Cels. ij, 1; p. 44, l. 25. = ^b Cels.
 j, 9, pag. 39, l. 27. = ^c Cels. ij, 1,
 pag. 44, l. 27. — *Vide* van-Swieten,
 t. ij, pag. 37.

APHOR. XVIII. ¹ Morb. Sac. xij,
 1. = ^a Cels. ij, 1, pag. 46, l. 9.

APHOR. XIX. Prænot. xxvij, 4. =
¹ Aph. iij, 17. = ^a Cels. ij, Præf.
 pag. 42, l. 3.

APHOR. XX. ¹ Morb. Sac. xij, 5,
 6, 7. = ² Nat. Human. xij, 11. =
³ Aph. vj, 55. = ^a Cels. ij, 1, pag.
 43, l. 20. = ^b Cels. v, 28, §. 15,
 pag. 336, l. 7. — *Vide* van-Swieten,
 tom. ij, p. 595, 730.

APHOR. XXI. Affection. xij, 1, ad
 5. = ¹ Vict. Acut. xxxiv, 2. = ^a Cels.
 ij, 1, pag. 43, l. 33. — *Vide* van-Swie-
 ten, tom. j, pag. 107; tom. ij, pag. 38,
 410.

APHOR. XXII. ¹ Nat. Human. xxix,
 R

2. = ² Int. Affect. xxxij, 2. = ³ Aph. iij, 10. = ^a Cels. ij, pag. 44, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. v, p. 607,

APHOR. XXIII. ¹ Affect. vij, 3, 4. = ² Aph. vj, 5. = ³ Glandul. ix, 4, ad 8. = ^a Cels. ij, 1, pag. 44, l. 19. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 535, 730; t. iij, p. 2.

APHOR. XXIV. ^a Cels. ij, 1, pag. 46, l. 16. — Æginet. j, 10. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 68, t. iij, p. 197, 216, t. iv, p. 580, 585.

Ætatum morbi à necessariâ illarum constitutione facile deducuntur. Mollior est et aquosior infantum temperies, genus nervosum mobilissimum, lymphamucosa, ad acidum fermentativum vergens, exundat. Progressu ætatis visceribus robur, fibris tonus accedit; evolvuntur glandulæ, functionibus pares fiunt: hinc et patiuntur plurimum. Incremento corporis sumpto, validâ jam coctione, vasis adhuc flexilibus, exuberat cruor, et quaquaversus nititur ad

IN SECTIONEM III. 99

exitum; donec vasa, per vitæ exercitium validiora facta, fortiùs distendenti resistent, et per varia emunctoria superfluum ablegent. At brevi ipsa vitæ actio senium inducit. Rigent vasa, languescit sanguinis circuitus. Hinc et coctio debilior, et inertis pituitæ accumulatio, quæ senibus importuna et immedicabilia mala producit. Sed hæc accuratiùs nemo evolvit J. Russel Anglo: *Œconom. Naturæ*, in *Glandul.* parte II.

APHOR. XXV. ¹ Aër. Aq. Loc. iv, 5. — Morb. Sac. xj, 1. = ² Aph. ij, 53. = ³ Cels. ij, 1, pag. 46, l. 20. — *Æginet.* j, 8. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69; t. iij, pag. 418; t. iv, pag. 663.

APHOR. XXVI. ¹ Nat. Human. xxiv, 5. — Coac. iij, 398. — IV. Morb. xxvij, 1, 2. = ² IV. Morb. xxvij, 9. = ³ VII. Epid. lj, 16. = ⁴ Cels. ij, 1, pag. 46, l. 26. — *Vide* van-Swieten; t. j, pag. 69; t. ij, pag. 571, 640, 641, t. iv, pag. 613.

Verticuli Extrusiones. An à Rachi-
R ij

tide? *Vide* Russel, *Æconom. Naturæ*, in Gland. pag. 73.

APHOR. XXVII. ^a Cels. ij, p. 46, l. 31. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 69; t. iv, p. 13, 14.

APHOR. XXVIII. ¹ Aph. ij, 45. — II. Prædict. xvj, 1, 3. = ^a Cels. ij, 1, p. 46, l. 34. = ^b Cels. ij, p. 47, l. 4. — Plin. xxvii, c. iv, pag. 689, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69.

APHOR. XXIX. ¹ Aph. v, 9; viij, 7. — Coac. iij, 260. = ² Morb. Sac. xiiij, 1. = ^a Cel. ij, 1, pag. 47, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69; t. ij, pag. 385, 531; t. iv, pag. 14.

APHOR. XXX. ¹ Coac. iij, 395. = ² Aër. Aq. Loc. iv, 7. — VII. Epid. xl, 19. = ^a Cels. ij, 1, pag. 47, 11. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69, t. ij, p. 385, 531.

APHOR. XXXI. ¹ Affect. xxix, 10.

IN SECTIONEM III. 101

==² Coac. iij, 395. ==^a Cels. ij, 1, pag. 47, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69, t. ij, pag. 733, t. iij, pag. 70, 264.



ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Α. ΤΑΣ κύσας φαρμακῶειν, ¹ ἢν ὀργᾶ, τείραμνα, καὶ ἄλλαι ἐπὶ τὰ μνηῶν· ἥσον δὲ ταύτας. ² τὰ δὲ νήπια, ^α ἐπρεσβύτερα, εὐλαδία χρῆ.

Β. Ἐν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἀγειν ἐν τῷ σώματι, ¹ ὅκοια καὶ αὐτόματα ἰόντα χρήσιμα· τὰ δὲ ἐναντίας ἰόντα, παύειν.

Γ. Ἦν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεαι, καθαίρων, ¹ συμφέρει τε ἐν εὐφώρας φέρει· τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

Δ. Φαρμακῶειν, ¹ θερεῖ μὲν, ^α μᾶλλον τὰς ἀνω· ² χειμῶν δὲ, τὰς κάτω.

S E C T I O Q U A R T A.

1. **P**RÆGNANTES purgandæ, ¹ si *materia* turgeat, quadrimestres, et usque ad septimum mensem : hæ verò minùs. ² Juniores autem, ³ et seniores *fætus*, cautè vitare oportet.

2. In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, ¹ qualia etiam spontè prodeuntia utilia sunt : contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

3. Si quidem, qualia purgari oportet, purgentur, confert, et facilè ferunt : contraria verò, difficulter.

4. Purgandum, ¹ æstate quidem, ² magis superiores *ventres* : ³ hyeme verò, inferiores.

5. Sub cane , et ante canem , ¹ difficiles sunt purgationes.

6. Graciles , ^a et facile vomentes , sursùm purgandi , vitantes hyemem.

7. Difficulter autem vomentes , et mediocriter carnosì , deorsùm , vitantes æstatem.

8. Tabidi verò , vitantes (purgationes) sursùm.

9. Melancholicos autem , uberiùs deorsùm *purgabis*. Eâdem ratione , contraria adhibens.

10. Purgandum in valdè acutis , ¹ si turgeat *materia* , ² eâdem die : morari enim in talibus malum est.

11. Quibus tormina , ^a et circa umbilicum dolores , et lumborum dolor , qui neque purgante , neque aliter solvitur , ¹ in hydropem siccum firmatur.

SECTIO IV. 105

ε. Ὑπὸ κύνα, εἰς πρὸ κυνὸς, ἰ ἐργά-
δες αἱ φαρμακεῖαι.

ς. Τὰς ἰχνύς, αἰ εἰσημέας, ἄνω
φαρμακεύειν, ὑποσελομήδες χειμῶνα.

ζ. Τὰς ἰ δυσημέας, καὶ μέσως
εὐσάρκας, κάτω, ὑποσελομήδες θέ-
ρος.

η. Τὰς ἰ φθινώδεας, ὑποσελομήδες
τὰς ἄνω (φαρμακεῖας.)

θ. Τὰς ἰ μελαγχολικὰς, ἀδροί-
ως τὰς κάτω. τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰ-
ναντία προσθεῖς.

ι. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίβυ ὀξέσιν,
ἢ ὀργῃ, αὐθημερόν· χρονίζειν γὰρ
ἐν τοῖσι τοιςτοις, κακόν.

ια. Ὅκοσοιςι σρόφοι, αἰ εἰς πρὸ τῷ
ὀμφαλὸν πόνοι, εἰς ὀσφύθι ἀλγῆμα,
μὴ λυόμηνον, μήτε ὑπὸ φαρμακεῖας,
μήτ' ἄλλως, ἰ ἐς ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρύει).

15. Ὀκόσοισι κοιλίαν λειεντερεῶ-
δες , χειμῶν^Θ Φαρμακεύειν ἄνα ,
κακόν.

16. Πρὸς τὰς ἐλλέθορας , τοῖσι μὴ
ρήιδίως ἄνα καθαρομύοισι , πρὸ τ'
πόσι^Θ πρὸϋγραίνειν τὰ ^α σώματα ,
πλείονι τροφῇ , ἐ ἀναπαύσει.

17. Ἐπὴν πῆ τις ἐλλέθορον , πρὸς
μὲν τὰς κινήσιας τῇ^ρ σώματων μᾶλ-
λον ἄγειν · πρὸς δὲ τὰς ὑπνους , καὶ
μὴ κινήσιας , ἥσων. δηλοῖ δὲ ἐ ἡ
ναυσιλίη , ὅτι ¹ κίνησις τὰ σώματα
ταράσσει.

18. Ἐπὴν βέλῃ μᾶλλον ἄγειν τ' ἐλλέ-
θορον , κίνει τὸ σῶμα · ἐπὴν ᾧ παῦ-
σαι , ¹ ὑπνον ποιεῖ ἐ μὴ κίνει.

19. Ἐλλέθορ^Θ ὑπκίνδυν^Θ τοῖσι
τὰς ^α σάρκας ὑγιέας ἔχουσι · ¹ πασ-
μον γὰρ ἐμποιέει.

S E C T I O I V. 107

12. Quibus alvi sunt lentericæ , eos hyeme sursum purgare! , malum.

13. Ad elleboros , qui non faciliè sursum purgantur , *iis* ante potionem corpora ^a præhumectanda , copiosiore alimento , et quiete.

14. Ubi biberit quis elleborum , ad motiones quidem corporum magis ducito : ad somnos verò , et quietem , minùs. Declarat autem etiam navigatio , quòd ¹ motus turbat corpora.

15. Quando vis magis ducere elleborum , moveto corpus : quando verò cessare , ¹ somnum facito , et non moveto.

16. Elleborus periculosus est sanas ^a carnes habentibus : ¹ convulsionem enim inducit.

108 H I P P. A P H O R.

17. Non febricitanti appetitûs dejectus, et oris ventriculi morsus, ¹ et tenebricosa vertigo, et os ^a amarescens, sursùm purgante opus esse, indicat.

18. Supra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursùm purgante opus esse indicant; qui verò infra, deorsùm.

19. Qui in purgantium potionibus non sitiunt, dum purgantur, non cessant priusquam sitiverint.

20. Non febricitantibus si fiat tormen, et genuum gravitas, et lumborum dolor, deorsùm purgante opus esse indicat.

21. ¹ Dejectiones ^a nigræ, ² qualis sanguis niger, ³ spontè prodeuntes, et cum febre, et sine febre, pessimæ; ⁴ et, quanto colores dejectio-

ιβ'. Ἀπυρέτω ἰόντι δ' ὑποσίλη , & καρδιωγμός , ¹ & σκολόδιον , καὶ φόμα ² ἐκπικρόμενον , ἄνω φαρμακείης δειῖας σημαίνει.

ιγ'. Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνήματα , ὅκονα καθάρσιον δέον , ἄνω φαρμακείης δειῖας , σημαίνει · ὅκονα ᾗ κάτω , πάλω .

ιδ'. Ὅκονοι ἐν τῇσι φαρμακοποιήσιν μὴ διεψῶσι καθαγρόμενοι , & παύον , πρὶν ἢ διεψήσωσιν .

ιε'. Ἀπυρέτοις ἔχουσιν ἢ γένηται εἶδος , & γενάτων βάρ , καὶ ὀσφύον ἄλγημα , κάτω φαρμακείης δειῖας σημαίνει .

ις'. ¹ Ὑποχωρήματα ² μέλανα , ὁκοῖον αἷμα μέλαν , ³ ἀπ' αὐτομάτης ἰόντα , καὶ ξὺν πυρετῷ , & ἀνδύ πυρετῷ , κάκιον · ⁴ καὶ , ὅκονα ἂν τὰ

χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω πονη-
ρότερα ἢ, μᾶλλον κάκιον· ζὺν φαρ-
μάκῳ ῥ, ἀμεινον· ἰ κὴ ὁκόσω ἂν χρώ-
ματα πλείω, ῥ πονηρά.

κβ'. Νεσημάτων ὁκόσων δρχομύων,
ἢν χολή ^α μέλανα, ἢ ἄνω, ἢ κάτω
ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

κγ'. Ὅκόσοισιν ἐκ νεσημάτων ^α
ὀξέων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τρα-
μάτων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτυνομύοις,
χολή μέλανα, ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν
ἐπέλθῃ, τῇ ὑσεράῃ δσπεθνήσκει.

κδ'. Δυσεντερίῃ, ἢν ἀπὸ χολῆς με-
λαίνης ἀρξῇ, θανάσιμον.

κε'. Αἷμα ἄνω μὴ, ὁκοῖον ἂν ἦ,
κακόν· κάτω ῥ, ἀγαθόν, μέλαν ὑπο-
χωρέον.

κς'. *Ἦν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομύων
οῖον ^ι σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανά-
σιμον.

S E C T I O I V. 111

num plures fuerint peiores, eò deterius : cum purgante verò , melius ;⁵ et quantò colores plures , non mali sunt.

22. Morbis quibusvis incipientibus , si bilis atra , vel sursùm , vel deorsùm prodierit , lethale.

23. Quibuscunque ex morbis acutis , aut ex diuturnis , aut ex vulneribus , aut aliter quocunque modo extenuatis , bilis atra ,¹ vel qualiscunque sanguis niger prodierit , postridiè moriuntur.

24. Dysenteria , si ab atra bile inceperit , lethale.

25. Sanguis sursùm quidem , qualiscunque sit , malum : deorsùm verò , bonum , niger subtùs secedens.

26. Si à dysenteria detento velut¹ carunculæ secesserint , lethale est.

27. Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, his in resectionibus alvi humectantur.

28. Quibus ^a biliosæ sunt egestionēs, surditate superveniente, cessant: et, quibus surditas est, biliosis supervenientibus, cessat.

29. Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, ^a difficulter judicantur.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quâcumque horâ dimiserit febris, postridie eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

31. ¹ Lassatis per febres ^a ad articulos, et circa maxillas maximè, abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo resurgenti-

SECTIO IV. 113

κζ'. 'Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν αἰμορραγίῃ πληθῶν ὀκοθενῶν, ἐν τῇσιν ἀναλήψειςι, τετέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραίνον').

κή. 'Οκόσοισι ^α χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφώσι' ἐπιγινωμνής, παύε'). κὴ ὀκόσοισι κώφωσις, χολωδέων ἐπιγινωμνῶν, παύε').

κθ'. 'Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν ^α ἐκλαίοισιν ἔσσι ρίγεα γίνεσθαι, δύσκριτα.

λ'. 'Οκόσοισι παροξυσμοὶ γίνον'), ἢν ἂν ὥρῳ ἀφῇ ὁ πυρελὸς, ἐς τὴν αὐριον τὴν αὐτὴν ὥρῳ ἢν λάβῃ, δύσκριτα.

λά. ^ι Τοῖσι κοπώδεσιν ^α ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν, ἐς ἄρθρα, κὴ πρὸς τὰς γνάθους μάλισα, αἱ λήπσεις γίνον').

λβ'. 'Οκόσοισι ᾧ ἀνταμνύουσιν ἐκ τῶ

νέσων τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίγνον).

λγ'. Ἀτὰρ, ἢν ἐ προπεπονηκός τι ἢ πρὸ φρονέειν, ἐνταῦθα σιγίζει ἡ νῆσος.

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρεῖς ἐχορμήσῃ, οἰδήματι μὴ ἐόντι ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξις ὀξείφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον.

λέ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῖ ἐχορμήσῃ ὁ τράχηλος ὀξείφνης ἐπιτραφῇ, καὶ μόλις καταπίνειν δύνη), οἰδήματι μὴ ἐόντι, θανάσιμον.

λς'. Ἰδρῶτες πυρεταίνουσιν ἢν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριῖα ἔτη, καὶ πεμπτηῖοι, καὶ ἑξομαῖοι, ἐ ἑννατηῖοι, ἐ ἑνδεκατηῖοι, ἐ τεσσαρεσκαδεκατηῖοι, καὶ ἑπτακαδεκατηῖοι, καὶ μίῃ ἐ εἰκοσῇ, ἐ ἑξοδόμῃ ἐ εἰκοσῇ, καὶ τριακοσῇ πρώτῃ, καὶ τριακοσῇ τετάρτῃ. ἔτοι γὰρ οἱ ἰδρῶτες

bus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

33. Sed et, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus,

34. Si à febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale.

35. Si à febre detento collum de repente inversum fuerit, et vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

36. Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertiâ, & quintâ, et septimâ, et nonâ, et undecimâ, et quartâ decimâ, et septimâ decimâ, et vigesimâ primâ, et vigesimâ septimâ, et trigesimâ primâ, et trigesimâ quartâ. Hi enim sudores

morbos judicant. ¹ Qui verò ita non fiunt, laborem significant, et morbi longitudinem, ² et recidivas.

37. Sudores frigidi, ^a cum acutâ quidam febre evenientes, mortem; cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

38. Et quâ corporis parte inest sudor, ^a ibi morbum esse indicat.

39. Et quâ corporis parte ^a inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, et si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, ^a aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

41. ¹ Sudor multus à somno, citra causam manifestam factus, corpus uberiore alimento uti significat. ² Si

SECTIO IV. 117

νέσας κρίνουν. ¹ οἱ ᾧ μὴ ἔτως γινόμενοι, πόνον σημαίνουν, καὶ μήκ^ς νέσας, καὶ ² ὑποπροπιασμέας.

λζ'. Οἱ ψυχροὶ ^α ἰδρῶτες, ξὺν μὲν ὅξει πυρετῷ γινόμενοι, θάνατον· ξὺν πρηϋτέρῳ ᾧ, μήκ^ς νέσας σημαίνουν.

λη'. Καὶ ὅκ^ς ἐνὶ τῷ σώματι ἰδρῶς, ^α ἐνλαῦθα φράζει τὴν νέσον.

λθ'. Καὶ ὅκ^ς ἐνὶ τῷ ^α σώματι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐνλαῦθα ἢ νέσας.

μ'. Καὶ ὅκ^ς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μετὰ τὴν ἰσχυρίαν, ἢ ἢν τὸ σῶμα ^α κατὰ φύσιν, ἢ αὐθις θερμαίνῃ, ἢ χρῶμα ἕτερον ἔξ ἑτέρου γίγνη, μήκος νέσας σημαίνει.

μά'. ¹ Ἰδρῶς πολὺς ἔξ ὕπνου ἀνδρὸς φανερῆς αἰτίας γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ χρέε. ² ἢν δὲ τροφήν μὴ λαμβάνοντι τῷτο

γίγνη), σημαίνει ὅτι κενώσει δέε).

μδ'. Ἰδρὼς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς, αἰεὶ ῥέων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων νῦσον σημαίνει.

μγ'. Οἱ πυρετοὶ ^α ὁκόσοι μὴ ἀλαλείπωντες ἀλλὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι· ὅτῳ δὲ ἂν τρόπῳ ^β ἀλαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

μδ'. Ὅκόσοισι πυρετοὶ μακροί, ^α τετάρτοις φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγγίνον).

μέ. Ὅκόσοις φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνον), ἔτοις σιτίοις πλείοσι χρέον).

μς'. Ἦν ῥίγῃ ἐπιπίπτῃ πυρετῷ μὴ ^α ἀλαλείπωντι, ἤδη ἀσθενεῖ ἐόντι, θανάσιμον.

S E C T I O IV. 119

verò cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

43. Febres ^a quæcunque non intermittentes tertiâ *die* vehementiores fiunt, magis periculosæ: quocunque autem modo intermittant, ^b quòd sine periculo *sint* significat.

44. Quibus febres longæ ^a, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

46. Si rigor incidat feбри non intermittenti, ^a debili jam existente ægro, lethale.

47. Exscreationes in febribus non intermittentibus lividæ, ¹ et cruentæ, et graveolentes, et biliosæ, omnes malæ sunt. At probè secedentes, bonæ. ² Et *eadem ratio est* quod ad *alvi* egestionem, et quod ad urinas. ³ Si verò nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

48. In non intermittentibus febribus, ¹ si externa quidem frigida sint, ² interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

49. In febre non intermittente, ³ si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

50. Ubi in febre non intermitten-

μζ'. Αἱ δ' ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι
 πυρελοῖσι μὴ ἀλαλείωσιν αἱ πελι-
 δναί, ¹ ἢ αἱματώδεις, ἢ δυσώδεις,
 ἢ χολώδεις, πᾶσαι κακαί. δ' ἀποχω-
 ρῶσαι ἢ καλῶς, ἀγαθαί. ² ἢ κτ' τὰς
 ἀσχωρήσιας, ἢ κτ' τὰ ἔσχα. ³ ἢν ἢ
 μή τι τ' ξυμφερόντων ἐκκρίνηται ἀπὸ
 τόπων τέτων, κακόν.

μν'. Ἐν τοῖσι μὴ ἀλαλείωσιν πυρε-
 τοῖσιν, ¹ ἢν τὰ μὲν ἔξω ^a ψυχρὰ ἢ,
 τὰ ἢ ἐνδον καίηται, καὶ δίψῳ ἔχη,
 θανάσιμον.

μθ'. Ἐν μὴ ἀλαλείωντι πυρετῷ,
 ἢν χεῖλ ^a ἢ ὀφρύς, ἢ ὀφθαλμός,
 ἢ ρίς ἀσφαφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢν
 μὴ ἀκῆ, ἢ δὴ ἀσθενέτω ἐόντι ^a σώ-
 ματι ^a, ὅ, τι ἂν τετέων γένῃ, ἐγγὺς
 ὁ θάνατος.

ν'. Ὅσα ἂν ἐν πυρετῷ μὴ ἀλαλεί-

πονί^α δύσπνοια γένη), κὲ πα~~θη~~-
φροσύνη, θανάσιμον.

νά. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν λήψήματα,
^α μὴ λυόμηναι πρὸς τὰς πρώτας κρί-
σιαις, μῆ~~κ~~ νέ~~σ~~ σημαίνει.

νδ'. Ὀκόσοι ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν, ἢ
ἐν τῇσιν ἀλλήσιν ἀρρώσίσῃσι, κτ' προαί-
ρεσιν δακρύουσιν, ^α ἔδ' ἐν ἄτοπον. ^ι
Ὀκόσοι ἢ μὴ κτ' προαίρεσιν, ἄτοπώ-
τερον.

νγ'. Ὀκόσοισι ἢ ἐπὶ τῷ ἑδόνῳ^α ἐν
τοῖσι πυρελοῖσι πείγλιχρα γίνε), ἰχυ-
ρότεροι γίνον) οἱ πυρελοί.

νδ'. Ὀκόσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ^α
ξηραὶ, βραχέα ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρε-
τοῖσι καυσώδεσιν, ἔ πάνυ τοι διψώ-
δées εἰσιν.

νέ. Οἱ ἐπὶ βεβῶσι πυρετοὶ, πάντες
κακοὶ, πλὴν τῶν ^α ἐφημέρων.

S E C T I O I V. 123

te ^a difficultas spirandi et delirium fit, lethale.

51. In febribus abscessus, ^a qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

52. Quicumque in febribus, aut in cæteris infirmitatibus, ex proposito (i. e. *ob causam*) lacrymantur ^a, nihil inconveniens: ¹ qui verò non ex proposito, magis inconveniens.

53. Quibus in febrè ad dentes viscosa ^a circumnascuntur, *his* febres fiunt vehementiores.

54. Quibus diu tusses siccae ^a, paulùm irritantes, in febribus ardentibus, non admodùm siticulosi sunt.

55. In bubonibus febres, omnes malæ, præter ^a ephemeræ.

56. ¹ Febricitanti sudor superveniens, febre ^a non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, ² et copiosiore humiditatem indicat.

57. A convulsione aut tetano ^a detento febris superveniens solvit morbum.

58. A febre ardente detento, ^a rigore superveniente, solutio (fit).

59. ¹ Tertianæ exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

60. ¹ Quibus in febre aures obsurderint, ^a his sanguis è naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

62. Quibus in febre morbus regius^a

SECTIO IV. 125

νς'. ¹ Πυρέσονται ιδρώς ἐπιγενόμε-
νῳ, μὴ ^α ἐκλείποντι ὃ πυρετῷ,
κακόν. μηκύνει γὰρ ἢ νῆσθι, ² καὶ
ὕγρασίῳ πλείω σημαίνει.

νζ'. Ὑπὸ σπασμῷ ἢ τετάνη ^α ἐνο-
χλημῶ πυρετὸς ἐπιγενόμενῳ λύει
τὸ νῆσημα.

νη'. Ὑπὸ καύσεως ^α ἐχοιμῶ, ἐπιγενο-
μέως ῥίγιθι, λύσις (γίνεθι).

νθ'. ¹ Τριῖα ἄκριθις κρίνεθι ἐν
ἐσπᾶ πεισίοδοις τὸ μακρότατον.

ξ'. ¹ Ὅκοσοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσι τὰ ὦτα ^α κωφῶθῃ, αἷμα ἐκ
ῥινῶν ῥυέν, ἢ κοιλίῃ ἐκαραχθεῖσα,
λύει τὸ νῆσημα.

ξά. Πυρέσονται, ἢν μὴ πεισῶσιν
ἡμέρησιν ^α ἀφ᾽ ἧς οὗ πυρετὸς, ὑποτρο-
πιάζεν εἴωθεν.

ξβ'. Ὅκοσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν

ἴκτεροι ^α ὀπιγί(νον) πρὸ τῆς ἐπὶ τὰ ἡμε-
ρῶν, κακόν. (ἢν μὴ ξυνδύσεις ἐγρῶν
κτὶ τὴν κοιλίῳ γένων).

ξγ'. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι
καθ' ἡμέρῳ ρίγεια γίνε), καθ' ἡμέ-
ρῳ οἱ πυρελοὶ λύον).

ξδ'. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι
τῇ ^α ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδε-
κάτῃ, ἢ τεσσαρεσκαδεκάτῃ ἴκτεροι
ὀπιγί(νον), ἀγαθόν. ¹ ἢν μὴ τὸ δεξιὸν
ὑπερχόνδριον (κληρὸν ἢ ἢν ᾧ μὴ, σὺν
ἀγαθόν.

ξε'. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσι πρὸς τὴν κοι-
λίῳ καῦμα ἰχυρὸν, καὶ καρδιασμός,
κακόν.

ξς'. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν ὀξείσιν ^{1 α}
οἱ σπασμοὶ, καὶ οἱ πρὸς τὰ σπλάγχνα
πόννοι ἰχυροὶ, κακόν.

ξζ'. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν οἱ ἐκ τῆς

S E C T I O IV. 127

supervenit ante septimum diem , malum est. (Nisi confluxus humorum per alvum fiant).

63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus in febre septima, aut nona, ^a aut undecima, aut quattodecima morbus regius supervenit, bonum est: ¹ nisi dextrum hypochondrium durum sit; alioqui, non bonum.

65. In febribus circa ventrem æstus vehemens, et oris ventriculi dolor, malum.

66. In febribus acutis ¹ ^a convulsiones, et circa viscera dolores vehementes, malum.

67. In febribus, ex somnis ^a pa-

vores , aut convulsiones , malum.

68. In febribus spiritus offendens , malum : ^a convulsionem enim significat.

69. Quibus urinæ crassæ , grumossæ , paucæ , non sine febre , copia ex his succedens tenuis , juvat. Tales autem *iis* maximè prodeunt , quibus ab initio *morbi* , aut brevi post , subsidentiam continent.

70. Quibus autem in febre urinæ conturbatæ , qualis jumentorum , his capitis dolores , aut adsunt , aut aderunt.

71. Quibus *morbi* septimâ die judicantur , iis nubeculam rubram *urina die quartâ* continet , ¹ et cætera secundum rationem.

72. Quibus urinæ pellucidæ , ² albæ ,

ὑπῶνων ^α φόβοι, ἢ σπασμοὶ, κακόν.

ξή. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπων, κακόν· ^α σπασμὸν γδ' ζημάνει.

ξθ'. Ὅκόσοισιν ἔρα παχέα, θρομβώδεια, ὀλίγα, σπκ ἀπυρέτοις, πληθῆ· ἐπελθὼν ἐκ τριέων λεπτῶν, ἀφελεί. μάλιστα ᾧ τὰ τοιαῦτα ἔρχε), οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀπὸ ταχέων, ὑπόσασιν ἴχει.

ό. Ὅκόσοισι ᾧ ἐν πυρελοῖσι τὰ ἔρα ἀναλειαραγμῆα, οἷον ὑποζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγία ἢ πάρειςιν, ἢ παρέςον).

οά. Ὅκόσοισι ἐβδομαῖα κρίνε), τετέοισιν ὀπνέφελον ἴχει τὸ ἔρον τῇ τελάρτη ἐρυθρὸν, ¹ καὶ τὰλλα καὶ λόγον.

οβ'. Ὅκόσοισιν ἔρα λευκανέα, ^α

λούκᾱ , πονηρά . μάλαςα ᾗ ἐν τοῖσιν
φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνε).

ογ'. ¹ Ὀκόσοισιν ὑποχόνδρια με-
τέωρα ^α Διδωροδορίζοντα, ὁσφύθ αλ-
γίμαλθ ἐπιγλυομήν, αἱ κοιλίαι τε-
τέοισι καλυφραίνον). ἢν μὴ φύσαι κα-
ταρράγέωσιν, ἢ ἔρῃ πληθθ ἐπέλθῃ.
ἐν πυρελοῖσι ᾗ ταῦτα.

οδ'. ¹ Ὀκόσοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα
ἀφίστασθ, ῥύε) τ' ἀπασάσιθ ἔρον
πολὺ, ἐ ^α παχὺ, ἐ λούκον γιγνώ-
μενον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρε-
τοῖσι τελαρλιάσειν ἀρχε) ἐνίαισι γί-
γνεαθ. ἢν ᾗ ἐ ἐκ τῶν ῥινῶν ἀμορρά-
γήσῃ, κὲ πάνυ ταχὺ λύε).

οε'. Ἦν ^α αἷμα, ¹ ἢ ^β πῦον ἔρέη,
τῶν νεφρῶν, ἢ τ' κύσιθ ἐλκωσιν ση-
μαίνει.

ος. Ὀκόσοισιν ἐν τῷ ἔρῳ παχεῖ

S E C T I O I V. 131

malæ. Maximè autem in phreniticis observantur.

73. ¹ Quibus hypochondria elevata^a sunt murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur : nisi flatus eruperint , aut urinæ copïa prodierit. In febribus autem hæc.

74. ¹ Quibus spes est abscessum fore ad articulos , eos abscessu liberat urina multa , et crassa , et ^a alba reddita , qualis in febribus cum lassitudine quartâ die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit , brevi admodum solvit.

75. Si ^a quis sanguinem , ¹ aut ^b pus mingat , renum , aut vesicæ exulcerationem significat.

76. Quibus in urinâ crassâ exis-

tente ¹ carunculæ ² parvæ, aut veluti
pili unâ exeunt, his de renibus ex-
cernuntur.

77. Quibus in urinâ crassâ existen-
te furfuracea simul minguntur, iis
vesica scabie laborat.

78. ¹ Qui spontè sanguinem min-
gunt, ² his à renibus venæ ruptionem
significat.

79. ¹ Quibus in urinâ arenosa ² sub-
sident, illis vesica calculo laborat.

80. Si *quis* sanguinem mingat, et
grumos, et ² urinæ stillicidium ha-
beat, et dolor incidat ad inum ven-
trem, et perinæum, partes circa ve-
sicam laborant.

81. Si *quis* sanguinem et pus min-
gat, et squamas, et odor gravis sit, ²
vesicæ exulcerationem significat.

SECTIO IV. 133

ἐόντι ἰσχυρία^α μικρά, ἢ ὥσπερ τρί-
χες ξυνεξέρχον), τῷ τῷ τῷ τῷ νε-
φρῶν ἐκκρίνε).

οζ'. Ὁκόσοισιν ἐν τῷ ἔργῳ παχεῖ
ἐόντι πιπυρώδεα ξυνεξέρχεται), τῷ τῷ τῷ
ἢ κύστις ψωρῶ.

οή'. Ὁκόσοι δὲ ταυτομάτως αἷμα
^α ἔρρεσι, τῷ τῷ τῷ τῷ νεφρῶν
φλεβίᾳ ῥήξιν σημαίνει.

οθ'. Ὁκόσοισιν ἐν τῷ ἔργῳ ψαμ-
μώδεα^α ὑφίσταται), τῷ τῷ τῷ τῷ
λιθία.

πί'. Ἦν αἷμα ἔρρη, καὶ θρόμβος,
ἐ^α τραγυρίῳ ἔχη, ἐ^α ὁδύνῃ ἐμ-
πίπτῃ ἐς τὸ ὑπογάστριον, καὶ ἐς τὸ
πείλαιον, τὰ αὖτε τὴν κύστιν πονεῖ.

πά'. Ἦν αἷμα ἐ^α πῦον ἔρρη, ἐ^α
λεπίδας, καὶ ὁσμὴ^α βαρεῖν ἢ, τῷ τῷ τῷ
ἐλκωσιν σημαίνει.

πδ'. Ὅκοσοισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φῦμα
 α φύε), τστέοισι, Δαπυήσαντες καὶ
 ἐκραγέντες, λύσεις.

πγ'. Οὕρῃσις νύκτωρ πολλὴ γίγ-
 νομένη, Ὀμικρὴν τὴν ἀποχάρεσιν ση-
 μαίνει.



S E C T I O I V. 135

82. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum ^a nascitur, his, suppurato eo et perrupto, solutio fit.

83. Mictio noctu multa contingens, parvam *alvi* dejectionem significat.



N O T Æ

I N

SECTIONEM QUARTAM.

APHOR. I. Aph. v, 29. = ¹ I, 22. =
² I. Morb. Mul. xlij, 8. = ^a Cels. ij,
 10, p. 78, l. 5. — *Vide* van-Swieten,
 t. iv, p. 411.

Intelligenda est Hippocratis sententia
 de validioribus purgantibus, quæ sola
 ab antiquioribus in usum vocabantur.
 Manna, Cassiam, Tamarindos, Sennam,
 quocumque graviditatis tempore, cum
 fructu recentiores exhibent, servatâ ta-
 men artis methodo.

APHOR. II. ¹ Aph. j, 2. — *Vide* van-
 Swieten, t. ij, p. 495, t. iij, p. 486.

APHOR. III. Aph. j, 25.

IN SECTIONEM IV. 137

APHOR. IV. ¹ V. Epid. xxv, 16, 17.
= ² Salub. Diæt. v, 10. = ^a Cels. j,
3, p. 29, l. 21,

Notum est minus humoris utilis per vomitum excludi, quàm per catharsim. Porro æstate deest humor, hyeme redundat. Hinc intelligitur cur sub cane aridis solidis, exustis humoribus, difficilior catharsis, cur et gracilibus minùs felix.

APHOR. V. Aër. Aq. Loc. xxx, 2, 5, 8. — Purgant. 5, 8. = ¹ Aph. ij, 37.

APHOR. VI. II. Morb. xij, 9. = ¹ Cels. j, 3, p. 29, l. 23.

Cur cavendus hyems? Quia vasa magis compacta magis resistunt; frigus enim quodam erethismo agit.

APHOR. VII. II. Morb. xij, 35.

Cur cavenda æstas, in mediocriter carnosus? Quòd catharsis exolvat corpo.

ra, quæ jam enervat tempestatis ariditas.

APHOR. VIII. Loc. in Hom, xxxv, 4. — Int. Affect. iv, 26, xij, 36.

APHOR. IX. Aër. Aq. Loc. xj, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Consilium de Melancholicis intelligendum, qui turgente atrâ bile infestantur; non de iis quibus fibra sensilior sine ullâ fere materiâ laborat. Unde maximâ in hoc applicando Aphorismo utendum est prudentiâ.

APHOR. X. ¹ Aph, j, 22, 24. = ² V. Epid. xxv, 16, 17.

APHOR. XI. Coac. ij, 279. = ^r Coac. iij, 286. = ^a Cels. ij, 7, p. 59, l. 13: — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 153.

Debilitatâ coctione, aër ex alimentis erumpit, et circum claustra intestinorum fremit: quæ si prædebilitata minùs resistant, dilatantur aëre agglomeratoq

in tympanitidem. *Vide* Pneumato-Pathologiam, Part. II.

APHOR. XII. In Lienteriâ , ait Galenus , ventriculi partes passæ sunt ; scattet aphtosis ulceribus tractus intestinalis , quæ à vomitu levamen nullum , sed malam irritationem sibi comparare possunt. Fiunt autem præcipuè hyeme à repercussæ perspirationis impetu talia ulcuscula.

APHOR. XIII. Aph. j , 22 ; ij , 9 ; vij , 70. — II. Diæt. xxxvj , 18 ad xxxvij. — Loc. in Hom. xl , 3. — Verat. Us. j , 1. — II. Morb. xij , 10 , ad 13. — Int. Affect. xxij , 31 ; xxix , 41 ; xlvij , 34. — I. Morb. Mul. xxv , 13 , 14 ; xxxj , 9. — Superfæt. xx , 1. =² Cels. ij , 12 , p. 86 , l. 6 ; ij , 13. pag. 87 , l. 23. — *Vide* van-Swieten , t. iij , p. 486.

APHOR. XIV. Verat. Us. j , 2 , 3. — VI. Epid. v , 45. =¹ Aph. ij , 51. =
Vide van-Swieten , t. iij , p. 486.

APHOR. XV. Verat. Us. j , 4. —

Superfæt. xx, 1. — VI. Epid. v, 45.
 = ¹ Aph. v, 27. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Hinc antiquum est illud Sydenhami præceptum, quo, purgatione peractâ, narcoticum ad somnos excitandos adhibet. Cæterum vide in utrumque hunc Aphorismum notas doctissimi de Villebrune.

APHOR. XVI. Aph. ij, 36, 37. — Verat. Us. j, 5. = ¹ Aph. v, 1. = ^a Cels. ij, 13, pag. 87, l. 24. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 237; t. iij, p. 486.

APHOR. XVII. Verat. Us. j, 10. — Affection. xiv, 12. = ¹ II. Morb. Mul. xxiv, 2, 3. = ^a Cels. j, 3, pag. 29, l. 31. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 202.

APHOR. XVIII. Verat. Us. j, 10, 11.

APHOR. XIX. Verat. Us. j, 6.

Hæc propositio ad validiora tantum

IN SECTIONEM IV. 141

catharseos instrumenta pertinet quibus olim utebantur antiquiores, non ad nostram alyi subductionem molliorem et facile mitigandam solorum diluentium usu.

APHOR. XX. Verat. Us. j, ii.

Hæc signa illicò purgandum non significant, sed non aliter morbum finire posse indicant.

APHOR. XXI. ¹ Prænot. x, 6. — Coac. iij, 36; vj, 22, ad 26, 42. = ² Aph. iv, 23. — Coac. iij, 1. = ³ Aph. j, 2. = ⁴ Coac. vj, 24. = ⁵ Aph. j, 2; ij, 14. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 19.

Melancholicum vocabant Veteres, degencrem, quem ex obstructis intra intestinalem tractum vasis videbant, vel per os, vel per anum effundi sanguinem, pessimo omine. Minus tamen mali ostenditur, si vis medicamenti, non verò fatiscens natura id effecerit. Vigere adhuc diversorum humorum intra intes-

tina secretionem, plurium humorum testatur excretio, de quâ pluries cum laude locutus est Hippocrates locis citatis.

APHOR. XXII. Coac. j, 100. =^a Cels. ij, 6, p. 55, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 496.

Præclusum omninò sanguini venoso aditum per obstructos venæ portarum fines, hinc exundare sanguinem atrum in intestina repulsum, symptoma illud vulgò indicat; vel venenum intùs enatum, à degeneri simul bile atque tabe-
factis cæteris humoribus pendens, acre, erodens, acidumque, instar aquæ stygiæ; undè utroque in casu metuenda prognosis quæ in Aphorismo sequenti continetur; minùs tamen in priori casu.

APHOR. XXIII. ¹ Aph. iv, 21. =^a Cels. ij, 6, p. 55, l. 34. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 496.

APHOR. XXIV. Coac. j, 100; iij, 292. — V. Epid. x, 2. =^a Cel. ij, 8,

IN SECTIONEM IV. 143

p. 74, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. iij, pag. 499.

APHOR. XXV. Aph. vij, 37. —
Coac. ij, 254; vj, 14.

Scilicet summè distinguendus est sanguis niger ab atrâ bile, secundum Hippocratem et Galenum. Hæc enim à pristinâ qualitate degener veneni qualitatem adepta est. Lege hîc observationes Cl. de Villebrune.

APHOR. XXVI. ¹ Aph. iv. 76.

APHOR. XXVII. Coac. j, 227, iij, 53.

Quamlibet magnam sanguinis profusionem sequitur relaxatio ingens; hinc viscerum concoctioni servientium debilitas summa quæ, vel diarrhœâ, vel hydrope excipiatur. Huc refer Sanctorii Aphoris. xiv, Sect. iij.

APHOR. XXVIII. Aph. iv, 60. —
Coac. ij, 66, 103; vj, 77. =^a Cels.

ij, 8, p. 70, l. 20. — *Vide* Epidemicas Hippocratis historias. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 358, 554.

APHOR. XXIX. Coar. j, 23. — VII. Epid. xl, 20. = ^a Cel. ij, 4, p. 51, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 443.

APHOR. XXX. Humor. iij, 91. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 522.

APHOR. XXXI. ¹ Humor. iij, 98. — IV. Epid. xvij, 16, 17. — Aph. ij, 5; iv, 74. = ^a Cels. ij, 7, pag. 65, l. 8. — *Vide* van Swieten, t. ij, pag. 409.

APHOR. XXXII. Humor. iij, 100. — *Vide* van - Swieten, t. ij, p. 53, 690, 723.

APHOR. XXXIII. Loc. in Hom. xxxvj, 6. — Humor. iij, 101. — IV. Epid. xxvij, 1, 2, 3. — VI. Epid. vij, 15 ad 19. — Vict. Acut. xlv, 2, 3. — *Vide* van - Swieten, t. ij, p. 723.

IN SECTIONEM IV. 145

APHOR. XXXIV. Aph. iv, 35. — Prænot. xxij, 3, 4. — Coac. j, 90; ij, iij, 201, 202, 221; 96. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 646.

APHOR. XXV. Aph. iv, 34; vij, 58. — Coac. ij, 221 ad 223. =^a Cels. j, 6, p. 55, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 646.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 24. — Judicat. j, 2; iv, 13. — Prænot. v, 1, 2, 3. — Coac. iv, 36. — I. Epid. iij, 38. — Ægin. xiv, 7. =¹ Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115. =² Aph. ij, 12; iv, 61, — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 80, 330, 426.

APHOR. XXXVII. Judicat. vj, 9, 10, viij, 12, 8. — Prænot. v, 4, 5. — Coac. iv, 40. =^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 30; 5, pag. 53, l. 17; 6, pag. 56, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 80.

APHOR. XXXVIII. Aph. ij, 5. =^a Cels. ij, 2, p. 48, l. 19.

APHOR. XXXIX. Judicat. viij . 3.
 = Cels. ij, p. 48, l. 15. — *Vide van-*
Swieten, t. ij, p. 288.

APHOR. XL. Aph. vij, 60. — Humor.
 iij, 22, 53. — Judication. viij, 4. — I.
 Prædic. vj, 4. — Coac. j, 77, 177. =
^a Cels. ij, 5, p. 53, l. 20.

Inconstantia symptomatum naturæ
 deesse firmum robur, quo ad legitimam
 coctionem crismque tendat, signum est.
Vide Sanctorium, Sect. j, Aph. 121.

APHOR. XLI. Aph. vij, 61. — ¹
 Coac. iv, 36. = ² Aph. ij, 8. — *Vide*
Sanctorium, Sect. iv, Aph. 3.

APHOR. XLII. Aph. vij, 61. —
 Judicat. viij, 9. — Coac. j, 21. — I.
 Morb. xxij, 26, ad xxij. — *Vide Sanc-*
torium, Sect. iv, Aph. 59.

APHOR. XLIII. Aph. vij, 62. —
 Coac. j, 166. — I. Epid. iij, 16. —
 VII. Epid. xl, 19. — Vict. Acut. iij,

IN SECTIONEM IV. 147

3. = ^a Cels. ij, 4, pag. 51, l. 33. =
^b Cels. ij, 3, pag. 49, l. 34; iij, 12, p.
 141, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij,
 p. 402.

Contraria de febribus intermittenti-
 bus docent Forestus, Morton, Torti.

APHOR. XLIV. Aph. vij, 63. —
 Humor. iij, 98. — Prænot. xxiv, 9,
 10, 11. — II. Prædict. 10, 7. — Coac.
 j, 168, 169. = ^a Cels. ij, 7, pag. 64,
 l. 2. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 671;
 t. ij, p. 67.

Febres ideò longæ sunt, quòd victrix
 natura uno ictu hostilem materiam pro-
 terere non possit. Hinc abscessus fre-
 quentiùs apud veteres emicabant, quòd
 mitiorum alvi laxantium usum nesci-
 rent.

APHOR. XLV. Aph. vij, 64. —
Vide van-Swieten, j, p. 671.

APHOR. XLVI. Coac. j, 15. = ^r
 Cels. ij, 6, p. 55, l. 21. — *Vide* Sanc-
 torium, Sect. j, Aph. 121.

Bb ij

APHOR. XLVII. Aph. vij, 69. —
Coac. ij, 161. =¹ Coac. iij, 148. =
² Prænot. xv, 10. =³ Aph. j, 25. —
Vide van-Swieten, t. j, p. 703; t. ij,
p. 725.

APHOR. XLVIII. Aph. vij, 72. —
Prænot. viij, 11; xiv, 12, 13; xv, 6,
ad 10. — Coac. j, 165; iij, 345. — I.
Morb. xxvij, 15. — Affection. xj, 5.
=¹ Aph. vij, 1, 26. — II. Morb. xvj.
2; xxxvij, 1, ad 5. =^a Cels. ij, 4, p.
51, l. 25. ij, 6, p. 55, l. 21; 14, p. 90,
l. 22.

APHOR. XLIX. Aph. vij, 73. —
Prænot. iij, 3. — Coac. j, 104. =
^a Cels. ij, 6, p. 54, l. 24. — *Vide* van-
Swieten, t. ij, p. 396.

APHOR. L. Judication. viij, 17. —
Prænot. iv, 20; xiv, 9; xv, 3. — *Vide*
van-Swieten, tom. ij, pag. 69, 390,
442.

APHOR. LI. ^a Cels. ij, 5, pag. 53
l. 22. — *Vide* hîc notas Cl. de Ville-
brune huic intelligendæ propositioni ne-

IN SECTIONEM IV. 149

cessarias ; ubi *μωλύμενα* *recedentia*, sufficitur in locum *μὴ λυόμενα*, *qui non solvuntur*.

APHOR. LII. Aph. viij, 2. — Prænot. ij, 18, ad 21. — IV. Epid. xxvij, 12. — VI. Epid. j, 42. = ¹ I. Epid. ij, 176. — VI. Epid. viij, 34. = ^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 397.

APHOR. LIII. Coac. ij, 153. — IV. Epid. xxvij, 13. = ^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 15. — *Vide* van-Swieten, tom ij, p. 140.

APHOR. LIV. VI. Epid. ij, 43. = ^a Cels. iij, 7, p. 135, l. 31. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 407.

APHOR. LV. II. Epid. iij, 60. = ^a Cels. ij, 3, pag. 49, l. 34. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 669.

Lege hîc observationes D. de Villebrune, et Riegerum in hunc Aphorismum.

APHOR. LVI. Judication. viij, 6. — Coac. iv, 36. — II. Morb. xxxvj,

12. = ¹ I. Prædict. vij, 8. = ² Aph. vij, 61. = ² Cels. ij, 5, p. 53, l. 19.

APHOR. LVII Aph. ij, 26; v, 70. — Loc. in Hom. xlvij, 6. — Judication. xij, 10. — Coac. j, 231; iij, 80, ad 84. — San. Tuend. ad Dem. 10. — I. Morb. vj, 13, 14. = ² Cels. ij, 1, pag 45, l. 1, 2, 3; ij, 8, p. 70, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 328.

APHOR. LVIII. Judication. xj, 9, 16. — Coac. j, 188. = ² Cels. ij, 8, pag. 70, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 442.

APHOR. LIX. Judication. iv, 10. — Coac. j, 212. — I. Epid. iij, 26. — I. Epid. iij, 82. = ¹ Prænot. xxv, 11.

Propositio de vernalibus solis intelligenda, non de iis quæ autumnò erumpunt et rarò admodum simplices sunt.

APHOR. LX. Aph. iv, 28. — Judicat. xj, 11, 12, 13 — Coac. ij, 66, 99, 100, 103; vj, 77, 78. = ¹ Coac.

IN SECTIONEM IV. 151

ij, 72. — ^a Cels. ij, 8, pag. 70, l. 18.

APHOR. LXI. Humor. iij, 91. — Judicat. ix, 11. — Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115, 210. — I. Epid. iij, 40. II. Epid. v, 30; vj, 18. — IV. Morb. xix, 10, 11; xx, 8, 12, 15. = ^a Cels. iij, 4, pag. 121, l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 427.

Doctè herclè et criticè de hoc Aphorismo Cl. de Villebrune, qui hîc exscribendus foret.

APHOR. LXII. Judicat. iij, 5, 18, 20. — Coac. j, 172. — III. Epid. j, Ægrot. ij, 13, 16. I. Morb. vj, 2. — Vict. Acut. liv, 3, 4. = ^a Cels. ij, 4, pag. 52, l. 7; iij, 24, pag. 175, l. 9. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, pag. 138.

APHOR. LXIII. Judicat. xj, 16.

Paroxysmi solvuntur in febre, etiam non intermittente. Nam rigor jam retusam priùs supponit febris violentam vim.

APHOR. LXIV. Judicat. iij, 5, 18, 20; iv, 11. — Coac. j, 173. — I. Epid. ij, 120. — I. Morb. vj, 2. =
¹ Aph. vj, 42. = ^a Cels. iij, 42, pag. 175, l. 7. — *Vide* van-Swieten, t. iij, pag. 139.

APHOR. LXV. *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 289.

APHOR. LXVI. Coac. ij, 207. =
¹ Vid. Aph. ij, 26. = ^a Cels. ij, 4, p. 52, l. 11. *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 442.

APHOR. LXVII. Aph. ij, 1. = ^a Cels. ij, 4, pag. 52, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 398.

APHOR. LXVIII. Vict. Acut. xxj, 21. — I. Morb. Mul. v, 7. = ^a Cels. ij, 7, p. 64, l. 4.

Offendens dicitur spiritus, in quo inspiratio quasi intercepta pluribus redintegratur vicibus. Res, vel à debilitate organorum per morbum acquisitâ, vel

IN SECTIONEM IV. 153

à natis intra vasa pulmonalia repagulis, vel à nervorum convulsione pendet. *Vide* Galenum de differentiis respirationis, cap. VIII. Prosp. Alpinum, de præsagiendâ vitâ et morte, lib. IV.

APHOR. LXIX. Coac. v, 80, 81.

APHOR. LXX. Coac. v. 46. — VII. Epid. liv. 5, 6, 10, 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 394.

APHOR. LXXI. Judicat. vj, 2; ix, 8. — Coac. j, 213; v, 5, 82. =¹ Aph. j, 12. — *Vide* Solano, Part. I, Sect. 2, cap. 3, Observ. 3. van-Swieten, t. ij, p. 431.

APHOR. LXXII. I. Prædic. xx, 5; j, 6. =² Cels. ij, 4, pag. 52, l. 25, — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 324.

APHOR. LXXIII. Coac. ij, 240, 241, 257. — Prænot. x, 14. =¹ Aphor. v, 64. — Sal. Diæt. v, 10. =² Cels. ij, 3, p. 50, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 495.

APHOR. LXXIV. Humor. xj, 13, ad 16. — Judicat. x, 4, ad 7. — VI. Epid. iv, 3, ad 6. = ¹ Prænot. xj, 17. — II. Prædic. x, 7. = ^a Cels. ij, 7, p. 60, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 53, 76, 83, 672.

APHOR. LXXV. Aph. iv, 78, 81. — Int. Affect. xvj, 4, 5. = ¹ Nat. Human. xxvj, 4. — Prænot. xix, 11. = ^a Cels. ij, 7, pag. 60, l. 28. = ^b Genit. ij, 8. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 238.

APHOR. LXXVI. Nat. Human. xxvj, 5. ¹ = Aph. iv, 26. — Cap. Vuln. ij, 4. = ^a Cels. ij, p. 60, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVII. Nat. Human. xxvj, 6. — Prænot. xj, 8, 10.

Si suppurent renes, complicata per ureteres abripiuntur vascula; si vesica ulcere laboret, internæ membranæ fossia dejiciuntur. *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVIII. Aph. iv, 75. — Nat. Human. xxvj, 4. = ¹ Int. Affec.

IN SECTIONEM IV. 155

xvj, 4. =^a Cels. ij, 7, p. 60, l. 27, 33;
p. 61, l. 7.

APHOR. LXXIX. IV. Morb. xxix, 13,
ad xxx. — Int. Affect. xv, 10, 11. =ⁱ
Nat. Human. xxvj, 1. =^a Cels. ij, 7,
p. 61, l. 16.

Id est calculus iis metuendus est; nam
sæpè et arenæ sine calculo in vesicâ min-
guntur, et calculus in vesicâ perstat, sine
ullâ arenarum emissionem.

APHOR. LXXX. Aph. vij, 39. —
^a Cels. ij, 7, p. 61, l. 15, et seq.

APHOR. LXXXI. Aph. iv, 75. =
^a Cels. ij, 7, p. 60, l. 31.

APHOR. LXXXII. Aph. vij, 57. —
Coac. iij, 311, 312. =^a Cel. ij, 8, p.
70, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. j, p.
771; t. v, p. 428.

APHOR. LXXXIII. II. Diæt. xl, 10,
ad 17. — IV. Morb. vij, 4, &c. — *Vide*
van-Swieten, t. ij, p. 33. — *Vide* et
Sanctorium, Sect. I. de Ponderatione,
Aph. 89, 94, &c. V. Gorterum, de
perspiratione, talia phænomena passim
explanantem.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

α'. ΣΠΑΣΜΟΣ ἔξ^α ἐλλεδόρου,
θανάσιμον.

β'. Ἐπὶ τρώματι^α σπασμὸς ἐπι-
γλυόμενος, θανάσιμον.

γ'. Αἵματι πολλῷ^α ρυέντι, ^α
σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος,
κακόν.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει^α σπασμὸς,
ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος, κακόν.

ε'. Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωος τις
γένηται, ^α σπασθεὶς ἀπεθνήσκει, ἢν
μὲν πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην
ἐλθὼν, καθ' ἣν αἰ κρατῶνται λύον^τ,
φθέγγει^τ.

ς'. Ὅσοι ὑπὸ^α τετάνε ἀλί-

SECTIO QUINTA.

1. **C**ONVULSIO ab ^a elleboro, lethale.

2. Vulneri convulsio ^a superveniens, lethale.

3. Sanguine multo effuso, ^a convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. Purgationi immodicæ ^a convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5. ¹ Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, ^a convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

6. Qui à tetano ^a corripiuntur, in

D d

quatuor diebus pereunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt.

7. ¹ Quibus epilepsiæ ² ante pubertatem contingunt, mutationem habent. ² Quibus verò accidunt viginti quinque annos *natis*, his plerumque commoriuntur.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecim diebus, his in suppurationem convertitur.

9. Tabes maximè fit ætatibus ab anno octavo decimo ^a usque ad quintum trigesimum.

10. Quibus anginam effugientibus ^a ad pulmonem vertitur, in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, suppurati fiunt.

σκονῃ, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλ-
λυνῃ. ἢν δὲ ταύτας ἀφαφύγωσιν, ὑγίειες
γίνονῃ.

ζ'.¹ Τὰ ὀπληστικά^α ὁκόσοισι πρὸ
τῆς ἡβῆς γίνεῃ, μετὰ τῶσιν ἴχει.²
ὁκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γί-
νεῃ, τετέοισι τὰ πολλὰ ξυναπο-
θνήσκῃ.

η'. Ὀκόσοι πλούρητοι γυνήδες ὅτε
ἀνακαθάρθῃαι ἐν τεσσαρεσκαίδεκα
ἡμέρησιν, τετέοισιν ἐς ἐμψύημα με-
θείαῃ.

θ'. Φθείσις γίνεῃ μάλιστα ἡλικίῃσι
τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα^α ἐτέων μέχρι
πέντε καὶ τετήκοντα.

ι'. Ὀκόσοισι κυνάχην ἀφαφύγωσιν
^α ἐς τὴν πλούμονα τρέπεῃ, ἐν ἑπτὰ ἡμέ-
ρησιν ἀποθνήσκουσιν. ἢν δὲ ταύτας ἀφα-
φύγωσιν, ἔμψυοι γίνονῃ.

ια. Τοῖσιν ὑπὸ τοῦ φθισίῳ ἐνοχλε-
μῶμοισιν, ἢ τὸ πτύσμα, ὅπερ ἂν λυ-
θῇσῃσι, βαρὺ ^α ὄξη ἐπὶ τὰς ἀνθρακας
ἐπιχεομένην, ἢ αἱ τρίχες ἀπὸ τοῦ κε-
φαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

ιβ. Ὅσοις ἂν φθισιῶσιν αἱ τρί-
χες ^α ἀπὸ τοῦ κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι,
διὰ ῥοίης ^β ἐπιχνομένης, λυθνήσκειν.

ιγ. Ὅσοι αἶμα ἀφρῶδες ἀναπ-
τύσσει, τρέφουσιν ἐκ τοῦ πλούμοντος ^α ἢ
τοιαύτη ἀναγωγὴ γίγνεται.

ιδ. Ὑπὸ φθισιῶ ἐχομένη διὰ ῥοί-
α ^α ἐπιχνομένη, θανατῶδες.

ιε. Ὅσοι ἐκ πλούριτιδος ἐμψυοί
γίγνουν, ἢ ἀνακαθαρθῶσιν ἐν ^α τεσ-
σάρακοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις
γένηται, παύουν. ἢ ἢ μὴ, ἐς φθίσιν
μεθίστανται.

ις. Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι

S E C T I O V. 161

11. A tabe vexatis, si sputum quod extussiunt, prunis superfusum, graviter oleat, ^a et capilli de capite defluant, lethale.

12. Quibus tabe laborantibus capilli ^a de capite defluunt, hi, alvi fluxu ^b superveniente, moriuntur.

13. Qui sanguinem spumosem expuunt, ^a his ex pulmone talis reiectio fit.

14. A tabe detento alvi profluvium ^a superveniens, lethale.

15. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra quadraginta dies, ^a ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur supernè, liberantur: si verò minus, ad tabem transeunt.

16. Calidum eo frequenter uten-

tibus has affert noxas : ¹ ^a carnis effœ-
minationem, nervorum impotentiam,
mentis torporem, ^b sanguinis erup-
tiones, ² animi deliquia : hæc qui-
bus mors.

17. Frigidum ^a autem, convulsio-
nes, tetanos, nigrores, et rigores fe-
briles.

18. Frigidum ^a inimicum ossibus,
dentibus, nervis, cerebro, spinali
medullæ : calidum verò utile.

19. Quæ perfrigerata sunt, excale-
facere oportet, ¹ præterquàm quæ
sanguinem profundunt, aut sunt pro-
fusura.

20. Ulceribus frigidum quidem mor-
dax, ^a cutem obdurat, dolorem non
suppurantem facit, nigrores, rigores
febiles, convulsiones, et tetanos.

S E C T I O V. 163

πλεονάκεις χρεομύθοις· ¹ ^a *Σαρκῶν*
ἐκθήλυνσιν, νόρῶν ἀκράτειαν, γνώ-
μης νάρκωσιν, ^b αἱμορραγίας, ² λει-
ποθυμίας. ταῦτα οἷσι θάνατος.

ιζ'. Τὸ ^γ ^a ψυχρὸν, σπασμὸς, τε-
τάνος, μελασμὸς, καὶ ρίγες πυρελώ-
δες.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν ^a πολέμιον ὁσέοισιν,
ὁδῶσι, νόροις, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ
μυελῷ· τὸ ^γ θερμὸν ὠφέλιμον.

ιθ'. Ὅκον κατέψυκται, ἐκθερ-
μαίνειν δεῖ, ¹ πλὴν ὅκον αἱμορραγίας,
ἢ μέλει.

κ'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶ-
δες, ^a δέρμα παρυσκληρύνει, ὁδύνῃ
ἀνεκπαύητον ποιεῖ, μελασμὸς, ρίγες
πυρελώδες, σπασμὸς, ἐτεῖανος.

κά. Ἐσι ᾗ, ὅκx ὅπῃ τετάνx ¹ ἄνδρ
 ἔλκεσ, νέω δὺσάρκx, θέρεσ μέσx,
² ψυχρᾷ πολλᾷ καλᾷχυσις ἐπανάκλη-
 σιν θέρμεης ποιέειαι· θέρμη ᾗ ταῦτα
 ῥύεῃ).

κδ'. ¹ Τὸ θερμὸν ἐκπυητικόν, ὅκ
 ὅπῃ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς
 ἀσφαλείην· ² δέρμα μαλάσκει, ἰχ-
 νάνει, ἀνάδυνον, ριγέων, ³ σπασμῶν,
 τετάνων παρηγορικόν· τὴν δὲ ἐν τῇ
 κεφαλῇ καρηδορίην λύει· πλεῖστον δὲ
 ἀφάφει ὁσέων κατάγμασι· ⁴ μά-
 λιςα ᾗ τοῖσιν ἐψιλωμῆμοισι· τριτέων
 δὲ μάλιςα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα
 ἔχουσι· καὶ ὁκόσα ὑπὸ ψύξεισ θνήσκει,
 ἢ ἔλκεσ, καὶ ἔρωτησιν ἐσθιομῆμοισιν
 ἔδρη, ⁵ ἀδοίω, ὑσερη, κύσει. τετάρτοις
 τὸ μὲν θερμὸν φίλον καὶ κρείνον, τὸ ᾗ
 ψυχρὸν πολέμιον εἰ κτεῖνον.

21. Est verò, ubi in tetano ¹ sine ulcere, juveni benè carnosò, ætate mediâ, ² frigidæ multæ affusio caloris revocationem facit; calor autem hæc solvit.

22. ¹ Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem: ² cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, ³ convulsiones, tetanos mitigat: capitis verò gravitatem solvit: plurimùm autem confert ossium fracturis: ⁴ maximè verò denudatis: ex his quidem maximè, qui in capite ulcera habent: et quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur: et herpetibus exedentibus sedi, ⁵ pudendo, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum et decretorium, frigidum verò inimicum et occidens.

23. ¹ In his autem frigido uti oportet unde sanguis erumpit, aut erupturus est : non super ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcumque inflammationes, ² aut flammei ardores ad rubrum et sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos : nam inveteratos nigrefacit : erysipelas etiam non exulceratum (juvat) : quoniam exulceratum lædit.

24. Frigida, velut nix, glacies, ¹ pectori ² inimica, ² tusses movent, sanguinis eruptiones ac catarrhos inducunt.

25. Tumores autem in ² articulis et dolores absque ulcere, et podagricos, ¹ et convulsiones ; horum plurima frigida multa affusa, et levat, et attenuat, et dolorem solvit. Torpor

κγ'. ¹ Ἐν τεττέοισι ᾗ δέῃ τὰ ψυχρὰ
 χρέεα, ὁκόθεν αἰμορροῦνται, ἢ μέλλει,
 μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πρὶν αὐτὰ, ὁκόθεν
 ὑπὲρ ῥέει. καὶ ὁκόσῃ φλεγμοναί, ἢ ὑπερ-
 φλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν ^α ἐν ὑφαι-
 ρον ῥέποντα νεαρὰ αἵματα, ὑπὲρ ταῦ-
 τα· ἐπεὶ τάγε παλαιὰ μελαίνει· καὶ
 ἐρυσίπελας, τὸ μὴ ἐλκέρημον (ἀφελ-
 εῖ·) ἐπεὶ τόγε ἐλκέρημον βλέ-
 πει.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν, χρύσ-
 ταλλῶ, ¹ τὰ γήθει ^α πολέμια, ² βη-
 χέων κινήτικα, αἰμορροϊκά, κατάρ-
 ροϊκά.

κε'. Τὰ ᾗ ἐν ^α ἄρθροισιν οἰδήματα
 ἐν αλγήματι ἄτερ ἐλκεῶ, ἐν πωδα-
 γηκῇ, ¹ καὶ σπᾶσματι, τειλέων τὰ
 πλείεστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν κατὰ χερό-
 μημον ῥηίζει τε, καὶ ἰχναίνει, καὶ ὀδυ-

νην λύει. νάρκη γὰρ μερίη ὀδύνης λυ-
τική.

κς'. Ὑδωρ τὸ ταχέως θερμανό-
μενον, ^α καὶ ταχέως ψυχόμενον, κα-
φόταλον.

κζ'. Ὅκοσοισι ᾗ πιεῖν ὀρέξεις ^α νύ-
κτωρ, τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢν ἐπι κοι-
μηθῶσιν, ἀγαθόν.

κη'. Γυναικείων ἀγῶγόν ἢ ἐν δρώ-
μασι πυρίη. πολλαχῶς ᾗ καὶ ἐς ἄλλα
χρησίμη ἂν ᾦν, εἰ μὴ καρηδορίας ἐνε-
ποιεῖ.

κθ'. Τὰς κύστας φαρμακδεῖν, ἢν
ὀργᾶ, τειλαμίνα, καὶ ἄχει ἐσπὰ
μιλῶν ᾗσον ᾗ τάυτας. τὰ ᾗ νήπια,
ἐπρεσδύτερα, ^α ἐυλαθεῖεαδ' χρή.

λ'. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσση, ὑπό-
τινϑ ^α ὀξέων ^α νεσηρέατων ληφθῆναι,
θανάσιμον.

enim modicus doloris solvendi vim habet.

26. Aqua , quæ citò calefiat , ^a et citò refrigeretur , levissima.

27. Quibus autem bibendi appetentiæ noctu , iis valdè sitientibus , si obdormierint , bonum.

28. Suffitus aromatum muliebria ducit : sæpius autem et ad alia utilis esset , nisi capitis gravitates induceret.

29. Prægnantes purgandæ , si turgeat *materia* , quadrimestres , et usque ad septimum mensem : hæ verò minùs. Juniores autem , et seniores *fætus* , ^a cautè vitare oportet.

30. Mulierem in utero gerentem ab acuto ^a aliquo morbo corripì , lethale.

31. Mulier in utero gerens sectâ venâ^a abortit : et magis , si major fuerit fœtus.

32. Mulieri sanguinem^a evomenti, menstruis erumpentibus , solutio fit.

33. Mulieri , menstruis deficientibus , è^a naribus sanguinem fluere , bonum.

34. Mulieri in utero gerenti, si alvus^a multùm fluxerit , periculum ne abortiat.

35. Mulieri ab uterinâ *passione* vexatæ , aut difficulter parienti, ^asternutatio superveniens , bonum.

36. Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (*tempus et modum*) semper prodeuntes , purgatione opus esse significant.

37. Mulieri in utero gerenti si

λά. Γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβο-
τομηθεῖσα^α ἐκτετράσκει· κὴ μᾶλλον, εἰ
μεῖζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

λβ. Γυνακὶ αἷμα^α ἐμεῖσθαι, κα-
ταμελίων ραγέντων, λύσις γίνεσθαι.

λγ. Γυνακὶ, καταμελίων ἐκλει-
πόντων, αἷμα^α ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖναι,
ἀγαθόν.

λδ. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι, ἢ ἡ
κοιλίῃ^α πολλὰ ῥυῖν, κίνδυνος ἐκ-
τρώσασθαι.

λε. Γυνακὶ ὑπὸ ὑπερικῶν ἐνοχλη-
σθῆναι, ἢ δυσοκέσθαι, πταρμός^α ἐπι-
γινώσκεισθαι, ἀγαθόν.

λς. Γυνακὶ τὰ καταμήνια ἄχροα,
κὴ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώσκεισθαι,
καθάρσεσθαι δέϊασι σημαίνει.

λζ. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι ἢν

οἱ μαδοὶ ^α ὀξυφύνης ἰχνοὶ γένων), ἐκλιτρώσκει.

λη'. Γυναικὲ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, ἣν ὁ ἕτερος μαδὸς ἰχνὸς γένῃ), δίδυμα ἔχουσα, θάτερον ἐκλιτρώσκει· καὶ ἣν μὲν ὁ δεξιὸς ἰχνὸς γένῃ), τὸ ἄρσεν· ἣν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θήλυ.

λθ'. Ἦν γυνὴ μὴ κύεσα, μηδ' ἐτετοκυῖα, γάλα ^α ἔχη, ταύτη τὰ κατὰ μῆτρα ἐκλέλοιπε.

μ'. Γυναῖξιν ὀκόσησιν ἐς τὴν τιτάρην αἷμα ^α συσρέφε), μανίῳ σηκιάζει.

μά. Γυναῖκα ἣν θέλῃς εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὶ τὴν παθεύδειν μέλαινα, (ἀδείπωνα ἔχουσα) μελίκρατον δίδονα πιεῖν. καὶ ἣν μὲν σρόφον ἔχη πρὸς τὴν γαστέρα, κύει· ἣν δὲ μὴ, οὐ κύει.

mammæ^a ex improvise graciles fiant, abortit.

38. Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestanti, alterutrum abortit; et, si quidem dextra gracilis fiat, marem: si verò sinistra, fœminam.

39. Si mulier quæ nec prægna est, nec peperit, ^a lac habeat, ei menstrua defecerunt.

40. Mulieribus quibus in mammas sanguis ^a convertitur, insaniam significat.

41. Mulierem si velis cognoscere, an prægna sit, ubi dormitura est, (incœnatæ) aquam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habeat circa ventrem, prægna est: si verò minùs, prægna non est.

42. Mulier prægñans, si quidem marem gestat, benè colorata est: si verò fœminam, malè colorata.

43. Si mulieri prægñanti erysipelas in utero fiat, lethale.

44. Quæ præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

45. ¹ Quæ verò mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres et trimestres, sine causâ manifestâ, his uteri acetabula muco plena sunt, et non possunt continere fœtum, præ gravitate, sed abrumpuntur.

46. ¹ Quæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, et, priusquam attenuentur, prægñantes non fiunt.

μδ'. Γυνή ἔγκυϑ , εἰ μὲν ἄρρεν
κύει , εὐχρως ἐσίν· ἢν δ' θήλυ , δύσ-
χρως.

μγ'. Ἦν γυναικὶ κύσῃ ἐρυσίπελως
ἐν τῇ ὑτέρῃ γένῃ , θανατῶδες.

μδ'. Ὀκόςαι ὡδὰ φύσιν λεπτὰ
ἐῤσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν , ἐκτιπρώσκουσι ,
πρὶν ἢ παχυνθῆναι.

μέ. Ὀκόςαι δ' μερίως τὸ σῶμα
ἔχουσι ἐκτιπρώσκουσι δίμηνα ἔ τρί-
μηνα , ἄτερ προφάσιϑ φανερῆς , ταύ-
τησιν αἱ κοιληδόνες μύξης μεσά εἰσι ,
καὶ δύναντ' κρατεῖν ὑπὸ τῇ βάρει τὸ
ἐμδρυον , ἀλλ' ἀπέρρηγνυντ'.

μς'. Ὀκόςαι ὡδὰ φύσιν παχεῖαι
ἐῤσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ ,
ταύτησι τὸ ὅπῳ λουον τὸ σῶμα τῷ
ὑπερῶν ἀπαιεῖται , καὶ , πρὶν ἢ λεπ-
τυνθῆναι , ἔ κύουσιν.

μζ'. Ἦν ὑσέρη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη Διαπυήση, ἀνάγκη ἔμμοτον γένεσθαι.

μη'. Ἐμδρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιόισι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἄριστεροῖσι μᾶλλον.

μβ'. Εἰς ὑσέρων ἐκπτώσιαις πιαρμικὸν ἐπιθίεις, ἐπιλαμδάνειν τὴς μυκτῆρας καὶ τὸ σόμα.

ν'. Γυνακὶ τὰ κατὰ μῆνια ἦν βέλη ἐπιχεῖν, σικύλῳ ὡς μεγίστῳ πρὸς τῆς^α τιτθὸς πρόσβαλλει.

νά'. Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τὰτέων τὸ σόμα ὅτ' ὑπερῶν ζυμμέμυκεν.

νε'. Ἦν γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα γάλα^α πολὺ ἐκ τῶ μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς τὸ ἔμδρυον σημαίνει. ἦν δὲ σερεαὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμδρυον σημαίνει.

47. ¹ Si uterus coxi incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

48. Fœtus, mares quidem in dextris, fœminæ verò in sinistris magis.

49. Ut secundæ excidant, sternutatorio indito, nares et os apprehendere oportet. /

50. Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ^a ad mammas appone.

51. Quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis ^a ex mammis fluxerit, infirmum fœtum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, saniozem fœtum significat.

53. Quæ perdituræ sunt foetus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursum duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, et non perdant.

54. ¹ Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri ² clausum esse.

55. ¹ Quæcumque in utero gerentes à febris corripuntur, et vehementer attenuantur, absque manifestâ occasione, difficulter et periculosè pariunt, aut abortientes periclitantur.

56. Si fluxui muliebri convulsio et animi deliquium superveniat, malum.

57. ¹ Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt : ² non prodeuntibus ³, ab utero fiunt morbi.

νγ'. Ὁκόσῃ Διφθεύειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύτησιν οἱ τιτθοὶ ἰχνοὶ γίνονται. ἢν ᾧ πάλιν σκληροὶ γένον, ὁδύνη ἔσται, ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχίοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γένασιν, ἔξ Διφθεύουσιν.

νδ'. ¹ Ὁκόσῃσι τὸ σῶμα τῶν ὑπερῶν σκληρόν ᾖσι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῶν ὑπερῶν ² ξυμμεύειν.

νε'. ¹ Ὁκόσῃ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνον, καὶ ἰχυρῶς ἰχναίνον, ἀνδρὶ προφάσιθι φανερῆς, τίκτουσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκλιτρώσκουσα κινδυνεύουσιν.

νς'. Ἐπὶ ῥῶν γυναικείῳ σπασμῶς καὶ λειποθυμίῃ ἢν ἐπιγένῃ, κακόν.

νζ'. ¹ Καταμυλίων γινομένων πλειόνων, νῆσοι ξυμβαίνουσι. ² καὶ μετὰ ^α γινομένων, ἀπὸ τῆς ὑπέρης γίνονται νῆσοι.

νή. ¹ Ἐπὶ δ' ὄρχαί φλεγμαίνοντι, ἐ
 ὅπῃ ὑσέρῃ φλεγμαίνεσθαι, καὶ ὅπῃ νε-
 φροῖσιν ἐμπύοισι, τραγῆρήν ὅπιγί-
 νει). ² ὅπῃ ᾗ ἥπατι φλεγμαίνοντι, λυγξ
 ὅπιγίνει).

νθ'. Γυνὴ ἣν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ,
 βέλῃ ᾗ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύ-
 ψας ἱματίοισι θυρία κάτω· κῆν μὲν
 πορεύεσθαι σοι δοκῇ ἢ ὁδὸν ἀλλὰ τῷ
 σώματι εἰς τὰς ῥῖνας καὶ εἰς τὸ στόμα,
 γίνωσκε, ὅτι αὐτὴ, εἰ δὲ ἐαυτὴν, ἀγνο-
 οῦσιν.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι αἱ
 καθάρσιες πορεύων), ἀδύνατον τὸ ἐμ-
 βρυον ὑγιαίνειν.

ξά'. Ἦν γυναικὶ καθάρσιες μὴ πορ-
 εύων), μήτε φρίκης μήτε πυρετῶ
 ἐπιλησμενίας, ἄσθαι ᾗ αὐτῇ προσπίπ-
 τωσι, λογίζεσθαι τὰύτῃ ἐν γαστρὶ ἔχειν.

58. ¹ Recto intestino inflammato ,
et utero inflammato , et renibus sup-
puratis , urinæ stillicidium superve-
nit : ² hepatis autem inflammato , sin-
gultus supervenit.

59. Mulier , si in ventre non conci-
piat , velis autem scire an conceptura
sit , vestibis circumtectam subter suf-
fito ; et si quidem procedere tibi vi-
deatur odor per corpus ad nares et ad
os , scito hanc , non propter se ipsam ,
infœcundam esse.

60. Si mulieri in utero gerenti pur-
gationes prodeant , fœtum sanum esse
impossibile.

61. Si mulieri purgationes non pro-
deant , neque horrore , neque febre
superveniente , cibi autem fastidia ipsi
accidant ; hanc in utero gerere putato.

62. Quæ frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt ; ¹ et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt ; extinguitur enim ipsis genitura : et quæ siccos magis et adurentes ; alimenti enim inopiâ semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque temperamentum habent moderatum, ¹ hæ ipsæ proliferæ fiunt.

63. Similiter autem etiam in masculis. ¹ Aut enim propter corporis raritatem spiritus extrâ fertur, adeò ut semen non emittat : ² aut propter densitatem humidum non pervadit foras ; aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum congregetur : aut propter caliditatem hoc idem contingit.

64. ^{1 2} Lac dare capite dolentibus,

ξβ'. Ὀκόσαι ψυχράς καὶ πυκνάς
τὰς μήτρας ἔχουσιν, ἔκκύσκουσι.
καὶ Ὀκόσαι καθύγρους ἔχουσι τὰς μή-
τρας, ἔκκύσκουσιν· ἀπισθέννυ) γὰρ
αὐταῖς ὁ γόνιμος· καὶ Ὀκόσαι ξηρὰς
μᾶλλον καὶ ὠκυκαεῖς· ἐνδείη γὰρ τῆς
τροφῆς φερίει) τὸ σπέρμα. Ὀκόσαι ἃ
ἐξ ἀμφοτέρων τὴν κρᾶσιν ἔχουσι σύμμε-
τρον ², αἱ τοιαῦται ὀπίσκειναι γιγνόν).

ξγ'. Παραπλησίως ἃ ἐκ τῆς αἰσθη-
τικῆς ἢ γὰρ δι' ἀρχαιότητα τῆς σάματις
τὸ πνεῦμα ἔξω φέρε), πρὸς τὸ μὴ
ὠκυπέμπειν τὸ σπέρμα· ² ἢ διὰ τὴν
πυκνότητα τὸ ὑγρὸν ἔκκλωρῆαι ἔξω·
ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ὅτι ἐκπυρρᾶ-
ται, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸ τόπον τῆς
γονῆς· ἢ διὰ τὴν θερμότητα τὸ αὐτὸ
τῆτο γίνε).

ξδ'. Γάλα ^a διδόναι κεφαλαλγεῖσι,

H h ij

κακόν. κακόν ᾗ καὶ πυρεταίνουσι, ² καὶ
οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα Διαιτορδο-
ρίζοντα, καὶ τοῖσι διψάδεσι. κακόν ᾗ
ἔοισι χολάδες αἱ παρυχωρητιες, καὶ
ἐν τοῖσι ἰξέσι πυρετοῖσιν ἰξσι· καὶ
οἷσιν αἰμαῖα πολλὰ Διαχώρησις γέ-
γονεν. ³ ἂ ἀρμύζει ᾗ τοῖσι φθινάδεσι
⁴ μη λήν πολλά πυρέσσουσι διδόναι
(γάλα,) καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ
βληχροῖσι, μηδενὸς ἔρ' προσιεργάων
σημείων παρεόντων· ὥστε λέγον ᾗ ἐκ-
τέλεικάσιν.

ξέ. Ὀκείσοισι οἰδήματα ἐφ' ἑλκας
^a φαίνονται, ἔ μάλαι σπῶνται, ἔδ' ἐ
μάνονται. τυχέων ᾗ ἀφανισθέντων ἐξάφ-
νης, τοῖσι μὲν ἴπιδεν, σπασμοί,
τέτανοι· τοῖσι ᾗ ἑμπροσθεν, μανία,
ἢ ὀδύνη πλῆρες ὀξείη, ἢ ἱμωῦνσις,
ἢ δυσεντερία, ἢ ἐρυθρά ἢν τὰ οἰδηματια.

malum. Malum verò etiam febricitantibus, ² et quibus hypochondria elevata *sunt* murmurantia, et siticulosi. Malum autem et quibus dejectiones biliosæ, et iis qui in acutis sunt febribus: et quibus copiosi sanguinis facta est egestio. ³ ^b Convenit vero tabi lis ⁴ non admodum valdè febricitantibus (lac) dare, et in febribus longis et languidis, nullo ex supradictis signis præsentē; & præter rationem quidem extenuatis.

65. Quibus tumores in ulceribus ^a apparent, ii non valdè convelluntur, neque insaniunt. His autem derepentè disparentibus, quibus in postea quidem parte *fuerint*, convulsionēs fiunt et tetani: quibus verò in anticâ, insanis, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66. Si, magnis et pravis existentibus vulneribus, tumores non ^b appareant, ingens malum.

67. Laxi *tumores*, boni: crudi verò, mali.

68. Posticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

69. Rigores incipiunt, mulieribus quidem, ex lumbis magis, et per dorsum ad caput; viris autem posticâ magis parte, quàm anticâ corporis, velut ex cubitis ac femoribus. ¹ Sed et cutis *viris* rara est. Hoc quidem pilus indicat.

70. A quartanis correpti, ¹ à convulsione non admodum corripuntur; ² si verò priùs corripuntur, et postea quartana supervenerit, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur arida

ξς'. Ἦν , τραυμάτων ἰχυρῶν ἐόν-
των καὶ πονηρῶν , οἰδήματα ^α μὴ φαί-
νη) , μέγα κακόν.

ξζ'. Τὰ χαῦνα , χρηστά· τὰ ἥ ἐνω-
μα , κακά.

ξη'. Τῷ τὰ ὀπισθεν τ' κεφαλῆς ὀδυ-
νωμένῳ , ἡ ἐν μετὰπα ὀρθίῃ φλέψ
τμηθεῖσα ὠφελέει.

ξθ'. Ῥίγεια ἄρχε) , γυναῖξί μὲν , ἐξ
ἐσφύς μᾶλλον , καὶ ἀπὸ νάτῃς ἐς κε-
φαλὴν· ἀνδράσι ἡ μᾶλλον ὀπισθεν ,
ἡ ἔμροσθεν τ' σάμαλς , οἷον ἀπὸ τε
πηχέων καὶ μηρῶν. ¹ ἅτῃς ἐ τὸ δέρμα
ἀραίον. δηλοῖ ἡ τῆτο ἡ θρίξ.

ο. Οἱ ἐπὶ τειαρλιάων ἀλίσκομμοι ,
¹ ἐπὶ σπασμῶς ἐ πάνυ τι ἀλίσκον).
² ἦν ἡ ἀλίσκον) πρότερον , εἶτα ὅπι-
γέννη) τειαρλιάς , παύον).

οά. Ὅκόσοισι δέρματα πελιδνεία

καρφαλέα & σκληρά, ἄνθ' ἰδρώτων
τελούτῳσιν· ὁκόσοισι ᾗ χαλαρὰ καὶ
δρῶν, Ἰν ἰδρῶτι τελούτῳσιν.

οἷ. Οἱ ἰκτεράδες & πάνυ τι πνύ-
μαλώδες εἰσιν.



ac dura, ii sine sudore moriuntur; quibus verò laxa ac rara, ii cum sudore moriuntur.

72. IctERICI non admodum flatulenti sunt.



N O T Æ

I N

SECTIONEM QUINTAM.

APHOR. I. Aph. vij, 25. — Coac. iv, 24. ^a Cels. ij, 6, pag. 55, l. 25. —
Vide van-Swieten, t. iij, p. 420, 486.

Convulsio ab hellebori usu inducta, lethalis, quòd et ab illo enormis producat^r vacuatio, et lædantur immani irritatione nervi; hinc duplici titulo metuendum medicamen. Eadem causa idem producit in vulneribus: sed ab effuso sanguine periculosior adhuc est convulsio, quòd morte tantum proximâ appareat.

APHOR. II. Coac. iij, 81, 382. —
 Cap. Vulner. xxxv, 5, xvj, 3, 4. ==

^a Cels. v, 26, §. 26, p. 296, l. 8. —
Vide van-Swieten, tom. j, pag. 343,
 764.

APHOR. III. Aph. vij, 9. — Coac.
 iij, 57. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 12. —
Vide van-Swieten, t. j, p. 342; t. ij,
 242.

APHOR. IV. Aph. vij, 41. — Nat.
 Human. x, 1 ad 7. — Loc. in Hom. xlv,
 1. — Coac. iv, 22, 25. — Verat. Us. j,
 8. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 14. —
Vide van Swieten, t. j, p. 342; t. ij,
 p. 242; t. iij, p. 194.

APHOR. V. II. Morb. xxij, 2, 3,
 4. = ^a Cels. ij, 6, pag. 55, l. 27.
 — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij,
 p. 252.

APHOR. VI. Judicat. viij, 19. — III.
 Morb. xiiij, 11. = ^a Cels. ij, 1, p. 45,
 l. 3; iv 3, p. 103, l. 30. — *Vide* van-
 Swieten, t. ij 323.

Si quatuor dies superaverint, sani fiunt,
 febre scilicet superveniente quæ regu-
 larem motum et salutarem abnormi con-
 vulsionum impetui substituit.

APHOR. VII. VI. Epid. viij, 96.
 =¹ Aph. ij, 45. =² Aph. ij, 39. —
 II. Prædic. xvj, 1 ad, 16, 5, 15, —
 Morb. Sac. xij, 1, 5, =³ Cels. ij, 2,
 pag. 47, l. 2; 8, p. 68, l. 26; pag. 73,
 l. 3; iij, 23, pag. 172, l. 17. —
 Exquisitam hujusce Aphorismi theo-
 riam vide apud Russel *Œconomiâ natu-*
ræ in Glandulis, cap. 4, p. 80 et seq.
 van-Swieten, t. ij, pag. 43; t. iij, pag.
 403, 436.

APHOR. VIII. Aph. v, 15. — Loc.
 in Hom. xxvj, 4. — Coac. iij, 131,
 132, 171. — VII. Epid. xlvij, 16. —
 I. Morb. iij, 29; x, 12; xj, 6, ad 11;
 xxij, 15, 16; xxiv, 10. — III. Morb.
 xvj, 30 ad 36. — Affect. viij, 19, 20;
 ix, 13. — Int. Affect. j, 26. — Vict.
 Acut. vij, 1, 2. — *Vide* van-Swieten,
 t. iij, p. 53, 665.

IN SECTIONEM V. 193

APHOR. IX. Aph. iij, 29; viij, 7.
— Coac. iij, 260. =^a Cels. iij, 22;
p. 169, l. 24. — *Vide* Russel, Loc. ci-
tatis. *Vide* Theat. tabid. *Vide* Boerhaa-
vium Aphorism. de cogn. et curand.
morbis §. 1198. — *Vide* van-Swieten,
t. iv, p. 14.

APHOR. X. Prænot. xxiiij, 15. —
Coac. iij, 100, 101, 105, 106. — II.
Morb. xxvij, 15 ad 19. =^a Cels. ij, 6,
p. 64, l. 6. *Vide* van-Swieten, tom. ij,
p. 619.

Resolutione scilicet impossibili, su-
perest sperandum, aut Metastasis, aut
Abscessus.

APHOR. XI. Coac. iij, 213, 252. —
II. Morb. xlvj, 16 ad 20; lv, 20 ad
23. =^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 1; iij,
22, p. 168, l. 4. — *Vide* van-Swieten,
t. iv, pag. 64, 70.

APHOR. XII. Aph. v, 14; vij, 78.
— Coac. iij, 244, 255. — I. Morb.

x, 36. — II. Morb. xlvj, 22. =^a Cels. ii, 8, p. 71, l. 33. =^b Cels. ij, 8, p. 72, l. 2. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iv, p. 70.

APHOR. XIII. Coac. iij, 216, 250, 251, 273. — II. Morb. lj, 4. =^a Cels. ij, 7, p. 61, l. 31. — Al. Trall. vij, 1. — Aretæus de signis Morb. Acut. l. 2, c. 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 24.

* APHOR. XIV. Aph. v, 12; vij, 78. — Coac. iij, 244, 256. — I. Morb. vj, 5; x, 36, 39 ad 41; xj, 41; xiv, 10. =^a Cels. ij, 8, pag. 72, l. 2; iij, 22, pag. 171, l. 20. — Aretæus de Morb. diuturn. l. 1, 8, in fine. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346, t. iv, p. 70.

APHOR. XV. Loc. in Hom. xxv, 10. — Coac. iij, 142, 171, 209, 215. — VII. Epid. xlvij, 16, 17. — I. Morb. x, 15, 17, 20. — II. Morb. lv, 23. — III. Morb. xvi, 35. =^a Cel. ij, 7, p. 62, l. 15; ij, 8, p. 66, l. 34.

APHOR. XVI. ¹ Humid. Us. iij, 2, 3.

IN SECTIONEM V. 195

=² Aph. j, 23. =^a Cels. j, 3, p. 28, l. 22; ibid. 9, pag. 40, l. 6. =^b Cels. ij, 1, pag. 44, l. 34. — Aretæus de curat. Morb. Acut. ij, 2. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 36, tom. iij, pag. 362.

Docet Physica expandi à calore omnia, tensa relaxari, fluida rarescere: inde enumerati pendent effectus.

APHOR. XVII. Aph. v, 20. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. =^a Cels. ij, 1, p. 45, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 521, 610; t. ij, p. 219, 327. — *Vide* Sanctorium, Sect. ij, Aph. 16, 17, 18, 21, 35, 38, &c.

Stringit vasa, cogit liquida frigus; motum arcet et impedit: hinc a frigore Gangræna. Quid si frigus subitum et insolitum invadat? Vehementiora omnia expectanda sunt.

APHOR. XVIII. Humid. Us. iv, 1, 4. =^a Cels. j, 9, p. 39, l. 20. — *Vide*
K k ij

van-Swieten, t. j, p. 370, 521; t. ij, p. 219, 327.

APHOR. XIX. Aph. ij, 22; v, 23.
— Humid. Us. j, 21. = ¹ Humid. Us. xj, 28.

Ne sanguini calor faveat eruptionem molienti.

APHOR. XX. Aph. v, 17. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5; xj, 15. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. = ^a Cels. j, 9, p. 39, l. 24 — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 291, 344, 610.

APHOR. XXI. Humid. Us. xj, 16. = ¹ Aph. v, 25. = ² III. Morb. xiv, ad xv. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 327, 328, t. iij, p. 181.

Attentè legatur Galenus in hunc Aphorismum.

Mirum illud quoque addemus, praxim hanc, velut novam et recenter inventam, à quibusdam prædicatam nuperri-

mis annis fuisse in tetano, præsertim à mephiti orto.

APHOR. XXII. Humid. Us. xj, 18 ad 28. = ¹ Humid. Us. xj, 10. — Ulcer. v, 1. = ² Humid. Us. j, 10. = ³ Humid. Us. j, 19. — I. Morb. vj, 14. = ⁴ Humid. Us. v, 13. = ⁵ Humid. Us. vj, 2, 3. — Legatur Galenus in *hunc aphorismum*. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 344, 521, 640, t. ij, p. 219.

APHOR. XXIII. ¹ Aph. v, 19. = ^a Cels. j, 9, p. 39, l. 32. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 610; t. iij, p. 181; t. iv, p. 35.

APHOR. XXXIV. ¹ Humid. Us. iv, 8; v, 16. = ² VI. Epid. iij, 22. = ^a Cels. j, 9, p. 39, l. 21.

Notissimam theoriam *vide* apud van-Swieten, t. ij, p. 581; t. iv, p. 22, 35. — *Vide* et Observationes Sanctorii, Sect. ij.

APHOR. XXV. Humid. Us. x, 14,

15. =¹ Aph. v, 21. =² Cels. j, 9, p. 39, l. 31. — *Vide* Martianum in hunc Apherism. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 879; t. ij, p. 327, 328; t. iij, p. 181; t. iv, p. 313.

APHOR. XXVI. Aër. Aq. Loc. xvij, 1. — II. Epid. ij, 29. =² Cels. ij, 18, p. 100, l. 11.

APHOR. XXVII. VI. Epid. iv, 42. =² Cels. j, 8, p. 38, l. 22.

APHOR. XXVIII. Natur. Mul. xxix, 161, ad 187.

APHOR. XXIX. Aph. iv, 1. — ² Cels. ij, 6, p. 55, l. 30.

Idem est hic Aphorismus ac primus Sectionis quartæ, non eum tamen de suo hoc loco deturbavit Galenus, quòd speciatim hîc de muliebribus agatur. Nos autem tum hâc de causâ eum non eximemus, tum quòd citationibus variorum Auctorum numero non responderet.

IN SECTIONEM V. 199

APHOR. XXX. Aph. v, 43, 55. —
I. Morb. iij, 9. — Hippocrat. j, Epid. ij,
141. — De Naturâ Puer. xij, 19. =
^a Cels. ij, 6, p. 55, l. 30. — *Vide* van-
Swieten; t. iij, p. 30; t. iv, p. 418.

APHOR. XXXI. ^a Cels. ij, pag. 77,
l. 20, 25, &c. — *Vide* van-Swieten, t.
ij, pag. 145, t. iv, p. 417.

Quod non ita verum, si mulieri ple-
thoricæ parcius mittatur sanguis, ita ut
non fatiscant vasa, sed amissum præ-
distendente plethorâ tonum recuperent.

APHOR. XXXII. I. Morb. vj, 11.
= ^a Cels. ij. 8, pag. 69, l. 28; iv,
4, §. 5, p. 202, l. 31. — *Vide* van-
Swieten, t. iv, p. 374.

APHOR. XXXIII. Virgin. Morb. iij,
2. — Epid. j, Sect. ij, 138, 139.
= ^a Cels. ij, 8, pag. 69, l. 30. —
Vide van-Swieten, t. iij, p. 285, t. iv,
p. 19, 373.

APHOR. XXXIV. II. Prædict. xxx,

14 ad 18. — Coac. iij, 416. — I. Morb. Mul. xxxvij, 5; xlj, 3, 6. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 411.

APHOR. XXXV. Aph. v, 49. — Prænot. xij, 11. — Coac. iij, 175. — I. Morb. Mul. xcij, 1, 6, 7. =^a Cels. ij, 8, p. 69, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 464.

Rectè legit hîc Gorterus ὑπὸ ὑστερῶν, secundinis retentis : quod sensum magis verum efficit, et experienciâ comprobatum.

APHOR. XXXVI. Verat. Us. j, 11, 60. — Natur. Mul. x, 3, 13.

Scilicet interverti perspirationis et excrementorum sensibilibum ordinem, coctionesque vitari signum hoc indicat.

APHOR. XXXVII. Aph. v, 53. — II. Epid. j, 42. — I. Morb. Mul. xlv, 1, 2, 3. =^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440.

Communio quæ mammas inter et uterum ita existit, ut, vigente uteri actione, floreant illæ, rursusque elanguente flaccescant, mille experimentis comprobata est; licet illa, quæ ante cognitum sanguinis motum afferebatur causa, articularum mammariarum cum uterinis anastomosis, nihil hîc conducat.

APHOR. XXXVIII. Aph. v, 48.

Credat Judæus Apella.

APHOR. XXXIX. II. Prædict. xxxv, 5. =^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 539.

APHOR. XL. II. Epid. vj, 61. =^a Cels. ij, 7, p. 63, l. 34. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 532; t. iv, p. 564.

Ad puerperas præcipuè, easque morbo acuto correptas pertinet hic Aphorismus, et lochia sursùm impetere per sanguinem rapta significat.

APHOR. XLI. Aph. v, 61. — Steril.
L1

vj, 6, 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 408.

APHOR. XLII. Steril. vij, 1.

APHOR. XLIII. Aph. v, 30. — I. Morb. iij, 9. — Natur. Mul. xij, 17, 27. — II. Morb. Mul. lvij, 12, 29.

APHOR. XLIV. Natur. Mul. xix, 1, 3. — II. Mor. Mul. lxij, 20. — Steril. 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 444.

APHOR. XLV. Natur. Mul. xxxvij, 1, ad 5. — I. Morb. Mul. lxxxiv, 1, 2, 3, =¹ I. Morb. Mul. xij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 445.

APHOR. XLVI. Aër. Aq. Loc. xij, 3. — II. Prædict. xxxij, 2. — Natur. Mul. xix, 4, 5, 7. — Steril. x, 7, xv, 11, ad 14. — Superfoet. xvij, 1. =¹ Superfoet. ix. 4. — Aristotel. de Gener. Animal. j, 18. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 257; t. iv. p. 445.

Non quod omenti moles in ipsum de-

cumbat uterum, sed dum vicina premit et urget, ad ipsum usque uterum per-tingunt ponderis, aliquando immensi, incommoda.

APHOR. XLVII. Natur. Mul. vj, 5.
— I. Mor. Mul. xcj, 32 — II. Morb. Mul. xxix, 5. = ¹ Natur. Mul. viij, 1.
— *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 550.

Error hic maximi momenti in omnes ferè versiones quasi consenuit. ἔμμελον γεῖσθαι, sic notante Marciano, non aliter intelligi potest nisi *necesse est pus in cava effundi*: quo sensu ἔμμελον apud Hippocratem dicuntur, qui pure intra viscera affuso colliquescent. Hunc sensum collaudavit Haën; aliter propositio nullum offert rationalem sensum. *Vide* Hipp. de artic. de morbis mulierum lib. 2, et quæ doctè conguessit in hunc locum exemp'a Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVIII. Aph. v, 38. — II. Prædict. xxxiv, 10, 11. — II. Epid. vj, 32. — Superfœt. xvij, 10, 11, 12.

APHOR. XLIX. Aph. v, 35. — Coac.

iiij, 175. — Prænot. xiiij, 11. — II. Epid. v, 42, 43. — I. Morb. Mul. lxxvj, 6, 7; xciiij, 1, 6, 7. — II. Morb. Mul. xliij, 6, 7. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 512.

APHOR. L. II. Epid. vj, 33. — II. Morb. Mul. j, 4; ij, 17. =^a Cels. ij, 11, p. 83, l. 24; iv 20, pag. 233, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 620; t. iv, p. 539.

APHOR. LI. Aph. v, 54. — Octimest. iv, 5, 6, 7. — Superfoet. ij, 1, 2, 3; xix, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 403.

APHOR. LII. II. Epid. vj, 35, 36. =^a Cels. ij, 7, pag. 62, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440, 539.

APHOR. LIII. Aph. v, 37. — II. Epid. ij, 39 ad 42. — I. Morb. Mul. xlv. 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 440.

APHOR. LIV. Aph. v, 51. — Natur.

IN SECTIONEM V. 205

Mul. xxxj, 10. — II. Morb. Mul. xxij, 11; xlv, 11, 12; xlvj, 1, 2; xlvij, 1; xlix, 1, 2; l, 1, 2. =¹ Natur. Mul. xix, 9. =² I. Morb. Mul. xxiv, 2; lxvij, 5. — II. Morb. Mul. xvij, 24; l, 13. — *Vide* van-Swieten: t. iv, p. 403.

APHOR. LV. Aph. v, 30, 43. — Coac, iij, 408. =¹ Aph. ij, 28. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 433.

APHOR. LVI. Aph. v, 3. — Coac. iij, 424. — II. Morb. Mul. xij, 7, 9. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 451.

APHOR. LVII. ¹ Natur. xij, 5; xxxix, 1, 2, 5, 6; xl, 2, 5, 6. — I. Morb. Mul. xiv, 1, 12. — II. Morb. Mul. iij, v, vj, &c. =² De Genitur. vij, 8. — Natur. Puer. vj, 14; xij, 1. — Coac. Prænot. iij, 412, 413. — Virg. Morb. ij, 5 ad 14. — Natur. Mul. xvij, 1, ad 5. — I. Morb. Mul. iij, 1; x, 1, ad 5. — Superfoet. xxiv, 1. =³ Cels. ij, 7, p. 59, l. 29. — *Vide* van-Swieten, t. iv, 360.

APHOR. LVIII. ¹ Fistul. iij, 1; iv, 1
Mm

1. = ² Aph. vij, 13. — Int. Affect. xli, 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 243, t. iij; pag. 84, 172, 238; t. iv, p. 546.

Vicinia vasorum, imò et fibrarum communio pariunt hæc symptomata.

APHOR. LIX. Aph. v, 41. — Natur. Mul. vij, 9. — I. Morb. Mul. cvij, 1, &c. — II. Morb. Mul. xl, 20, 21. — Steril. vj, 3. — Superfœt. ix, 3; x, 9, 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 368.

Fidem his derogat Anatome.

APHOR. LX. Natur. Puer. v, 3. — I. Morb. Mul. xl, 2, 5, 9, 11; xliv, 4, 5, 6; xcix, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 439.

APHOR. LXI. Aph. v, 41. — I. Morb. Mul. xcix, 2. — Steril. vj, 9, 10. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 400.

APHOR. LXII. I. Morb. Mul. xxvj, 27 xxxij, 5; xxxiv, 1. = ² II. Prædict. xxxij, 2, ad 6.

IN SECTIONEM V. 207

APHOR. LXIII. ¹ Aliment. iv, 1, 2, 5. = ² Aliment. vj, 3, 4, 6, 7

APHOR. LXIV. Ægin. xij, 7. =
¹ I. Morb. Mul. lxxxviiij, 22. =
² Aph. iv, 73. = ³ Int. Affect. iv, 23; xj, 26. = ⁴ Il. Mor. Mul. viij, 21. = ^a Cels. iij, 22, pag. 170, l. 7. = ^b Cels. iij, 22, pag. 170, 11.
 — Aretæus de Curat. Acut. 1, 3.
 — *Vide* van-Swienten, t. ij, p. 196; t. iv, p. 40, 96.

Dum caput dolet, et in quavis febre, vel primariò, vel sympathicè patitur ventriculus: res evidentior est, si murmurent hypochondria, si plexûm nervosorum abdominalium irritatio, costas melancholicè attollat. Hinc facilè degener lac corrumpitur, acescit. Laborat pariter ventriculus, si bilis copiosius erumpens coctioni deficiat; si febris omnes succos vitiet, si hæmorrhagia vires postraverit. Hæc absint signa, dulce gustu, dulce facultate lac acria involvit, vires reficit, nutrit optimè.

M m ij

APHOR. LXV. II. Epid. iij, 129 ad 132. =^a Cels. ij, 7, p. 62, l. 5.

Firma ab Hippocratis ævo, ad nostrum usque, prognosim hanc demonstravit experientia, quam nulla assequi potest Recentiorum theoria. *Vide* de his præcipuè clarissimum Duretum nostrum in Coacas, cap. iv, p. 114 et seq.

APHOR. LXVI. II. Epid. iij, 128, ^a Cels. v, 26, p. 295, l. 31. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

APHOR. LXVII. II. Epid. iij, 128. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

Laxi dicuntur tumores qui humore alluuntur ad partem affluentem, ex ordine naturæ, solutionemque facilem promittunt. Crudi sunt tumores qui, vel erethismo constricti, vel languentis circuitus vi vitali destituti sunt.

APHOR. LXVIII. Loc. in Hom. xlix, 10. — II. Prædict. xxxvj, 5, 6. — VI. Epid. ij, 48. — Affection. ij, 10, 11. — Soran. Ephes. Isagog. c. xxj.

IN SECTIONEM V. 209

APHOR. LXIX. II. Epid. iij, III. — VI. Epid. iij, 30, ad 35. = ¹ Natur. Puer. xvij, 2, 3, 14, xvij, 1. — Lege hîc observationem D. de Villebrune.

APHOR. LXX. Aph. ij, 26. — I. Epid. iij, 17, 18. — VI. Epid. vj, 16; viij, 95, 96, 97. = ¹ San. Tuend. ad Dem. 12. = ² Vid. Aph. iv, 57. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 3, 476, t. iij, pag. 437.

APHOR. LXXI. VI. Epid. vj, 29.

APHOR. LXXII. Fateor rem mihi experientiâ non adeò veram videri; imò theoriæ repugnat, cùm debilissîma sit in ictero coctio, nisi de eo intelligatur ictero in quo bilis exundat undequaque; aut particula & præposterè addita fuerit, ut vult Galenus in hunc Aphorismum.



Τ Μ Η Μ Α Ἑ Κ Τ Ο Ν.

α. Ἐν τῇσι χρονίῃσι λειντέρησιν ὀξυρεσίῃ ὀπιγίνομυ, μὴ γενομυ πρότερον, σημεῖον ἀγαθόν.

β. Οἷσι ρῖν εὐρύτερα φύσει, καὶ ἡ γονὴ ὑγρότερη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ τάναντία, ὑγιεινότερον.

γ. Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντέρησιν αἷ δ' ἀπιστία, κακόν· καὶ σὺν ^α πυρελῶ, χύκιον.

δ. Τὰ πειμάδηρα ἔλκεα ^α κακοήθεια.

ε. Τῶν ὀδυνέων εἰ ἐν πλευρῇσι, εἰ ἐν στήθεσι, εἰ ἐν τοῖσιν ἄλλοις (μέρεσιν) ἢ μέγα λυφάσκει, καλὰ μαθητέον.

S E C T I O S E X T A.

1. **I**N diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

2. Quibus nares naturâ humidiores, et genitura humidior, imperfectiùs sani sunt : quibus verò contraria, perfectiùs.

3. In longis dysenteriis appetitus prostratus, malum : et ^a cum febre, pejus.

4. Ulcera circum - glabra ^a maligna.

5. Dolores et in lateribus, et in pectoribus, et in ceteris (partibus,) si multum differant, considerandum.

6. Renum et vesicæ dolores difficulter sanantur *in* senibus.

7. Dolores qui in ventre fiunt, elati quidem, leviores: non elati verò, vehementiores.

8. Hydropicis ulcera in corpore orta ^a non facile sanantur.

9. Efflorescentiæ latæ non admodum pruriginosæ.

10. Caput ^a laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

11. Melancholicis, et nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

12. Ab hæmorroidibus sanato diuturnis, nisi una servata fuerit, periculum ^a est ne hydrops superveniat, aut tabes.

ε'. Τὰ νεφρίικα, καὶ ὅκοντα κτ' τὴν κύσιν ἀλγήμελα, ἐργαδῶς ὑγιάζει) τοῖσι πρεσβύτησι.

ζ'. Τὰ ἀλγήμελα τὰ κτ' τὴν κοιλίην γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κενότερα· τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

η'. Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ^α ἐν τῷ σώματι, ἐρηιδίως ὑγιάζει).

θ'. Τὰ πλατέα ὕξανθήματα ἐ πάνυ τι κνησμάδεα.

ί. Κεφαλὴν ^α πονέοντι, καὶ ὤρειον, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ρυέν κτ' τὰς ρίνας, ἢ κτ' τὸ σῶμα, ἢ κτ' τὰ ὦτα, λύει τὸ νέσσημα.

ιά. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφρίικοῖσιν, αἱμορροΐδες ἐπιγινόμεναι, ἀγαθόν.

ιβ. Αἱμορροΐδας ἰσθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ^α ὕδρωπα ἐπιγίγνεται, ἢ φθείσιν.

N n

ιγ'. Ὑπὸ λυγμῶ ἐχομδῶ παρμοὶ
 ἂ ἐπιγλυόμφοι λίσσι τ' λυγμόν.

ιδ'. Ὑπο ὕδρωπος ἐχομδῶ, τ' κτ'
 τας φλέδας ἐς τὴν κοιλίῳ ὕδαλῳ
 ῥυένλῳ, λύσις.

ιε'. Ὑπὸ Δερρόϊης ἂ ἐχομδῶ μα-
 κρῆς, ἀπὸ ταυτομάτῃ ἐμείῳ ἐπιγλυό-
 μφοι λύει Δερρόϊαν.

ισ'. Ὑπὸ πλευρίτιδῳ, ἢ ὑπὸ πει-
 πλεμονίης ἐχομδῶ ἂ Δερρόϊα ἐπι-
 γλυόμφοι, κακύν.

ιζ'. Ὀφθαλμιῶντα ἂ ὑπὸ Δερρόϊης
 ληφθῆναι, ἀγαθόν.

ιη'. Κυτίν Δερκοπέντι, ἢ ἐκέφαλον,
 ἢ καρδίῳ, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων
 τι τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίῳ, ἢ ἥπαρ,
 θανατῶδες.

ιθ'. Ἐπὴν Δερκοπῆ ὁσέον, ἢ χόν-

S E C T I O VI. 215

13. A singultu detento sternutationes^a supervenientes solvunt singultum.

14. Ab hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

15. A diuturno alvi^a profluvio detento, spontè superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

16. A pleuritide, aut à peripneumoniâ detento, alvi^a profluvium superveniens, malum.

17. Ophthalmiâ^a laborantem alvi profluvio corripit, bonum.

18. Cui persecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut

cartilago, ¹ aut nervus, ² aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis effusus ² fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

21. Insanientibus si varices, ² aut hæmorrhoides supervenerint, insanientiæ solutio fit.

22. Quæ ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venæsectio solvit.

23. Si metus et ² tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

25. Erysipelas foris quidem intro

δρϙ, ¹ ἢ νεῦρον, ² ἢ γνάθος τὸ λεπτὸν, ἢ ἀκροποσθίη, ἔτε ἀύξει, ἔτε ζυμφύει).

κ'. Ἦν ἐς τὴν κοιλίαν αἷμα ² ἐκχυθῇ ὡς αὖ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

κά. Τοῖσι μαγνομήμοισι, κισσῶν, ² ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγενομένων, τ' μαλινῆς λύσις.

κβ'. Ὀκόσα ῥήγματα ἐκ τῆς νώτης ² ἐς τὰς ἀγκῶνας κατὰβαίνει, φλεβοτομή λυεῖ.

κγ'. Ἦν φόβος ἐ ² δυοθυμίῃ πολλὸν χρόνον διελιγμένη, μελαγχολικὸν τὸ τοῖστον.

κδ'. Ἐντέρων ἦν διςκοπῇ τῶν λεπτῶν τι, ἔ ζυμφύει).

κε'. Ἐρυσίπεγας ἔξωθεν μὲν εἶσα

τρέπεας, ὅτε ἀγαθόν· ἔσωθεν ᾧ ἔξω,
ἀγαθόν.

κς'. Ὅκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσιν καύσοις
τρομοὶ ^α γένων), ὡδρακοπὴ λύει.

κζ'. Ὅκόσοι ἔμπυοι, ^ι ἢ ὑδρωπι-
κοὶ ^α κάρων), ἢ τέμνον), ἐκρυέν-
τῳ ᾧ πύς, ἢ ᾧ ὑδατῳ ἀθρόα, πάν-
τως δ' ὑπόλυν).

κή. Εὐνῆχοι ^α εἰς ποδαγριῶσιν, ^α
εἰδ' ἐφαλακροὶ γίνων).

κθ'. Γυνὴ εἰς ^α ποδαγριᾶ, ἣν μὴ τὰ
καλαμῆνια ^β αὐτὴ ἐκλίπη.

λ'. Παῖς ^ε εἰς ποδαγριᾶ, πρὸ ᾧ
ἀφροδισιασμῶ.

λά. Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοπο-
σίη, ἢ λελρόν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτο-
μίη, ἢ φαρμακείη λύει.

λβ'. ^ι Τραυλοὶ ὑπὸ ἀλγάρροίης μά-
λισα ἀλίσκον) μακρῆς.

verti, non bonum : intùs verò foràs ,
bonum.

26. Quibus in febre ardente tremores ^a fiunt, delirium solvit.

27. Qui suppurati, ¹ aut hydropici ^a uruntur, aut secantur, *hi* pure, aut aquâ acervatim effluente, omninò moriuntur.

28. Eunuchi ^a non laborant podagrâ, ¹ neque calvi fiunt.

29. Mulier non ^a laborat podagrâ, nisi menses ^a ipsi defecerint.

30. Puer ^a non laborat podagrâ, ante Veneris usum.

31. Oculorum dolores meri potus, aut balneum, ^a aut fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio solvit.

32. ¹ Balbi ab alvi profluvio maximè corripuntur longo.

33. Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt.

34. Qui calvi *sunt*, his varices magni non fiunt. Quibus verò dum sunt calvi superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tuſſis ^a superveniens, malum.

36. Urinæ difficultatem venæ sectio solvit : secundæ verò internæ.

37. Ab anginâ detento tumorem ^a fieri in collo, bonum : foràs enim morbus vertitur.

38. ¹ Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim citò pereunt. Non curati verò longius tempus perdurant.

39. Convulsio fit, aut à repletionem, aut ab evacuatione. Sic quidem etiam singultus.

λγ'. Οἱ ὀξυρεγμειώδεις ἔ πάνυ τι πλευρίτικοι γίνονται).

λδ'. Οκόσοι φαλακροὶ, τετέοισι κισσοὶ μεγάλοι ἔ γίνονται). ὁκόσοισι δ' ἂν φαλακροῖσιν ἔσσι κισσοὶ ὅπιγένων), πάλιν ἔτοι γίνονται) δασέες.

λέ. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βήξ^α ὅπιγενομήνη, κακόν.

λς'. Δυσχερίλυ φλεβοτομή λυεῖ τάμνειν ἢ τὰς εἴσω.

λζ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομήνη^α οἶδημα γλυέας ἐν τῇ τραχήλῳ, ἀγαθόν· ἔξω γ' τρέπεται) τὸ νέσσημα.

λη'. Οκόσοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται), μὴ θεραπεύειν βέλγιον· θεραπευόμενοι γ' ἀπόλλυνται) ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι ἢ πλείω χρόνον ἀλγέλῃσι.

λθ'. Σπασμὸς γίνεεται) ἢ ὑπὸ πληρώσει, ἢ κενώσει. ἔτω ἢ καὶ λυγμός.

μ'. Ὀκόσοισι ὡεὶ τὸ ὑποχόνδριον
πόννοι γίνονται ἄτερ ^α φλεγμονῆς,
τετέοισι πυρετὸς ἐπιγλυόμενος λύει τὸ
πόννον.

μά. Ὀκόσοισι Δάπτουν τι ἐὼν ἐν
τῷ σώματι μὴ Δάσημαίνει, τετέοισι
Δὰ παχύτητα ἔ' πύς, ἢ ἔ' τόπυ,
ὅση Δάσημαίνει.

με'. Ἐν τοῖσιν ἐκτερικοῖσι τὸ ἥπαρ
^α σκληρὸν γινέσθαι, πονηρόν.

μεγ'. Ὀκόσοι σπλινῶδες ὑπὸ ^α
δυσεντερίης ἀλίσκον), ^ι τετέοισιν,
ἐπιγνομήνης μακρῆς ὁ δυσεντερίης,
^α ὕδραψ ἐπιγίνε), ἢ λειεντερίη, καὶ
ἀπέλλυν).

μεδ'. Ὀκόσοισιν ἐν ^α τραυγερίας
εἰλὸς ἐπιγίνε), ἐν ἐπὶ τὰ ἡμέρησιν
ἀπέλλυν), ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιγλυόμενος
ἄλλας τὸ ἔρον ρύη.

40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt, absque^a inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

42. In ictericis hepar^a durum fieri, malum.

43. Qui lienosi à dysenteriâ^a corripuntur, his longâ superveniente dysenteriâ, hydrops supervenit, aut intestinorum lævitas, et pereunt.

44. Quibus ex^a urinæ stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abundè fluxerit.

45. Ulcera quæcumque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, ¹ et cicatrices cavas fieri.

46, ¹ Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt.

47. Quibus venæ sectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

48. Lienosis dysenteria ^a superveniens, bonum.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hi, sedatâ inflammatione, in quadraginta diebus decedunt.

50. Quibus perscissum fuerit cerebrum ¹, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

51. Quibus sanis dolores derepentè

μέ. Ἐλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνε),
ἢ μακρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη
ὀστέον ἀφίσααθ, ἢ ἐ τὰς ἐλάς κοίλας
γίνεαθ.

μς. Ἰ. Ὀκόσοι ὑδοὶ ἐξ ἁδμαῖθ, ἢ
βηχὸς γίγνον) πρὸ τῆς ἡδης, ἀπόλ-
λυν).

μζ. Ὀκόσοισι φλεβοτομή, ἢ φαρ-
μακεῖν συμφέρει, τετέως προσῆκον ἔ
ἦρθ φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακεύειν.

μη. Τοῖσι σπλῆνώδεσι^α δυσεντερία
ἐπιγνομή, ἀγαθόν.

μθ. Ὀκόσα ποδατρικὰ νεσθήματα
γίγνον), ταῦτα δ' ἀποφλεμῆναντα^α ἐν
τεσσαράκοντα ἡμέρησιν δ' ἀποκαθίσαν).

ν. Ὀκόσοισιν ἂν ὁ ἐκκέφαλθ^α ἀλα-
κοπῇ, τετέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ
χολῆς ἐμεῖον ἐπιγίνεαθ.

νά. Ὀκόσοισιν ὑγιάναςιν ὀδύνα γί-

ἵνον) ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, ἐ παρα-
 ραχοῆμα ἄφανοι γίνον), ἐ ρέγχεσιν,
 ἀπόχυν) ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν, ἢ ἢν μὴ
 πυρετὸς ὀπλάσῃ.

νβ'. Σκοπεῖν ἢ χρὴ ἐ τὰς ὑποφά-
 σιας τῶ ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν.
 ἢν γὰρ τι ὑποφαίνῃται, ξυμβαλλο-
 μέων τῶ βλεφάρων, ^α τῶ λευκῷ, μὴ
 ἐκ Διερροίης πονέοντι, ἢ ἐκ φαρμακοπο-
 σίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον, ἐ θανα-
 τῶδες σφόδρα.

νγ'. Αἱ πρὸς φροσύνα, αἱ μὲν μὲν
^α γέλωτι γινόμενα, ἀσφαλέστερα· αἱ
 ἢ μὲν σπασθῆς, ὀπισφαλέστερα.

νδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθει τοῖσι
 μὲν πυρετῷ, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπ-
 νοαί, κακαί.

νε'. Τὰ ποδάγριγὰ ^α, τῶ ἥρῳ ἐ τῶ
 φθινοπωρῷ, κινέει) ὡς ὅτι τὸ πολὺ.

fiunt in capite, et statim muti fiunt, ac stertunt, in septem diebus pereunt, ¹ nisi febris apprehenderit.

52. Considerare verò etiam oportet oculorum subtùs apparentia in somnis. Si enim albi quid^a, palpebris commissis, subtùs appareat, *id* que non ex alvi profluvio sit, aut ex potione purgante, pravum signum, et valdè lethale.

53. Deliria, cum^a risu quidem accidentia, securiora : cum studio verò, periculosiora.

54. In acutis affectionibus quæ cum febre *sunt*, luctuosæ respirationes, malæ.

55. Podagrici *morbi*, vere et autumno, moventur ut plurimùm.

56. ¹ Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt *humorum* ² decubitus, ³ aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.

57. Apoplectici autem fiunt maxime, ætate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

58. Si omentum exciderit, necesse est putrefieri.

59. Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, et rursus incidit, his mucus innascitur.

60. ¹ Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa ² excidit, his crus tabescit, ³ et claudicant, nisi ulti fuerint.



νς'. ¹ Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νουή-
μασιν ἐς τὰδε ἐπικίνδουσι ² αἱ δ' ὑπο-
σκήψεις, ³ ἢ δ' ὑποληξίην ἔσάμαλτο,
ἢ σπασμόν, ἢ μανίην, ἢ τύφλωσιν ση-
μαίνουσι.

νζ'. Ἀπόωληκτοὶ ἢ μάλιστ' αἰγίνοντο,
ἡλικίῃ τῇ δ' ὑπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων
ἄχρις ἐξήκοντα.

νη'. Ἦν ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀνάσκη
δ' ὑποσπῶνται.

νθ'. Ὅκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδ' ἐνο-
χλαμύοισι χρονίης ὀξείας τὸ ἰχίον,
καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τετέοισι μύζαι ἐπι-
γίνοντο.

ξ'. ¹ Ὅκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδ' ἐνο-
χλαμύοισι χρονίης τὸ ἰχίον ² ὀξείας,
τετέοισι τήκεται τὸ σκέλεος, ³ καὶ χα-
λῶν, ⁴ ἢ μὴ καυθῶσιν.



N O T Æ

I N

SECTIONEM SEXTAM.

APHOR. I. II. Epid. ij, 49, 50, 51.
— I. Morb. vj, 10. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 116; t. ij, p. 341.

Signum est scilicet restitutæ incipientis quantumvis leviter coctionis. Aliter rem intelligit Russel œconomiâ Naturæ in Glandul. p. 125.

APHOR. II. IV. Epid. vj, 37. — *Vide* Boerhaav. de Morbis fibræ debilis et laxæ, et Commentaria van-Swieten in §. 24 et sequentes.

APHOR. III. VI. Epid. viij, 1. — Coac. vj, 100. = ^a Cels. ij, 8, pag. 69, l. 5.

IN SECTIONEM VI. 231

APHOR. IV. VI. Epid. viij, 2. =
^a Cels. v, 26, §. 31, p. 300, l. 10.

Cum scilicet circa ulceris limbos nulla inflammatio vasa in tumorem attollit, illaque ulceri suppuranti non favet; licet illud sit naturæ actuosæ votum.

APHOR. V. II. Prædict. xvij, 4; xix, 6, 7; xx, 4; — VI. Epid. vij, 83. — Vict. Acut. liij, 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 75.

APHOR. VI. VI. Epid. viij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 222.

Solida atona in senibus induruere; liquida minus cocta sunt; perspiratio minor; vesica ex rei necessitate iners et corrugata.

APHOR. VII. Hi, dum intestina distendunt, flatus et humores ad exitum promptos indicant, illi fixum in membranis, aut glandulis acre irritans ostendunt; exemplo sit colicus pictorum dolor.

Qq ij

APHOR. VIII. ^a Cels. iij, 21, p. 161, l. 4. — *Vide* van-Swieten, t. j, 209.

Frustrà ab humorum compage solutâ penitùs et perversâ pus bonum sperare-mus. Quod tamen ad medelam ulcerum necessarium est.

APHOR. IX. VI. Epid. ij, 52. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 360.

APHOR. X. Judicat. xij, 3. — Coac. ij, 25, 26, 27, 59. — Sal. Diæt. xiv, 4. — VII. Epid. xxx, 6, 16. — II. Morb. ìv, 18; xij, 1, ad 7; xvj, 10. — III. Morb. ij, 6, 7, 8. = ^a Cels. ij, 8, p. 70, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 411; t. iij, p. 308.

APHOR. XI. Aph. vj, 21. — Humor. xj, 1. — Judicat. x, 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 787; t. iij, p. 233.

APHOR. XII. Humor. xj, 3. — IV. xxxj, 1, 2. — V. Epid. x, 18, ad 21. Epid. — VI. Epid. iij, 65. = ^a Cels. ij,

IN SECTIONEM VI. 233

7, p. 62, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 19.

APHOR. XIII. Prænot. xij, 11. — Coac. iij, 175. =^a Cels. ij, 8, p. 69, l. 27. — Van-Swieten, t. ij, p. 243, t. iv, p. 465.

APHOR. XIV. Aph. vij, 29. — Flat. xvij, 8, 9. — Judicat. xj, 20. — Coac. iij, 285, 289. — I Morb. vj, 7. — II. Morb. lxix, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 338, 347; t. iv, p. 165.

APHOR. XV. II. Diæt. xxvj, 15, 16. — Loc. in Hom. xlv, 8. — Coac. iij, 7. =^a Cels. ij, 8, pag. 69, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 354.

Non tam impete vomitûs facto vacuatur morbi fomes, quàm minuitur et invertitur motus peristalticus celerrimè deorsùm vergens.

APHOR. XVI. Aph. v, 12, 14. — Loc. in Hom. xxix, 15, 16, 17. — I.

Morb. vj, 5; x, 41. — III. Morb. xvij, 59. =^a Cels. ij, 8, pag. 71, l. 10. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 345, 671.

Putridam enim testatur morbi indolem profusus et symptomaticus alvi fluxus. Tenuiora, diluentia, à parte inflammata avertit. Vires morbo ferendo reddit impares.

APHOR. XVII. Judicat. xij, 9. — Coac. ij, 130, 133. =^a Cels. ij, 8, pag. 69, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345, 350.

APHOR. XVIII. Aph. vj, 24. — II. Prædict. xix, 2, ad 6, 11, 12; xxij, 1. — Coac. iij, 387, 388, 389. — I. Morb. iij, 4; vij, 21. =^a Cels. v, 26, §. 2, p. 283, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 478.

Docet contrarium experientia, laterali calculi operatione.

APHOR. XIX. Aph. vij, 28. —

IN SECTIONEM VI. 235

Coac. iij, 380, ad 382. — II. Prædic. xxiv, 1. — I. Morb. iij, 32, 33; vij, 21. =^a Cels. ij, 10, p. 81, l. 24; v, 26, §. 22, p. 291, l. 28. — Aristotel. histor. Animal. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 513.

Meliora docuit recentiorum observatio.

APHOR. XX. Aph. vij, 38. — I. Mor. iij, 37; x, 42, ad 48, xij, 4; xv, 4. =^a Cels. ij, 7, p. 62, l. 29. — *Vide* van-wieten, t. j, p. 255, 438; t. iij, p. 665.

Non suppuratone verâ, sed corruptelâ degener fit, si non resorbeatur sanguis.

APHOR. XXI. Aph. vij, 5. — Humor. xj, 1. =^a Cels. ij, 8, p. 69, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 304, 553, 554; t. iij, p. 284, 510.

APHOR. XXII. II. Cels^a ii, 10, p. 81, l. 8.

Nomine τῶ ῥήματος Antiqui causas intellexêre quæ fibras divellunt, aut

distrahunt. Galenus credidit legendum
ἀληθῆματα.

APHOR. XXIII. Aph. vij, 40. =
^a Cels. ij, 7, p. 62, l. 17. — *Vide van-*
Swieten, t. iij, p. 467.

APHOR. XXIV. Aph. vj, 18, 19. —
II. Prædict. xix, 4. — Coac. iij, 379,
387. — I. Morb. vij, 21. — *Vide van-*
Swieten, t. j, p. 478, 482.

Contrarium docuit sera Recentiorum
experientia.

APHOR. XXV. Aph. vj, 37. —
Prænot. vij, 3; xxij, 9. — Coac. iij,
103. — I. Morb. vj, 8, 9. — *Vide van-*
Swieten, t. ij, p. 73, 369.

APHOR. XXVI. Judicat. xj, 10. —
Coac. j, 185. = ^a Cels. ij, 8, p. 69,
l. 34. — *Vide van-Swieten*, tom. ij,
p. 441.

Vel malo omine solvit levius malum
noxa gravior, vel delirium febrile tollit
convulsivos tremores; vel dum instan-

tem præagit hæmorrhagiam signum
proximius, remotiora sanat.

APHOR. XXVII. Aph. ij, 51; vij, 44. — Coac. iij, 91, 92. — II. Morb. xlv, 24, ad 28. — III. xxvij, 2, 8, 14. — Int. Affect. iv, 30; x, 20, ad 23; xxv, 33, ad 36; xxvij, 5. =¹ VI. Epid. vij, 62. =^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 26. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 463, 655, t. iij, p. 680; t. iv, p. 120, 209.

APHOR. XXVIII. ¹ Natur. Puer. xvij, 4, 5, 6; xix, 1. =^a Cels. iv, 24, p. 237, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 255.

APHOR. XXIX. V. Epid. xxxij, 5, 6. — VI. Epid. vij, 98, ad 106. — VII. Epid. xlix, 12. — I. Morb. Mul. xij, 6, 13. =^a Senec. Ep. xcv. =^a Cels. iv, 24, p. 237, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 254.

APHOR. XXX. Coac. iij, 395. =^a Cels. iv, 24, p. 237, l. 20. — *Vide* Russel, œconom. Naturæ in Glandul.

— *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 254.

APHOR. XXXI. Aph. vij, 46. — II. Epid. vj, 26. =^a Cels. vj, 6, p. 348, l. 10.

Prout à causis contrariis possunt oriri.
Lege hîc notas Cl. de Villebrune.

APHOR. XXXII. ¹ Præcept. xij, 1, ad 5. — Coac. ij, 147. — Verat. us. j, 12. — *Vide* Commentatores in hunc Aphorismum non satis experientiæ consonum.

APHOR. XXXIII. *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 13.

APHOR. XXXIV. II. Epid. v, 40. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 553.

APHOR. XXXV. Aph. vij, 47. — II. Prædict. xj, 1, 16. — II. Epid. v, 28. =^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 25. — *Vide* Galenum in hunc Aphorismum. *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XXXVI. Aph. vij, 48.

IN SECTIONEM VI. 239

De delectu venarum multi scripsêre ,
pauci consentiunt.

APHOR. XXXVII. Aph. vij, 49. =
^a Cels. iv, 4, p. 196, l. 18; pag. 197,
l. 14.

APHOR. XXXVIII. ¹ II. Prædict.
xviij, 5, 9; xxj, 5. — II. Morb. Mul.
xxiiij, 25. — *Vide* van-Swieten, t. j, p.
795, 802, 821, 828.

APHOR. XXXIX. *Vide* van-Swiet.
t. j, p. 342; t. ij, p. 242, 320; t. iiij, p. 441.

Quod plenitudinem spectat , veteres
ad eam retulêre , sub fluxionis nomine ,
varia irritationis genera , ut eos accurate
legenti satis patebit.

APHOR. XL. Aph. iv, 73; vij, 52.
— Coac. 3, 272. = ^a Cels. ij, 8, p.
70, l. 3; iiij, 10, p. 139, l. 17.

Scilicet à stagnantibus orta humori-
bus circa hypochondria gravitas, et natus
ab infarctu dolor , novâ vi motûs circu-
laris per febrem additâ, solvuntur.

APHOR. XLI. Coac. ij, 238, 239. — II. Morb. xlv, 14. — III. Morb. xxvij, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 667.

APHOR. XLII. Aph. iv, 64. — Coac. ij, 223, 225, ad 229. =^a Cels. ij, 8, p. 74, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 139.

APHOR. XLIII. Aph. vj, 48; vij, 76. — Coac. iij, 295, 296. =¹ I. Morb. iij, 27. =² Coac. iij, 275. — Affect. xxj, 23; xxij, 3; xxvij, 1. =^a Cels. ij, 8, pag. 74, l. 24. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 155.

Rupta esse vasa lienis, ipsumque corruptum dysenteria talis indicat. Alioquin Aph. 48, bona dicitur, si ex naturæ vi enata, motu vasis addito, infarctum lienis tollere sit idonea.

APHOR. XLIV. Judicat. xij, 2. — Coac. iij, 314; v, 75, 87. =^a Cels. ij, 8, p. 70, l. 7; ij, 8, p. 74, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 230.

IN SECTIONEM VI. 241

APHOR. XLV. Fractur. xxxvj, 2.
= ¹ Ulcer. v, 4. — *Vide* van-Swieten,
t. j, p. 311, 875.

APHOR. XLVI. ¹ Articul. xxxvij, 1,
4, 5, 6; xxxvij, 4, 5. — Vectiar, xxj,
6. — *Vide* Ballonium. Cons. 51, p. 204.

APHOR. XLVII. Aph. vij, 53.

Vere rarescunt humores, motus in-
tenditur, liquescunt spissiora, canali-
bus libertas inducitur.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 43. —
Coac. iij, 295. — I. Morb. vj, 7. =
^a Cels. ij, 8, p. 70, l. 1. — *Vide* van-
Swieten, t. iij, p. 140, 155.

APHOR. XLIX. Judicat. vj, 3. = ^a
Cels. iv, 24, p. 240, l. 1. — *Vide* van-
Swieten, t. iv, p. 280.

APHOR. L. II. Prædict. xxij, 12, 16;
xxij, 5, ad 11. — Coac. iij, 371, 383,
384. — III. Morb. j, 3, 9. = ^c Cels. v.
26, p. 296. l. 14. — *Vide* van-Swieten,
t. j, p. 395.

Hoc et in capitis vulneribus, aut commotionibus experientia declarat.

APHOR. LI. Judicat. xij, 4, 5, 6. — Coac. ij, 6; iij, 320 ad 323. — II. Morb. vj, 1, 2, 3, 4, 7; xxj, 2 ad 12. — III. Morb. viij, 2, 3. =¹ I. Prædic. x, 13; xij, 8. =^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 14.

APHOR. LII. Prænot. iij, 1. — I. Prædict. xj, 2. — Coac. ij, 124. =^a Cels. ij, 6, pag. 54, l. 20; ij, 8, pag. 72, l. 18.

APHOR. LIII. Coac. j, 141. =^a Cels. iij, 18, p. 154, l. 32. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 294, 549.

APHOR. LIV. Oppressum scilicet thoracem, languentem, aut impeditum per vasa pulmonalia sanguinis circuitum arguunt luctuosa suspiria. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 391.

APHOR. LV. Aph. iij, 20. =^a Cels. ij, 1, pag. 43, l. 28; iv, 24, p. 238, l. 3. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 253.

IN SECTIONEM VI. 243

APHOR. LVI. ¹ Aph. vij, 40. = ² Vict. Acut. xlv, 3. — II. Prædict. xij, 3. = ³ Coac. iij, 316, 317. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 275, 481, 496, 507.

APHOR. LVII. Aph. iij, 31. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 276, 496.

APHOR. LVIII. Coac. iij, 378. — I. Morb. iij, 36.

Distinctionem adhibe ex van Swieten, t. j, p. 484.

APHOR. LIX. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335, 550; t. v, p. 618, 630.

APHOR. LX. ¹ Glandul. x, 6, 7, 8. = ² I. Morb. iij, 16. — Int. Affect. lvij, 2. = ³ Aër. Aq. Loc. xlvij, 5. — Affect. xxx, 12. = ⁴ Cels. iv, 23, p. 236, l. 19. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335; t. v, p. 630.

De capsulæ ligamentosæ infarctu et tumore indè exorto res intelligenda est.



S s ij

Τ Μ Η Μ Α ΕΒΔΟΜΟΝ.

α. ἘΝ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύ-
ξις ^α ἀκρωτηρίων, κακόν.

β. Ἐπὶ ὀσέω νοσέοντι σὰρξ πελι-
δνή, κακόν.

γ. Ἐπὶ ἐμέτῳ ^α λυγξὶ καὶ ὀφθαλμοὶ
ἐρυθροὶ, κακόν.

δ. Ἐπὶ ἰδρῶτι ^α φρίκη, ἔχρησόν.

ε. Ἐπὶ μανίᾳ δυσεντερίᾳ, ἢ ὕδρωψι,
ἢ ἑκτασις, ἀθάτον.

ς. Ἐπὶ νέσῳ πολυχρονίᾳ, ἀποσι-
τίη ^α καὶ ἀκρητοὶ ^β ὑποχωρήσεις, κα-
κόν.

ζ. Ἐκ πολυποσίτης ῥίγηθι ἔσθλα-
φροσύνη, κακόν.

η. Ἀπὸ φύμαθι εἴσω ῥήξειθι ἐκλυ-
σις, ἐμεῖθι, καὶ λειποψυχίη γίγνεται.

SECTIO SEPTIMA.

1. **I**N morbis acutis ^a extremarum partium frigus, malum.

2. Ex osse ægrotante caro livida, malum.

3. A vomitu singultus ^a, et oculi rubri, malum.

4. A sudore ^a horror, non bonum.

5. Ab insaniâ dysenteria, aut hydrops, aut exstasis, bonum.

6. In morbo diuturno appetitus prostratus, ^a ¹ et meracæ ^b dejectiones, malum.

7. A multo potu rigor, et delirium, malum.

8. A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, et animi deliquium fit.

9. A sanguinis fluxu ^a delirium ,
aut etiam convulsio , malum.

10. Ab ileo vomitus , aut ^a singul-
tus , aut convulsio , aut delirium , ma-
lum.

11. A pleuritide ^a peripneumonia ,
malum.

12. A peripneumoniâ phrenitis ,
malum.

13. Ab ardoribus veñementibus ^a
convulsio , aut tetanus , malum.

14. A plagâ ^a in caput , stupor , aut
delirium , malum.

15. A sanguinis sputo , puris spu-
tum , malum.

16. ¹ A puris sputo , tabes , et flu-
xus , malum. ² Postquam verò spu-
tum ^a retinetur , moriuntur.

17. Ab hepatis inflammatione ^a sin-
gultus , malum.

θ'. Ἀπὸ αἵματι^ς ῥύσει^α ὠχραφρο-
σύνη, ἢ ὁ σπασμὸς, κακόν.

ι'. Ἐπὶ εἰλεαί^ς ἐμεί^ς,^α ἢ λυγξ,
ἢ σπασμὸς, ἢ ὠχραφροσύνη, κα-
κόν.

ια'. Ἐπὶ πλούριτιδι^α ὠειπνύμο-
νίη, κακόν.

ιβ'. Ἐπὶ ὠειπνύμονίῃ φρενίτις,
κακόν.

ιγ'. Ἐπὶ καύμασιν ἰχυροῖσι^α σπα-
σμὸς, ἢ τέταν^ς, κακόν.

ιδ'. Ἐπὶ πληγῇ^α ἐς τὴν κεφαλὴν
ἐκπληξίς, ἢ ὠχραφροσύνη, κακόν.

ιε'. Ἐπὶ αἵματι^ς πτύσει^ς πύκ^ς πύ-
σις, κακόν.

ισ'.¹ Ἐπὶ πύκ^ς πτύσει^ς φρίσις καὶ
ῥύσις, κακόν.² ἐπὴν ᾧ το πτύελον^α
ἴχη^ς, ἀποθνήσκουσιν.

ιζ'. Ἐπὶ φλεγμονῇ^ς ἥπατι^ς λυγξ,
κακόν.

ιή. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς ^α ἢ
 πρῶτα φροσύνη, κακόν.

ιβ. Ἐπὶ ὅσας φιλάσει ἐρυσίπτελας
 (κακόν).

ιγ. Ἐπὶ ἐρυσιπέλασι ζηπεδῶν, ἢ
 ἐκπύσεις (κακόν).

ιδ. Ἐπὶ ἰχυρᾷ ζυγμᾷ ἐν τοῖσιν
 ἔλκεσιν ^α αἰμορραγίῃ, (κακόν).

ιε. Ἐπὶ ὀδύνη πολυχρονίῃ ἢ πρῶτα
 τὴν κοιλίαν, ἐκπύσεις, (κακόν).

ις. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει ^α δυ-
 σεντερία, (κακόν).

ιζ. Ἐπὶ ὅσας ἀλακοπῇ πρῶτα φρο-
 σύνη, ἢν κενεὸν λάβῃ.

ις. Ἐκ φαρμακοποσίης ζπασμὸς,
 θανατῶδες.

κς. Ἐπὶ ^ι ὀδύνη ἰχυρῇ ἢ πρῶτα
 τὴν κοιλίαν ἀκρωτηρίων ^α ψύξεις,
 κακόν.

S E C T I O VII. 249

18. A vigiliâ convulsio, aut delirium, malum.

19. Ab ossis denudatione erysipelas, (malum).

20. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, (malum).

21. A forti pulsu in ulceribus, sanguinis^a eruptio, (malum).

22. A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, (malum).

23. A meracâ dejectione^a dysenteria, (malum).

24. Ab osse persciso delirium, si in vacuum penetraverit.

25. A purgantis potione convulsio, lethale.

26. A¹ dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum^a frigus, malum.

Tt

27. Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit.

28. Quodcunque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

19. Si à leucophlegmatiâ detento vehemens diarrhœa ^a superveniat, morbum solvit.

30. Quibus spumossæ egestionis in alvi profluviis, ¹ his de capite pituita defluit.

31. Quibus febricitantibus, ¹ in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significat.

32. Quibus autem biliosæ ^a subsidentiae, ab initio verò tenues, acutum morbum significat.

κζ'. Γυνακί ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ τει-
νεσμός ἐπιγλυόμενός, ἐκλῖσται ποίει.

κη'. Ὁ, τι ἂν ὀσέον, ἢ χόνδρος, ἢ
νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ ῥώματι, ἔτε
ἄυξε), ἔτε ξυμφύε).

κθ'. Ἦν ὑπὸ λούκῃ φλέγματι ἐχο-
μὲνός ἀφ' ἁρροία ^α ἐπιγίνη) ἰχυρὴ, λύει
τὴν νῆσον.

λ'. Ὅπόσοισιν ἀφρώδεα τὰ ἀφχω-
ρήματα ἐν τῇσι ἀφ' ἁρροίῃσι, τῆτέοισιν
ἀπὸ τ' κεφαλῆς φλέγμα κατὰρρέει.

λα'. Ὅπόσοισι πυρέσσουσιν ^ι ἐν τοῖσιν
ἔργοισι κριμνώδεις αἱ ὑποστάσιες γί-
γνον), μακρὴν τὴν ἀρρώσιν ζημιά-
νει.

λβ'. Ὅπόσοισι ἡ χολώδεις ^α αἱ ὑπο-
στάσιες, ἀνωθεν ἡ λεωπαί, ὀξείῳ ἀρρώ-
σίῳ ζημιάνει.

λγ'. Ὀκόσοισι ᾗ¹ διεσηκότα τὰ ἔ-
ρα γίνε²), τετέοισι ταραχὴ ἰχυρὴ ἐν
τῷ ὤματί ὄσιν.

λδ'. Ὀκόσοισι ᾗ³ ἐπὶ τοῖσιν ἔργουσιν
ἐφίσκηλα⁴ πομφόλυγες, νεφρίτικὰ
σημαίνουσι, καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώστην
ἔσεαθ⁵.

λέ. Ὀκόσοισι ᾗ⁶ λιπαρὴ ἢ ἐπίσασις
καὶ ἀθρόη, τετέοισι νεφρίτικὰ καὶ ὀξεία
σημαίνει.

λς'. Ὀκόσοισι ᾗ⁷, νεφρίτικοῖσιν ἔσσι,
τὰ προειρημμένα συμβαίνει σημεῖα, πό-
νοι τε πρὸς τὰς μύας τὰς ῥαχιαίας
γίνον⁸), ἢν μὲν πρὸς τὰς ἔξω τόπας
γένων⁹), δ' ὅσημα προσδέχῃ ἐσώμνον
ἔξω· ἢν ᾗ¹⁰ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς
εἴσω τόπας γίνων¹¹), καὶ τὸ δ' ὅσημα
προσδέχῃ ἐσώμνον μᾶλλον εἴσω.

λς'. Ὀκόσοι αἷμα¹² ἐμέουσιν, ἢν μὲν

S E C T I O VII. 253

33. Quibus autem urinæ ¹ divulsæ fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

34. Quibus verò, in urinis bullæ superstant, ^a renum affectiones significant, & longam fore invaletudinem.

35. Quibus autem pingue est et confertum quod supernatat, his *affectiones* nephriticas, et acutas significat.

36. Quibus verò, nephriticis existentibus, prædicta signa accidunt, et dolores circa musculos spinales fiunt, si quidem ad loca exteriora fiunt, abscessum exspecta futurum extrorsum. Si verò dolores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum magis introrsum fore exspecta.

37. Qui sanguinem ^a vomunt, si

quidem sine febre, salutare : si verò cum ^b febre, malum. Curandum autem refrigerantibus, et astringentibus.

38. Destillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

39. Si *quis* sanguinem et grumos mingat, et stranguriam habeat, et dolor incidat ad perinæum, et inum ventrem, et pectinem, *partes* circa vesicam laborare significat.

40. Si lingua ex improvise impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, ¹ melancholicum hoc ipsum fit.

41. Si senioribus nimium purgatis, singultus superveniat, non bonum.

42. Si febris, *quæ non est à bile*, detineat, ^a aquâ multâ, et calidâ in caput affusâ, febris solutio fit.

ἀνευ πυρετῶ , (ωλήριον· εἰ ὃ ξὺν ὁ
πυρετῶ , κακόν. Θεραπεύειν ὃ τοῖσι
ψυχικοῖσι, καὶ τοῖσι σωματικοῖσι.

λή. Καλιάρροι ἐς τὴν ἄνω κοιλίην
(ἐκ πυλῶν) ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

λθ'. Ἦν ἐρέη αἷμα ἐ θρόμβους, καὶ
σφαγξρίην ἔχη, καὶ ὀδύνη ἐμπώπῃ
ἐς τὸ πείναμον καὶ τὸ ὑπογάστριον, ἐ
τ' κτένα, τὰ πρὸς τὴν κύστιν νοσέειν
σημαίνει.

μ'. Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς
γένῃ, ἢ ἀπώληκτόν τι εἴ (ἀραιόθ ,
μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίγνε).

μά. Ἦν ὑπερκαθαρσμομένων τῶν πρεσ-
βυτέρων, λυγρὸς ὁπγένῃ, οὐκ ἀγαθόν.

μδ'. Ἦν πυρετός μετὰ ἀπὸ χολῆς ἔχη,
ὕδασι πολλὰ καὶ θερμὰ καὶ κατὰ χρο-
μῶς καὶ τὸ κεφαλῆς, λύσις εἴ πυρετῶ
γίνε).

μγ'. Γυνή ἀμφιδέξιθε ἔ γίγνεται.

μδ'. Ὀκόσοι ἔμπυοι κἀμόνται, ἢ τέμνονται, ἢ μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυῆ ἔ λευκόν, πειγίγνονται. ¹ ἢ ᾗ ὕφαιμον, κὲ βορβοράδες, ἔ δυσῶδες ², ἀπόλλυν).

μέ. Ὀκόσοι τὸ ἥπαρ^α ἀλέπυον κἀμόν-
ται (ἢ τέμνονται) ἢ μὲν τὸ πύον
καθαρὸν ῥυῆ κὲ λευκόν, πειγίγνον).
ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τετέοισιν ὄσιν.
¹ ἢ δὲ οἶον ἀμόρφη ^β ῥυῆ, ἀπόλλυν-
ται.

μς. Εἰς ὀδύνας ὀφθαλμῶν, ἀκρίλον
ποτίσας, καὶ λέσας πολλὰ θερμά,
φλεβοτόμει.

μζ'. Ὑδρωπιῶντα ἢ ^α βήξ ἔχη,
ἀνέλπιτος ὄσι.

μη. Στραγγερίην κὲ δυσερίην θά-

43. Mulier ambidextra non fit.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus et album, evadunt: ¹ si verò subcruentum, et cænosum, ac graveolens, pereunt.

45. Qui *ad* hepar ^a suppuratum uruntur (aut secantur) si quidem purum effluat pus et album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunicâ: ¹ si verò effluat velut ^b amurca, pereunt.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, et multâ calidâ laveris, venam secato.

47. Hydropicum si ^a tussis habeat, desperatus est.

48. Urinæ stillicidium, et urinæ

difficultatem vini potus, et venæ sectio solvit. Secundæ verò internæ (venæ).

49. Ab anginâ detento tumor et rubor in pectore superveniens, bonum : foràs enim vertitur morbus.

50. Quibus cerebrum ¹ sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt : si verò hos effugerint, sani fiunt.

51. ¹ Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, *quod est* in capite, vacuo. Aër enim qui intus est supra modum (i. e. *vi*) foràs effunditur. ² Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

52. Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens, dolorem solvit.

SECTIO VII. 259

ρηξίς ἐ φλεβοτομίῃ λύει. τέμνειν ἢ τὰς εἴσω (φλέδας).

μβ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχορδαῖα οἶδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ εἴθει ἐπιγυρόμενον, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσσημα.

ν'. Ὅκόσοισιν ἂν ἰ (φακελιωτῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυται· ἢν ἢ ταύτας ἀφύγωσιν, ὑγιέες γίγνον).

νά. ἰ Παρὰ μὲν γίνε) ἐκ τῆ κεφαλῆς, ἀθερμασμορδύς ἔ' ἐγκεφάλου, ἢ διυγρασμορδύς ἔ' ἐν τῇ κεφαλῇ κενῷ. ὑπερχεῖ) γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐνὲν ἔξω. ἰ φοφεί) ἢ, ὅτι ἀπὸ σενῶ ἢ διέξοδος αὐτῶν ὅσιν.

νβ'. Ὅκόσοισιν ἡπαρ παρωδυνῶ), τεττέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὴν ὀδύνην.

νγ'. Ὅκóσoισι ζυμφέρει αἷμα ἀφα-
ρεῖσθαι ἀπὸ τοῦ φλεβῶν, τσίεας χρὴ ἦρθαι
φλεβοτομεῖσθαι.

νδ'. Ὅκóσoισι μελαζὺν τοῦ φρενῶν καὶ
τοῦ γαστροῦ φλέγμα ἀποκλείειν, καὶ
ὀδύνῃ παρέχει, ὅτε ἔχον διέξοδον
εἰς ἐσπετέρῃ τοῦ κοιλιῶν, τστέοισι καὶ
τὰς φλέβας εἰς τὴν κύστιν τραπένειν τοῦ
φλέγματι, λύσις γίγνεται τοῦ νόσου.

νε'. Ὅκóσoισιν ἂν τὸ ἥπαρ ὑδατίζῃ
πλησθὲν εἰς τὸ ἐπίπλοον ῥαγῇ, τσ-
τέοισιν ἢ κοιλίῃ ὑδατίζῃ ἐμπωλᾷ, καὶ
ἐκτεθνήσκουσιν.

νς'. Ἀλύκῃ, χάσμῃ, φρίκῃ,
καὶ οἷν τοῦ ἵσθου πινόμεναι λύει.

νζ'. Ὅκóσoισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φύμα
γίνειν, τστέοισι διαπυήσαντι καὶ
ἐκτραγέντι, λύεται ὁ πόνος.

S E C T I O VII. 261

53. Quibus sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet.

54. Quibus inter septum transversum, et ventrem pituita excluditur, et dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituitâ versâ, morbi solutio fit.

55. Quibus hepar aquâ repletum ad omentum eruperit, his venter aquâ impletur, et moriuntur.

56. Anxietatem, oscitationem, horrorem ¹ vinum par pari *aquâ* potum solvit.

57. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum ² fit, his suppurato *eo* et perrupto, solvitur dolor.

58. Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliquâ causâ, necesse est eos statim mutos fieri.

(Si à febre detento collum invertatur, et deglutire non possit, tumore non existente in collo, lethale).

59. Corporibus humiditas carnes habentibus, famem inducere oportet: ¹ fames enim siccat corpora.

60. Ubi in toto corpore mutationes, et corpus perfrigeratur, et rursus calefit, aut calor alius ex alio permutatur, longitudinem morbi significat.

61. ¹ Sudor multus, calidus, aut frigidus, semper fluens, ² humidi redundantiam adesse significat. ³ Educere igitur oportet, robusto quidem, supernè: debili verò, infernè.

SECTIO VII. 263

νή. Ὅκοσοισι δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος
σεισθῇ ὑπό τινος προφάσιος, ἀνάγκη
ἀφάνους γλυέας ὡδρακρήματα.

(Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομδρῶ ὁ τρά-
χηλος ὅπιστραφῇ, καὶ καταπίνειν μὴ
δύνη), οἰδήματι μὴ ἐόντι ἐν τῇ
τραχήλῳ, θανάσιμον).

νθ'. Τοῖσι ζώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς
ζάρκας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποιέειν.
1 λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ ζώματα.

ξ'. Ὅκω ἂν ἐν ὅλῳ τῷ ζώματι
μεταβολαί, καὶ τὸ ζῶμα καταψύχῃ
καὶ πάλιν θερμαίνῃται, ἢ χρῶμα ἕτερον
ὥς ἑτέρας μεταβάλλῃ, μήποτε νέσθω
ζημαίνει.

ξα'. 1 Ἰδρὼς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυ-
χρὸς, ῥέων αἰεὶ, ζημαίνει 2 ἔχειν
πλησμονὴν ὑγρῷ. 3 ἀπάγειν ἔν χρῇ,
τῷ μὲν ἰσχυρῷ, ἄνωθεν· τῷ δὲ ἀσθενεῖ,
κάτωθεν.

ξδ'. Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ ἀλαλείπων-
τες, ἢν ἰχυρότεροι ἀλὰ τρίτης γέ-
νον), ἑπικίνδυνοι. ὅτῃ δ' ἂν τρόπῳ
ἀλαλείπωσι, ζημαίνει, ὅτι ἀκίνδυνοι.

ξη'. Οὐκότοισι πυρετοὶ μακροὶ, τσ-
τέοισιν, ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι
ἐγγίγνον).

ξδ'. Οὐκότοισι φύματα μακρὰ, ἢ
ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γί-
γνον), ἔτοι σιτίοισι πλείοσι χρέον).

ξε'. Ἦν τις τὰ πυρετῶν τροφὴν
διδῷ, τὰ μὲν ὑγιαίνουν, ἰχὺς· τὰ δ' ἔ-
κάνον, νεκρῶν.

ξς'. Τὰ ἀλὰ τῆς κύσις ἀσχω-
ρέοντα ὁρᾶν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνου-
σιν ὑποχωρεῖ· τὰ ἥκιστα ἐν ὁμοίᾳ
τστέοισι, ταῦτα νοσηδέτερα. τὰ δ' ὁ-
μοία τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἥκιστα νοσερά.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα,

S E C T I O VII. 265

62. Febres non intermittentes , si per tertiam diem vehementiores fiant, periculosæ. Quocunque autem modo intermittant, significat periculi esse expertes.

63. Quibus febres longæ sunt , his aut tubercula , aut ad articulos dolores fiunt.

64. Quibus tubercula diutina , aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibis utuntur copiosioribus.

65. Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem robur; ægro-
tanti verò morbus *fit*.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an *sint* qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè his similia, eo morbosiora; sanis verò similia, minimè morbosa.

67. Et quibus ^t egestionibus , si

Y y

stare permiseris , et non moveris , ² subsident veluti ramenta ; et si pauca fuerint , parvus fit morbus : si verò multa , magnus ; his confert alvum internè purgari. ³ Si autem non purgatâ alvo sorbitiones dederis , quantò plures dederis , eò magis lædes.

68. Quæ cruda deorsum secedunt , ab atrâ sunt bile : si plura , major ; si pauciora , minor est morbus.

69. Exscreationes in febribus non intermittentibus lividæ , et cruentæ , et biliosæ , et graveolentes , omnes malæ sunt. At ritè secedentes , bonæ. Sic etiam per alvum , et vesicam , et ubicunque quid secedens restiterit non purgatum , malum.

70. Corpora oportet , ubi quis purgare vult , faciliè fluentia reddere. ¹

ἢν ἐάσης σῆναι καὶ μὴ κινήσης, ² ὑφί-
σταται οἷον ξύσματα· καὶ, ἢν ὀλίγα ἦ,
ὀλίγη ἢ νῆσθ' γίγνεται· ἢν δὲ πολλὰ,
πολλή τεττέοισι ξυμφέρεται ὑποκαθῆραι
τὴν κοιλίαν. ³ ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιή-
σας δίδῃς τὰ ροφήματα, ὁπόσῃ ἂν
πλείω δίδῃς, μᾶλλον βλάψεις.

ξύ. Ὅσῃσ' ἂν κάτω ὥρῃ Διψω-
ρήν, ἀπὸ χολῆς μελάνης ὅσιν· ἢν πλείω,
πλείων· ἢν ἐλάσῃ, ἐλάσων ἢ νῆσθ'.

ξύ. Αἱ ἀπὸ χρέμψις, αἱ ἐν τοῖσι
πυρετοῖσι τοῖσι μὴ Διψαίωσιν, καὶ
πελιδναί, ἐν αἵματώδεις, καὶ χολώ-
δεις, ἐν δυσώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀπὸ
χωρέσας δὲ καλῶς, ἀγαθαί· καὶ καὶ
κοιλίαν, καὶ κύστιν, καὶ ὅκ' ἂν τι ἀπὸ
χωρέον σῇ μὴ κεκαθαρμύον, κακόν.

ό. Τὰ σώματα χρὴ, ὅκ' τις
βέλε' ^a καθαίρεσθαι, εὖροα ποίεειν.

κῆν μὲν ἄνω βέλη) εὐροα ποίειν ,
 εἴσαι τὴν κοιλίην · ἣν δὲ κάτω , ὑγρῆ-
 ναί.

οά. Ὑπνῶ , ἀγρυπνίῃ , ἀμφοτέρω
 μᾶλλον ἔμετρίῃ γιγνόμενα , νῆστῶ.

οβ. Ἐν τοῖσι μὲν Δαλείπῳσι πυ-
 ρελοῖσιν , ἣν τὰ μὲν ἔξω ^β ψυχρὰ ἦ ,
 τὰ ^γ ἔσω καίῃ) , καὶ δίψαν ἔχη ,
 θανάσιμον.

ογ. Ἐν μὲν Δαλείπῳσι πυρετῶ
 ἣν χεῖλῶ , ἢ ῥίτι , ^ι ἢ ὀφθαλμοῖς , ἢ
 ὀφρὺς διασραφῇ , ἣν μὲν βλέπῃ , ἣν
 μὲν ἀκὲν ἤδη ἀσθενὲς εἶναι , ὅ , τι ἂν
 τείλειαν γένῃ) , θανάσιμον.

οδ. Ἐπὶ λευκῶ φλέγματι ὕδρωψ
 ὀπιγίγνε).

οε. Ἐπὶ διαρροίῃ ^α δυσεντερίῃ.

ος. Ἐπὶ δυσεντερίῃ ^β λειεντερίῃ
 (ὀπιγίγνε).

S E C T I O VII. 269

Et si quidem velit efficere facilè fluentia sursùm, alvum sistere : si verò deorsùm, humectare.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem b sint frigida, interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

73. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, ¹ aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat, jam debilis existens; quidquid horum fit, lethale.

74. Leucophlegmatiae hydrops supervenit.

75. Ab alvi profluvio dysenteria.

76. A dysenteriâ ^a intestinorum lævitas (supervenit).

77. A sphacelo abscessus ossis.

78. A sanguinis vomitu tabes , et puris ^a purgatio sursùm.

(A tabe , fluxus ex capite. A fluxu , alvi profluvium. Ab alvi profluvio , inhibitio purgationis sursum. Ab inhibitione , mors).

(A sanguinis sputo , puris sputum , et fluxio. Postquam autem sputum inhibetur , moriuntur).

79. Qualia etiam in his quæ per vesicam , et in his quæ per alvum *fiunt* egestionibus , ^a et in his quæ per carnes , et sicubi aliâ naturæ *viâ* corpus diffluet : si parum , parvus morbus fit ; si multum , magnus ; si admodùm multum , hoc ipsum lethale.



οζ' Ἐπὶ Ὠφελισμῷ δ' ὅσας οὐδέ.

οή'. Ἐπὶ αἵματι ἐμέτω φθόη, καὶ
 εἰς πύα καθαρίσι ἄνω.

(Ἐπὶ φθόη ρεύμα ἐκ τῆς κεφαλῆς.
 ἐπὶ τῷ ρεύματι διάρροια. ἐπὶ διάρ-
 ροίῃ χέσις τῆς ἄνω καθάρσις. ἐπὶ τῇ
 χέσει θανάσις).

(Ἐπὶ αἵματι πύσει τὴν πύ-
 σιν, καὶ ῥύσιν. ἐπὶ τῇ σίᾳλον ἴχνη),
 λυθνήσκουσιν).

οθ'. Ὀκοῖα ἐν τοῖσι καὶ τὴν κύσιν,
 καὶ ἐν τοῖσι καὶ τὴν κοιλίαν ὑπερ-
 ρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι καὶ τὰς ζάρκας,
 καὶ ἢν περ ἄλλη τῆς φύσεως ἐκδομένη τὸ
 ζῶμα ἢν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῦν γί-
 γνεῖ. ἢν δὲ πολὺ, πολλή. ἢν πάνυ
 πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῖστον.



NOTÆ

IN

SECTIONEM SEPTIMAM.

APHOR. I. Aph. vij, 26. — Prænot. xv, 9. — Coac. j, 165. — VI Epid. viij, 93. =¹ Aph. iv, 48. =^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 25; ij, 6, p. 55, l. 21.

APHOR. II. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 861.

APHOR. III. Coac. iv, 20. =^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 27.

Prius signum ventriculo hærentis irritationis est; posterius sanguinis ad cerebrum nitentis. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 298.

APHOR. IV. I. Prædict. vij, 14, 15. =^a Cels. ij, 4, pag. 51, l. 26.

IN SECTIONEM VII. 273

Sudor naturæ motus, horror morbi
grassantis symptoma vinci naturam à
morbo edocent.

APHOR. V. Aph. v, 21. — *Vide*
van-Swieten, t. ij, p. 554; t. iij, p. 526.
Vide Observationem cl. Mead. cap. de
insaniâ, monit. et præcept. medica.

APHOR. VI. ¹ Aph. vij, 23. =
^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 29. = ^b Cels. ij,
4, p. 53, l. 3. — *Vide* van-Swieten,
t. ij, p. 345.

APHOR. VII. Aph. v, 5.

De vini potu rem intellige.

APHOR. VIII. Coac. ij, 236. —
I. Morb. xij, 7. — *Vide* van-Swieten,
t. j, p. 671.

APHOR. IX. Aph. v, 3. — Coac.
iij, 57. = ^a Cels. ij, 8, p. 76, l. 12.

APHOR. X. Coac. iij, 303. = ^a Cels.
ij, 8, p. 74, l. 20.

Z z

Rapi in inflammationis communionem ventriculi tunicas singultus et vomitus docent; cerebrum nervosque iisdem malis affici delirio et convulsione patet. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 243, 549.

APHOR. XI. Coac. iij, 172. — Affect. ix, 12. =^a Cels. ij, 7, p. 64, l. 13.

Summum inflammationis gradum, motum sanguinis per vasa pulmonum præpeditum, quomodò peripneumonia pleuritidi superveniens indicet, *vide* apud van-Swieten, t. iij, p. 62.

APHOR. XII. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 548.

APHOR. XIII. Aph. ij, 26. =^a Cels. ij, 7, p. 64, l. 14.

Hujus Aphorismi veritatem observatione consecrarunt Bontius, Hans Sloane, Hillari, alique ferventium regionum medici. In aëre inflammabili fac-

titio illicò tetano animalia corripuntur.

APHOR. XIV. Coac. ij, 8; iij, 371.

— VII. Epid. xxx, 8; cap. Vuln. xv, 1. = ^a Cels. ij, 7, pag. 64, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 394.

APHOR. XV. Aph. vij, 16, 78.

— Nat. Human. xxij, 1. — II. Prædict. xiv, 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 7, 70.

APHOR. XVI. Aph. vij, 15, 78. =

¹ Glandul. x, 2, 3, 4. = ² Coac. iij, 257. — I. Morb. x, 17, 20; xj, 40. — Vict. Acut. vij, 6, 7, 8. = ^a Cels. ij, 8, p. 72, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 70.

Sive *ῥύσις* sit alvi profluvium, sive sit colliquescens corporis marasmus, ut alii volunt.

APHOR. XVII. Aph. v, 48. = ^a

Cels. ij, 7, p. 62, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 84.

APHOR. XVIII. ^a Cels. ij, 7, p. 64,

1, 17. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 531.

APHOR. XIX. Cap. Vuln. xxvij, 4.
— *Vide* van-Swieten, t. j, p. 359.

APHOR. XXI. ^a Cels. ij, 7, p. 64,
l. 18.

APHOR. XXII. Aph. vij, 26.

APHOR. XXIII. Aph. vij, 6. =
^a Cels. ij, 7, p. 64, l. 10.

Meraca ἀκριτος quæ alibi ειλικρινής
sincera, id est, cruda, indigesta de-
jectio, si in dysenteriam desinat, in-
gentem in visceribus irritationem ena-
tam et cruditati junctam designat. —
Vide van-Swieten, t. ij, p. 345.

APHOR. XXIV. *Vide* van-Swieten,
t. j, p. 394.

APHOR. XXV. Aph. v, 1.

APHOR. XXVI. ¹ Aph. iv, 48, vij,

IN SECTIONEM VII. 277

22. =^a Cels. ij, 8, pag. 68, l. 14.

Sive adsit febris lypiria, sive imminet gangræna, sive demùm præ doloris vehementiâ nervi constringantur. —
Vide van-Swieten, t. iij, p. 186.

APHOR. XXVII. I. Morb. Mul. xlij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 220; t. iv, p. 444.

APHOR. XXVIII. Aph. vj, 19. —
Vide van-Swieten, t. j, p. 513.

APHOR. XXIX. Flat. xvij, 8, 9. — Judicat. xj, 21. — Coac. iij, 285, 326. — I. Morb. vj, 7. — II. Morb. Ixix, 11, 12. — Int. Affect. xxij, 12. —
=^a Cels. ij, 8, p. 68, l. 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 286, 374; t. iv, p. 230.

Modò virium constantia, ægri euphoria morbi imminutionem indicent.

APHOR. XXX. Morb. Sac. vij, 28.

A a a

=¹ Coac. v, 13, 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 338.

Scilicet adest vasis excernenda transmittentibus laxitas et atonia, hinc crudorum effluxus.

APHOR. XXXI. ¹ Prænot. xj, 7. — Coac. ij, 199; x, 12, 64, 65. — *Vide* Savonarolam de Urin. pag. 700. Prosper. Alpin. de præsagiendâ vitâ et morte, lib. vij, cap. 13.

APHOR. XXXII. Coac. v, 6, 8. — 1. Morb. xxvij, 28. — Vict. Acut. liv, 5. =² Cel. ij, 5, p. 53, l. 26.

Acrem scilicet designant et valde biliosam materiam intus grassari, quæ inflammet vasa. *Vide* Savonarolam de Urin. p. 677, 679; undè ardentes urinæ vocantur, *ibidem*, p. 680.

APHOR. XXXIII. ¹ Coac. v, 15, 16, 76. — IV. Epid. vj, 14, 19.

Crudissimæ sunt ex urinis, quæ non

IN SECTIONEM VII. 279

aggregatas, sed divulsas partes ferunt, eæ tamen omnia susdeque ferri significant, imò cruda coctionem affectare.

APHOR. XXXIV. ^a Cels. ij, 5, p. 53, l. 29. — II. 7, p. 60, l. 31.

Abrasâ scilicet mucilagine turgescunt.

APHOR. XXXV. Prænot. xij, 1, 2. — Coac. v, 43. — IV. Epid. vj, 12, 13.

Forsan ob vicinum renibus adipem, qui præ putredine indolem saponis insumit.

APHOR. XXXVI. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 242.

APHOR. XXXVII. Aph. iv, 25. — Caoc. iij, 238 ad 243. = ^a Cels. iv, 4, p. 203, l. 13, 21. = ^b Cels. ij, 6, p. 56, l. 15.

Aliquandò sanguis à vasis debilioribus ad salutem evomitur; sed rarò id

A a a ij

accidere fatendum est, & plerumque infido levamine, cum aut infarctum per abdominalia vasa demonstret sanguinis vomitus, aut debilitatem saltem vasorum. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, p. 123, 127.

APHOR. XXXVIII. Aph. vj, 20. — Loc. in Hom. xvij, 7. — I. Morb. xj, 2, 3.

APHOR. XXXIX. Aph. iv, 80.

APHOR. XL. ¹ Aph vj, 23, 57. — II. Prædict. xvj, 12. — Coac. iij, 87, 88, 315, 317.

Sensus Hippocratis est, quasi melancholicus humor aliquandò apoplexiam possit inducere. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 252, 264.

APHOR. LI. Vid. Aph. v, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 194.

Extinctâ scilicet vi vitali, quæ in senio debilis est, fit singultus.

IN SECTIONEM VII. 281

APHOR. XLII. ^a Cels. iij, 14, p. 143, l. 26.

APHOR. XLIV. Aph. vj, 27; vij, 45. — Prænot. vij, 6; xix, 4. — II. Morb. xlv, 34, 35. = ¹ Coac. iij, 217, 218, 269. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647; t. iij, p. 56, 683.

APHOR. XLV. Aph. vij, 44. — Prænot. vij, 6. = ¹ Coac. iij, 218, 274. = ^a Cels. ij, 8, p. 67, l. 3. = 3. = ^b Cels. ij, 8, p. 71, l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647, 674; t. iij, p. 106, 116, 117.

APHOR. XLVI. *Vide* Aph. vi, 31. — *Vide* notas Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVII. Aph. vj, 35. — I. Prædict. xj, 1, 6. — II. Epid. v, 28. = ^a Cels. ij, 8; p. 72, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 36. — II. Epid. vj, 39.

Non ita intelligendus est Hippocrates, quasi eidem casui conveniat vini potio et venæ sectio. Sed cùm idem symptoma causis oppositis competat, opposita pariter adhibenda Medicina.

APHOR. XLIX. *Vide* Aph. 37. — Prænot. vij, 3; xxij, 14. — Coac. ij, 221; iij, 97, 102. — II. Morb. xxvj, 26; xxvij, 14. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 858.

APHOR. L. Coac. ij. — II. Morb. v, 2, 21; xx, 2, 8, 9, 10. = ¹ VII. Epid. xxx, 7. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 398.

Quid de cerebri sphacelismo sentiendum sit nemo plenius et melius exposuit Cl. de Villebrune in Aphor. xij, sect. iij.

APHOR. LI. ¹ Prænot. xij, II. = ² Princip. et Car. xix, 1 ad 4.

Fit sternutatio, vel convulsivè, vel à sensu ingrato in membranâ pituitariâ.

IN SECTIONEM VII. 283

APHOR. LII. Aph. vj, 40. — Coac. iij, 272.

APHOR. LIII. Aph. vj, 47.

APHOR. LIV.

Propositio Anatomiae repugnans de qualibet pituitae mucilaginosâ stagnatione intelligatur, seu vasis contenta sit, seu, ruptis vasis, sibi ipsi cavum molita fuerit.

APHOR. LV. Prænot viij, 6. — Coac. iij, 276, 278. — Affection. xxiiij, 3 ad 10. — Int. Affect. xxvj, 2.

An de hepate in hydatides converso loqui voluit Hippocrates?

APHOR. LVI. II. Epid. vj, 45. =
¹ II. Morb. xxxviiij, 6. — Int. Affect. v, 14. — II. Morb. Mul. lxxxviiij, 2.

APHOR. LVII. *Vide* Aph. iv, 12. =
^a Cels. ij, 8, pag. 70, l. 22. —
Vide van-Swieten, t. v, p. 428.

APHOR. LVIII. Coac. iij, 370. —
I. Morb. iij, 34. — Aph. iv, 35. —
Vide van-Swieten, t. j, p. 408.

APHOR. LIX. Aph. ij, 21; iv, 13,
41; vij, 50. =¹ II. Diæt. xxxviii, 1,
2. — III. Diæt. xvj, 12, 14. — II.
Prædict. viij, 8, 13. — Insomn. xv,
14, 15. — Affect. xxviii, 2; xli, 7, 8,
11, 12. — *Vide* van-Swieten, t. iv,
p. 238.

APHOR. LX. Aph. iv, 40. — I.
Prædict. ij, 4; iv, 2; vij, 12; x, 2.
— Coac. v, 6, 78; vj, 85. — Vict.
Acut. xlvj, 4, 5.

APHOR. LXI. ¹ Aph. iv, 41, 42. =
² Aph. iv, 56. = ³ Aph. j, 21.

APHOR. LXII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIV. *Vide* Aph. iv, 45.

APHOR. LXV. Aph. ij, 10; vij, 67.
— Vet. Medic. xij, 11.

IN SECTIONEM VII. 285

APHOR. LXVI. VI. Epid. viij, 29,
40.

APHOR. LXVII. ¹ Judicat. viij, 10,
11. = ² Prænot. x, 8. — Coac. vj,
85. — Epid. vj, 10. = ³ Aph. ij, 10.
viij, 65. — *Vide* van-Swieten, tom. ij,
p. 348.

APHOR. LXVIII. Aph. j, 22. —
Judicat. viij, 12.

Delendum hunc Aphorismum vult
Prosp. Martianus, aut legendum ut in
lib. de Judicat. *Si atra bilis deorsum
exeat, pauca, &c.*

APHOR. LXX. *Vide* Aph. ij, 9; iv,
13. = ¹ II. Diæt. xxxvj, 18 ad 23.
= ² Cels. iij, 3, 18, p. 154, l. 33.

APHOR. LXXI. *Vide* Aph. ij, 3.

APHOR. LXXII. *Vide* Aph. iv, 48.
= ² Cels. ij, 6, p. 55, l. 21.

APHOR. LXXIII. *Vide* Aph. iv, 49.

B b b

— I. Prædict. x, 7. =¹ Coac. ij, 117, 128.

APHOR. LXXIV. I. Morb. iij, 28.
— Affection. xx, 13, xxxiiij, 3. —
Int. Affect. xxiv, 1. — *Vide* van-Swieten, t. j, 93.

APHOR. LXXV. ^a Cels. ij, 7, pag. 64, l. 10. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 349.

APHOR. LXXVI. Aph. vij, 43. —
Coac. ij, 296. — I. Morb. iij, 26. =
^a Cels. iv, 4, p. 203, l. 5.

APHOR. LXXVIII. Aph. vij, 15, 16. — II. Prædict. xiv, 1, 3. — I. Morb. x, 69; xix, 4 ad xx. =^a Cels. iv, 4, p. 203, l. 5. — Vid. Aph. v, 12, 14. — II. Prædict. xij, 3. — Coac. iij, 259. — *Vide* Aph. vij, 15, 16.

Ad intelligendum hujus Aphorismi sensum, obscuræ Benneti Londinensis de tabe observationes accuratè legendæ sunt. Theatr. Tabid.

IN SECTIONEM VII. 287

APHOR. LXXIX. Prænot. ij, 1, &c.
xv, 10, 11. = ¹ Aph. viij, 18. —
Aliment. vj, 1 ad 8. — Insomn. iv, 16.
— Epid. vj, 2. — *Vide* van-Swieten,
t. ij, p. 387.



Multi L. B. sectionem octavam omittunt. Plurimi sex ejus priores adjiciunt Aphorismos. Alii sectionem totam addunt, ut hîc factum vides. Nam quæ spuria tibi videntur, in lectione præteriri facillè possunt.

Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Παρεμβεβλημένοι.

Τ Μ Η Μ Α Ο Γ Δ Ο Ο Ν .

α. **Ο**ΚΟΣΟΙ ¹ ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρενίτικοι γίγνον), & πάνυ τοί ὑγιάζον). ² ἥσων γὰρ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τὸ φύσις, καὶ τὸ ἡλικίης, ἢ νῆσθαι ἤ.

β'. Οκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ προαίρεσιν ^α δακρύουσιν, ἀσθρόν. ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαίρεσις, κακόν.

γ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι

A P H O R I S M I

I N T E R J E C T I.

SECTIO OCTAVA.

1. **Q**UI¹ supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. ² Minus enim periclitantur, quorum naturæ, et ætati, morbus similis fuerit.

2. Quibus, in infirmitatibus, oculi ex proposito (i. e. *ob causam*)² lacrymantur, bonum. Quibus verò sine causâ, malum.

3. Quibus in febribus quartanis exis-

tentibus, sanguis ex naribus fluxerit, malum.

4. Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes et veloces, periculosi: ¹ et qui expelluntur ex fronte, velut guttæ, et aquæ salientes, et frigidi valdè, ac multi. Necesse enim *est* talem sudorem prodire cum violentiâ, et laboris excessu, et expressione diuturnâ.

5. Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum.

6. Quæ medicamenta non sanant, *ea* ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, *ea* ignis sanat. Quæ verò ignis non sanat, *ea* insanabilia existimare oportet.

7. Tabes maximè fiunt ab anno octavo decimo usque ad quintum et tricesimum.

τελαρταίοισιν ἔξουσιν αἷμα ἐκ τῆς ῥινῶν
ρύψῃ, πονηρόν.

δ'. Ἰδρῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν
ἡμέρησι γιγνώσκουσι (Φοδροὶ καὶ τα-
χέες, ὀπικύνδουνοι· ἡ οἱ ὠθέμενοι ἐκ
ἑμετάπας, ὅσπερ σαλαῖμοι καὶ κρενοὶ,
καὶ ψυχροὶ (Φόδρα, καὶ πολλοὶ ἀνάγκη
γὰρ τὸ τοῖσιν ἰδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ
βίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκλεί-
ψις πολυχρονίως.

ε'. Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματι κοιλίης
καταφορῇ, κακόν.

ς'. Ὅσα φάρμακα σὺν ἡΐ), σί-
δηρῳ ἡΐ). ὅσα σίδηρῳ σὺν ἡΐ), πῦρ
ἡΐ). ὅσα ἡ πῦρ σὺν ἡΐ), ταῦτα χρὴ
νομίζειν ἀνίατα.

ζ'. Αἰθίσια μάλιστα γίγνοντι ἀπὸ
ὀκτωκάδεκα ἑτέων, μέχρι τριήκοντα
ἔτι πέντε.

ή. ¹ Τὰ ᾗ μὲν φύσιν γιγνόμενα
 καὶ φθείσιν, πάντα μὲν ἰχυρά, τὰ ᾗ
 καὶ θανατώδεια. ² δέύτερον ᾗ, ἣν μὲν
 ἐν τῇ ὥρῃ νεσείη, αὐτὴ ἢ ὥρῃ ξυμ-
 μαχεῖ τῇ νεσῇ, οἷον καύσῃ θερμῇ,
 ὑδρωπικῇ χειμῶν· ὑαφνικῇ γὰρ τὸ
 φυσικόν· φοδερᾶτερον ᾗ Σπληνί.

θ'. Γλῶσσα μέλαινα καὶ αἱματώδης,
 εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεισι, μὴ
 σφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ νεῖσον Σπι-
 κροτέρην.

ι. Ταῦτα μὲν ἔν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν
 ὀξείσι σημειῶσθαι χρὴ, ὅποτε μέλαι
 ἀπθνήσκειν, ἔ ὅποτε λευθήσεται.

ια. Ὁρχις διεξίος ψυχρὸς ἔ Σπασ-
 μώδης, θανατώδης.

ιβ. Ὀνυχες μέλαινες, ^α καὶ οἱ δάκ-

8. ¹ Quæ secundum naturam ad talem disposita *sunt*, omnia quidem vehementia; quædam verò etiam lethalia. ² Secundum autem, si quidem in *eo* tempore ægroter, *cum* tempus ipsum unà cum morbo impugnat, velut cum febre ardente æstas, cum hydrope hyems. Natura enim longè superior est: lienì verò plus offert timoris.

9. Lingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valdè malum: morbum enim minorem declarat.

10. Hæc igitur in febribus acutis notare oportet, quando *quis* moriturus sit, et quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus et convulsus, lethale.

12. Ungues nigri, et digiti manuum

et pedum frigidi, contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse ostendunt.

13. Labia livida, aut etiam resoluta et inversa, et frigida, lethalia.

14. Aures frigidae, pellucidae, contractae, lethales sunt.

15. Et tenebricosâ vertigine laborans, et lucem aversans, et somno ac ardore multo detentus, desperatus.

16. Et qui in rabiem actus furit intrepidè, et non agnoscit, et neque audit, neque intelligit, *jam moribundus est.*

17. Morituris *signa* hæc magis fiunt manifesta, et ventres attolluntur, atque inflantur.

18. Terminus verò mortis *est*, si animæ calor suprâ umbilicum ad lo-

τυλοὶ καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ ,
 ξυνεσαλμῆροι ἢ καθειμῆροι , ἐγγὺς τῷ
 θανάτῳ δηλοῦσι.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδνὰ , ἢ καὶ δάπ-
 λευρῆμα , ἐξερμαρῆμα , καὶ ψυχρὰ ,
 θανατώδεια.

ιδ'. Τὰ ὦτα ψυχρὰ , διαφανέα ,
 ξυνεσαλμῆρα θανατώδεια εἰσι.

ιε'. Καὶ Κολοδινῶν , ἢ τὴν αὐγὴν
 δάπτρεφόρμυθον , ἐν ὧν καὶ καύματι
 πολλῷ κατεχόρμυθον , ἀνέλπιστον.

ισ'. Καὶ λυσάων ἀτρέμα , ἐξυνοέων ,
 καὶ μηδὲ ἀκύνων , μηδὲ ξυνιέων , θανα-
 τώδεις.

ιζ'. Μέλαςιν δάπθνήσκειν ταῦτα (α-
 φέρεται γίνεσθαι) , ἐν αἷματι κοιλίᾳ ἐπαί-
 ροντι , ἐν φουσῶντι).

ιη'. Ὅρα τὸ θάνατον , ἐὰν τὸ
 τῷ ψυχῆς θερμὸν ἐπανέλθῃ ὑπὲρ τοῦ

ὀμφαλῷ εἰς τὸ ἄνω τῷ φρενῶν τόπον,
¹ ἐς ὑψικαυθῇ το ὑγρὸν ἅπαν. ἐπεὶ δ' ἂν
 ὁ πλεύμων καὶ ἡ καρδία τὴν ἰκμάδα
 ἀποξάλλωσι, τὸ θερμὸν ἀθροῖσθαι ἐν
 τοῖσι θανατώδεσι τόποις, ἀπώγει
 ἀθρόον τὸ πνεῦμα τὸ θερμὸν, ὅθεν περ
 ξυνέστη τὸ ὅλον, ἐς τὸ ὅλον. ² πάλιν
 τὸ μὲν ἀπὸ τῶν σαρκῶν, τοῦ δ' ἀπὸ
 ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν κα-
 λῶμεν, ἀπολείπεται ἡ ψυχὴ τὸ τὸ
 ῥαμῶσθαι ῥαμῶσθαι, καὶ τὸ ψυχρὸν, ἐς
 τὸ θνητὸν εἶδωλον, αἷμα ἐς χολῇ, καὶ
 αἷματι, ἐς φλέγματι, ἐς σαρκί, πα-
 ρέδωκεν.

Τ Ε' Λ Ο Σ.

S E C T I O VIII. 297

cum septo transverso superiorem ascenderit, ¹ et omne humidum fuerit combustum. Postquam pulmo et cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, undè totum in toto constitit. ² Rursus partim quidem per carnes, partim verò per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, et mortale simulacrum, unà cum bile, et sanguine, et pituitâ, et carne, deditione tradit.

F I N I S.

D d d

N O T Æ

I N

SECTIONEM OCTAVAM.

APHORISMUS I. ¹ Aph. ij, 39, 40; vj, 6. = ² Aph. ii, 34; iv, 48.

APHOR. II. Aph. iv, 52. = ^a Cels. ij, 4, p. 51, l. 14.

APHOR. III. Judicat. x, 7. — I. Prædict. j, 2. — Coac. ij, 37, 38; iij, 433. — VI. Epid. ij, 40. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 473.

Notat Prosper Alpinus se narium hæmorrhagiâ à quartanâ liberatum fuisse, quod tamen hujusce dogmatis Hippocratici veritatem non impedit; cùm symptoma illud ab immeabili obstructione pendere soleat. Prosp. Alp. de præsag. vitâ et morte. Lib. vj, cap. xiiij.

IN SECTIONEM VIII. 299

APHOR. IV. ¹ Judicat. vj, 9. —
Prænot. v, 4, 8. — I. Prædict. v, 7.
— Coac. iij, 91; iv, 38, 39. — Vict.
Acut. liij, 8, 9.

APHOR. V. *Vide* van-Swieten, t. ij,
p. 346; t. iij, p. 374.

APHOR. VI. Arte xiiij, 12 ad 18.
— *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 67.

APHOR. VII. Aph. v, 9.

APHOR. VIII. ¹ I. Morb. xx, 1, 2,
3. = ² Aph. ij, 34; iij, 3; viij, 1. —
VI. Epid. viij, 45. — Affect. vij, 3, 4.

APHOR. IX. Coac. ij, 140, 148.

APHOR. X. Prænot. ij, iij, iv.

APHOR. XI. Prænot. viij, 20. —
Coac. iij, 352.

APHOR. XII. Prænot. viij, 15; xv,
9. — Coac. iij, 349. = ^a Cels. ij, 6,
p. 55, l. 4; ij, 7, p. 66, l. 13.

APHOR. XIII. Coac. j, 97.

300 NOTÆ IN APHOR.

APHOR. XIV. Prænot. ij, 9. —
Coac. ij, 67, 108.

APHOR. XV. Prænot. ij, 18, 19. —
¹ Coac. ij, 117.

APHOR. XVI. Coac. iij, 327.

APHOR. XVIII. ¹ Morb. xxx, 12 ad
16. = ² Vid. Aph. vij, 79. — Ali-
ment. vj, 1 ad 8.



LUD. VERHOOFD
P R Æ F A T I O
A D
I N D I C E M.

SISTO tibi, L. B. indicem, qui
(ut verum fatear) in meum factus
est usum. Sed cùm is jam aliis etiam
conceditur, quid quærentem mo-
nere velim verbo dicam.

Ordo ejus est litterarum idem.
Prout quærendum cæperit à lit-
terâ, in eâdem illud videri de-

E e e

bet. Quidquid eundem affectum concernit, in summum collegi caput, ut uno intuitu omnia videantur. Methodo ad Praxin directâ disposui.

Primò *Affectum* pono. Deinde *Anni Tempus*, in quo accidit. Mox *Ætatem* cui est familiaris. Inde ad *Signa* progredior. Hinc *Causas* adscribo, simul cum aliis affectibus, unde originem trahit. Deinceps descendo ad *Prognosin*, bonam, vel malam. Tum *Diætam* præscribo. Postea *Curam* subjungo, sub quâ *Purgationem* quandoque simul præcipio. Tandem *Crisin*, sive *Solutionem*, quomodo ea fiat, annec-

to. Denique quibus superveniens morbis *eosdem solvat*, refero. Ultimò *Species varias* (in quibus tractandis eadem iterum servatur methodus) addo. Et si quæ *supra hæc* occurrant, adjicio.

Verùm de omni affectu hæc singula conjungere volumen breve vetat.

Jam si quid in indice omissum putes, in alio id quære capite, et fortasse non frustra feceris. Si tamen idem pluribus notetur in locis, quæso, ne id offendat. Tuâ enim gratiâ id repetitum est: atque decies redundare, quàm semel deficere, malo sciens. Ordinis

304 P R Æ F A T I O.

rationem, quia brevis esse cogor,
non reddo. Fruere, fave, vale.

Καίρὸν γνῶθι.

Ὅξ' ὅς γάρ.

Aph. I. 1.

I N D E X.

A.

ABDOMEN.

Crassi et tenuis

Prog. ij, 35.

ABORTUS.

Tempus iij, 11.

Futuri signa à

mammis, v, 37,

38, 53.

Causa V. S. v, 31.

Diarrhœa, v, 34.

Tenesmus, vij,

27.

Uteri mucus, v,

45.

Macies p. n. v,

44.

Extenuatio in fe-

bre, v, 55.

ABSCCESSUS.

Futuri sign. in

feb. iv, 31.

In morb. diuturna
no, iv, 32.

Solutio, iv, 74.

Longi sig. iv, 51.

In articulis unde

post. feb. iv, 31.

Prævertitur, iv,

74.

In nephriticis sig.

VII, 36.

Abscess. ossis. in

ulcere diuturno,

vj, 45.

A sphacelo, vij,

77.

ÆTAS.

Temperamentum.

j, 14, 15.

Progn. ij, 34, 45;

ij, 24; viij,

I.

Diæta, j; 13, 14,
15, 16.

Cautio in diæta,
1, 17; iiij, 3.

In aliis, j, 2.

Nuper natus.

Morbi. iiij, 24.

Dentiens.

Morbi. iiij, 25.

Morbor. crisis,
iiij, 28.

Puer.

Ver et æstas con-
veniunt, iiij, 18,

Fames, 1, 13,
14.

Morbi. iiij, 27.

Non laborat po-
dagrá. VI, 30.

Morbor. progn.
ij, 39; iiij, 28.

Diæta. j, 16.

Puber.

Ver et æstas con-
ducunt. iiij, 18.

Morbi. iiij, 27.

Morbor. progn.
iiij, 28.

Adolescens.

Fames. j, 13.

Alvi. progn. ij,
20, 53.

Morbi. iiij, 29.

Morbor. progn.
ij, 45; v, 7.

Vir.

Autumno et hye-
me valet, iiij,
18.

Fames, j, 13.

Morbi, iiij, 30;
vj, 57.

Senex.

Temperamentum,
j, 14.

Æstate valet,
iiij, 18.

Fames, j, 13, 14.

Alvus, ij, 20, 53.

Morbi, j, 14; iiij,
31.

Progn. ij, 39,
40, 49; iiij,

12; vj, 6;

viiij, 1.

ALPHI. *Tempus*,

iiij, 20.
ALVI EXCRE-
M E N T A,
egestiones.

Χωρέων, j, 23.

Ἀποχωρέων, vij,
69.

Διαχώρημα, iv,
28; vij, 30.

Διαχώρησις, ij,
iv, 47, v, 64.

Ὑποχωρέων, iv,
25, 26.

Ὑποχωρημα, j,
12; iv, 21;
vij, 76, 79.

Ὑποχωρησις, iv,
83; v, 64;
vij, 6, 23.

Ἐκκρίσις, ij, 15.

Ὑπελθόν, iv,
22.

Ὑπελσθόν, iv,
23.

Progn. j, 12;
vij, 79.

In feb. continuâ,
iv, 47; vij, 69.

Diat. in sanis,
ij, 15.

In biliosis, ij, 15;
v, 64.

Biliosorum solu-
tio, iv, 28.

Ab atrâ bile le-
thalia, iv, 22,
23, 24.

Nigror. progn. iv,
21.

A purgante, iv,
21.

Sanguis, niger bo-
nus, iv, 25.

Lethalis, iv, 23.

Spumosa unde, vij,
30.

Sincera. Progn.
vij, 23.

In morbo diu-
turn. vij, 6.

Celeria unde, ij,
18.

Pauca ubi, iv, 83.

Carunculæ, malæ,
iv, 26.

Ramentorum pro-

- gnosis.* vij, 67.
ALVI FLUXUS.
Διαρροία, iij,
 21, 25, 30;
 v, 12, 14; vj,
 15, 16, 17,
 32; vij, 29,
 30, 75, 78.
Ῥύσις, ij, 14;
 iij, 16.
Ῥύειν, v, 34.
Ταραχή, j, 2;
 iv, 60.
Καταρροία, viij,
 5.
Ὑπόσις, iij, 31.
Tempus, iij, 16,
 21.
Ætas, iij, 25, 31.
A fluxione capi-
tis, vij, 78.
Progn. ij, 14;
 vij, 75.
Malus, v, 34;
 vj, 16; viij, 5.
Lethalis, v, 12,
 14.
Solutio, vj, 15.
- Morbum solvit*,
 iv, 60; vj, 17;
 vij, 19.
Spontanei prog. i,
 2.
Spumosus à capi-
te, vij, 30.
Longo obnoxii, ij,
 30; vj, 32.
Ætas, iij, 30.
ALVI MUTATIO
naturalis, ij,
 20, 53.
ALVUS HUMI-
DA, SICCA.
Tempus, iij, 1,
 17.
Progn. ij, 20, 53.
Humidæ ætas, iij,
 31.
Ubi fiat, iv, 27,
 73.
ANGINA.
Tempus, iij, 16,
 20, 22.
Progn. bona, vj,
 37; vij, 49.
Mala, v, 10.

- | | |
|---|--|
| <p>ANIMUS. Videatur Mens.</p> <p>ANXIETAS.
<i>Vino solvitur</i> ,
vij , 56.</p> <p>APHTHÆ. <i>Ætas</i>.
iij , 24.</p> <p>APPETITUS. Vid.
Fames.</p> <p>APOPLEXIA.
<i>Tempus</i> , iij , 16,
23.
<i>Ætas</i> , iij , 31 ;
vj , 57.
<i>In melancholicis</i>
<i>unde</i> , vj , 56.
<i>Progn.</i> vj , 51.
<i>Curæ</i> , ij , 42.
Particularis , vij ,
40.</p> <p>AQUA.
<i>Levis sign.</i> v , 26.
<i>Calidæ effectus</i> ,
vij , 43 , 31.
<i>Frigidæ effectus</i> ,
v , 21.</p> <p>AROMATA. <i>Suf-</i>
<i>fitus vis et no-</i></p> | <p><i>xæ</i> , v , 28.</p> <p>ARS MEDICA
<i>longa</i> , i , 1.
<i>Requisita</i> , j . 1.</p> <p>ARTICULO-
RUM Dolor.
Tubercula.
Vid. Dolor.
Tubercula.</p> <p>ARTUS , &c.
<i>Progn. mortis</i> ,
viij , 10 , ad
18.</p> <p>ASTHMA.
<i>Tempus</i> , iij , 22.
<i>Ætas</i> , iij , 26 ,
30.
<i>Progn.</i> vj , 48.</p> <p>AUDITUS.
<i>Progn. in feb.</i> iv ,
49 ; vij , 73.
<i>Hebetis tempus</i> ,
iij , 5 , 17.
<i>Ætas</i> , iij , 31.
<i>Acuti tempus</i> , iij
17.</p> <p>AURES.
<i>Progn.</i> viij , 14.</p> <p style="text-align: center;">F f f</p> |
|---|--|

Humidarum *ætas*,
 iiij, 24, 31.

Doloris *tempus*,
 iiij, 21.

AUSTER. vid.
 Ventus.

AUTUMNUS. vid.
 Tempestas.

B.

BALBUS.
Progn. vj, 32.

BALNEUM.
Dolores oculorum solvit, vj,
 31; vij, 46.

BILIS.
Atræ sign. vij, 68.

Lethalis ubi, iv,
 22, 23, 24.

BOREAS. vid.
 Ventus.

BUBO. *Progn.* iv,
 54.

C.

CACHEXIA.

Ætas, iiij, 31.

Diæta, ij, 10;
 vij, 67.

Purgationis progn. ij, 36.

CALCULUS. vid.
 Vesica.

CALIDUM IN-
 NATUM.

Majoris tempus,
 j, 15.

Ætas, j, 14.

CALOR.

Utilis ubi, v,
 18, 22.

Magni progn. vij,
 13.

Frequentioris morbi, v, 16.

Mutati, progn. iv,
 40; vij, 60.

Particularis, quid notet, iv, 39.

Ventris, quando

I N D E X. 311

- major*, j, 15.
Progn. iv, 48;
 vij, 69.
CALVUS. *vid.* Ca-
 pilli.
CANCER. *Occulti*
progn. vj, 38.
CAPILLI, PILUS.
Quid indicent,
 v, 69.
E renibus, iv, 76.
Defluxus in tabe
lethalis, v,
 11, 12.
Calvi progn. vj,
 34.
Eunuchus non fit,
 vj, 28.
CAPUT.
Doloris tempus,
 iij, 13, 23.
Sign. iv, 70.
Progn. vj, 51.
Diæta, v, 64.
Cura, V. S. v,
 61.
Solutio, vj, 10,
Gravitatis tem-
- pus*, iij, 5, 17.
Causa, v, 28.
Cura, calor, v,
 22.
Vulneris progn.
 vij, 14.
Ulcus, calor juvat,
 v, 22.
CARTILAGO.
Dissecta non
coalescit, vj,
 19, 28.
CATARRHUS.
Ætas, iij, 12,
 21.
Sign. in diarrhæâ,
 vij, 30.
Causa, frigus, v,
 24.
A tabe, vij, 78.
Lethalis ubi, iij,
 12.
In pectus ruentis,
progn. viij, 38.
CAUTIO GE-
NERALIS. j,
 2, 3, 17.
CEREBRUM.

- Frigus nocet*, v,
 18.
*Concussi sympto-
 mata*, vij, 58.
*Vulneris sympto-
 mata*, vj, 50.
Progn. vij, 14.
Lethale est, vij,
 18.
Sphaceli progn.
 vij, 50.
CHOLERA.
Ætas, iij, 30.
CIBUS. *Nutritio.*
Cautio, j, 17; ij,
 7, 51.
Progn. ij, 31, 32.
*Concoction. pro-
 gn. à tempore*,
 j, 18; ij, 18.
Differentia, ij,
 18.
Tutus quando. ij,
 15; vij, 65.
Nocet, j, 11, 19;
 ij, 10, vij,
 65, 67.
Pauco ubi opus,
 1, 10, 14, 18.
Multo ubi opus,
 14, 15, 18.
Copiosi sign. ij, 8,
 17; iv, 41,
 45; vij, 64.
Effectus, ij, 17.
*Consuetus præ-
 fertur*, ij, 38.
*Humidus, quibus
 utilis*, j, 16.
Citò nutriens, ij,
 18.
*Et lentè ubi ne-
 cesse*, ij, 7.
*Mutatio, ubi ju-
 vet*, ij, 45.
*Pravi progn. in
 purgante*, ij,
 36.
*Vid. plurā in Diæ-
 ta.*
**COLLIQUEFAC-
 TIO.**
Prog. in feb. ij, 28.
In gravidâ, v, 55.
Diæta, v, 64.
COLLUM. *Inversi*

- progn.* iv, 35;
viii, 58.
- COLOR.** *Variantis progn.* iv, 40; vii, 60.
- CONCEPTUS.**
Sign. v, 41, 51, 61.
Impedimentum, v, 46, 62.
Maris locus, v, 38, 48.
Sign. à colore, v, 42.
- CONCOCTA.**
Movenda, non *cruda*, j, 22.
Cruda, à bile atrá, vij, 68.
- CONSUETUDO.**
Vis. ij, 45.
Ejus habenda ratio, j, 16, 17; ij, 38, 49, 50.
- CONTRARIUM.**
Remedium est, ij, 17, 22, 48, 50; v, 19.
- Paulatim adhibendum*, ij, 51.
- CONVULSIO.**
Vid. Spasmus.
- COR.** *Vulnus, lethale*, vj, 18.
- CORPUS.**
Præparatio, vid. in Purgatione.
Statura, ij, 54.
- CRANIUM.** *Læsi symptomata*, vij, 24.
- CRISIS.**
Futuræ sign. à *nocte*, ij, 13.
Ab urinâ, iv, 71.
Critici dies, ij, 24; iv, 36, 61.
Progn. j, 12.
Non turbanda, j, 19, 20.
Imperfecta, ij, 12; iv, 51, 61, 62; viij, 4.
- CUCURBITULÆ.** *Ubi ne-*
G g g

cesse , v , 50.
CUTIS.

Progn. v , 61.
Raræ , v , 69.

D.

DEGLUTITIO.

Progn. iv , 34 ,
 35 ; vij , 58.

**DELIQUIUM
 ANIMI.**

Causa , calor fre-
quens , v , 16.
A tuberculo rup-
to , vij , 8.

Progn. ij , 41.
In fluore mulie-
bri malum , v ,
 56.

Ubi opus , j , 23.

DELIRIUM.

Φρενίτις.

Ætas , iij , 30.
Sign. ab urinâ , iv ,
 72.

Progn. in sene ,
 viij , 1.

Mala , ex perip-
neumonia , vij ,
 12.

Παραφροσύνη.

In cranio fracto.
 vij , 24.

Progn. bona , à
somno , ij , 2.

A risu , vj , 53.
Mala , in febr.
 iv , 50.

Cum studio , vj ,
 53.

Post potum , vij ,
 7.

In hæmorrhagiâ ,
 vij , 9.

In ileo , vij , 10.
In vigiliis , vij ,
 18.

In plagâ capitis.
 vij , 14.

Παρακωπή.

Ubi bona , vj ,
 26.

Μαρία.

Tempus , iij , 20 ,
 22.

I N D E X. 315

Ab ulcere, v, 65.

In melancholici, vj, 65.

A mammis, v, 40.

Progn. vij, 5.

Solutio, vj, 21.

Rabies, viij, 16.

DENTES.

Dentitionis, ætas et morbi. iij, 25.

Frigus nocet, v, 18.

Lentoris, in feb. progn. iv, 53.

DESTILLATIO.

vid. *Catarthus.*

DIÆTA.

Cautio, j, 9, 10, 16, iij, 3.

Pleniori ubi opus, j, 4, 5, 7, 10.

Tenui ubi opus, j, 7, 8, 10, 11.

Mutatio quos juvenet, ij, 45.

Erratum, j, 5.

Vid. plura, in Cibo.

DIAPHRAGMA.

Vid. septum transversum.

DIARRHŒA.

Vid. Alvi fluxus.

DOLOR.

Progn. si non sentiatur, ij, 6.

Si sint bini, ij, 46.

Calor lenit, v, 22.

Torpor solvit, v, 25.

Ab anginâ, v, 10.

In ulcere. v, 65.

Cautio, vj, 65.

Lumborum.

Tempus, iij, 23.

Progn. iv, 11.

Purgatio. iv, 20.

G g g ij

Ventris.

Progn. iv, 11;

vj, 7; vij, 22,
26.

Purgatio, iv, 20.

Viscerum. Progn.
iv, 66.

Articulorum.

Tempus, iij, 16,
20.

Ætas, iij, 31.

Post febres, longas, iv, 44;
vij, 63.

Causa, cibus copiosior, iv, 45;
vij, 64.

Frigida solvit,
v, 25.

DYSENTERIA.

Tempus, iij, 11,
12, 16, 22.

Ætas, iij, 30.

In ulcere, v, 65.

A diarrhæâ, vij,
75.

Progn. vj, 3, 43;
vij, 76.

Bona in lienosis,
vj, 48.

In insaniâ, vij,
5.

*Mala, à sincerâ
dejectione*, vij,
23.

*Lethalis ab atrâ
bile*, iv, 24.

Cum carunculis,
iv, 6.

DYSPNŒA. *Vid.*
Respiratio.

DYSURIA.

Tempus, iij, 5.

Ætas, iij, 31.

Cura, V. S. vj,
36; vij, 48.

Vinum, vij,
48.

E.

EBRIUS. *Progn.* v,
5.

ELLEBORUS.

*Præparatio ad El-
leborum*, iv, 13.

Quomodo juve-
tur, et sistatur,

iv, 14, 15.

Sanis periculo-
sus, vij, 76.

Progn. à spas-
mo, v, 1.

Vid. plura in pur-
gante.

EMPHYEMA.

Causa, à san-
guine effuso,
vj, 20.

A pleuritide, v,
8.

Quot diebus fiat,
vij, 38.

Progn. v, 15.

In curâ, vij, 34.

Cautio in curâ,
vj, 27.

EPILEPSIA.

Tempus, iij, 16,
20, 22.

Ætas, iij, 29.

Progn. v, 7.

Cura, 2, 45.

ERYSIPELAS.

Ab osse nudato,
vij, 19.

Progn. vj, 25

vij, 20.

Lethalis in gra-
vidæ utero, v,
43.

Cura non exul-
cerati, v, 23,

EVACUATIO.

Ubi opus, ij, 8;
iv, 41.

Cautio, j, 23;
ij, 29.

Quâ viâ, j, 21;
vij, 61.

Progn. j, 2, 23
25.

Extrema pericu-
losa, j, 3; ij,
51.

Cura, ij, 22.

EUNUCHUS.

Progn. vj, 28.

EXCRETIO, Vid.
Alvi excre-
menta.

EXSOLUTIO.

- Ἐκλέω, ij, 23,
41; vij, 8.
Διαλύω. iij, 17.
Καταλύω. ij.
Tempus, 43, 17,
112.
Causa, ij, 36;
vij, 8.
Progn. ij, 41,
43.
- EXPERIMENTUM.**
Periculosum, j,
1.
- EXTENUATUS.**
Progn. ij, 28,
35; iv, 23.
Vide plura in *Pingu*.
- EXTREMARUM**
frigus. Vid.
Frigus.
- F.**
- FAMES.**
Variat cum ætate, j, 13.
- Progn.* ij, 4.
Labor nocet, ij
16.
Siccatur corpus,
vij, 59.
Expletur difficilius quàm sitis, ij, 11.
Solvitur vino,
ij, 21.
Appetitus dejectus.
Progn. ij, 32.
Malus, vj, 3;
vij, 6.
Curat purgatio,
iv, 17.
Fastidium cibi. In muliere progn.
v, 61.
- FAUCES.**
Laborantium progn. ij, 15.
Asperarum tempus, iij, 5.
- FEBRIS.**
Ætas, iij, 25.
Progn. ij, 28;

- iij, 6.
A tempore, iij, 6.
A paroxysmo, iv, 30.
A somno, iv, 67.
A lachrymis, iv, 52; viij, 2.
A surditate, iv, 60.
A dentibus, iv, 53.
A collo, iv, 35; vij, 58.
A respiratione, iv, 68.
A suspiriis, vj, 54.
A suffocatione, iv, 34.
A vomitu sanguinis, vij, 73.
Ab hypochondriis, iv, 73.
Ab urinâ, iv, 69, 70; vij, 31.
Ab alvi excre-
mentis, iv, 21.
A dysenteriâ, vj, 3.
A calore, iv, 65.
A rigore, iv, 29.
A spasmo, ij, 26.
Ab bubone, v, 55.
A lassitudine, iv, 31.
Ab abscessu, iv, 51.
Ab extenuatione.
Ab hæmorrhagiâ, iv, 27.
A diebus criticis, iv, 36, 61.
Ab ictero, iv, 62, 64.
Sudoris in febribus tempus, iij, 6.
Diata, j, 16; v, 65.
Cibus cui noceat, vij, 65.
Nocet in paro-

- xysmo*, j, 19.
Cura febris, quæ non est à bile, vij, 42.
Morbum solvit, ij, 26; iv, 57; v, 5; vj, 40, 44, 51; vij, 52.
Acuta.
Tempus, iiij, 7; ij, 14.
Ætas, j, 14; iiij, 29.
Progn. iv, 66; viij, 10.
A sudore, iv, 37.
Diæta, v, 67.
Ardens.
Tempus, iiij, 21.
Ætas, iiij, 30.
Progn. iv, 54.
A tempore, viij, 1.
A tremore, vj, 26.
Cura. Rigor solvit, iv, 58.
- Delirium quando*, vj, 26.
Continua.
Tempus, iiij, 21.
Progn. à sudore, iv, 56.
A rigore, iv, 46.
A Sputo,
Urinâ et Excrementis, iv, 47; vij, 69.
A spasmo, iv, 49, vij, 73.
A delirio et Respiratione, iv, 50.
Leipyria.
Progn. iv, 48; vij, 73.
Ephemera.
Progn. iv, 55.
Quotidiana.
Sign. iv, 63.
Quæ sit difficilis, iv, 30.
Tertiana.
Tempus, iiij, 21.
Crisis, iv, 59.

I N D E X. 321

- | | |
|---|--|
| <p><i>Tertiana continua, periculosa; intermittens, non,</i>
iv, 43; viij, 62.</p> <p><i>Quartana.</i>
<i>Tempus,</i> iij, 21, 22.
<i>Sign. ab urinâ,</i>
iv, 74.
<i>Prog.</i> v, 70.
<i>A tempore,</i> ij, 25.
<i>Ab hæmorrhagia,</i> viij, 3.
<i>Symptomatica,</i> ij, 47; vj, 50.</p> <p><i>Vaga.</i>
<i>Tempus,</i> iij, 22.</p> <p><i>Longa.</i>
<i>Tempus,</i> iij, 16.
<i>Ætas,</i> iij, 27.
<i>Unde,</i> vj, 45; vij, 64.
<i>Longæ futuræ sign.</i>
<i>A sudore,</i> iv, 36.</p> | <p><i>Ab 'urinâ,</i> vij, 31.
<i>Ab abscessu,</i> iv, 51.
<i>Progn.</i> iv, 44; viij, 63.
<i>Diæta,</i> v, 64.
<i>Lenta.</i>
<i>Diæta,</i> v, 64.
<i>Cum lassitudine.</i>
<i>Quibusdam jam</i>
<i>Lymphatica diæta.</i>
<i>Sign. ab urinâ,</i>
iv, 31.
<i>Causa,</i> ij, 12.
<i>Unde,</i> iv, 36, 61.</p> <p>FERRUM. <i>In curâ prog.</i> viij, 6.</p> <p>FLUOR MULIEBRIS.
<i>Progn.</i> v, 56.</p> <p>FŒMINA. <i>Vid.</i>
<i>Mulier.</i></p> <p>FOTUS, SUFFITUS.
<i>Πυρία.</i>
<i>Menses movet,</i>
v, 28.</p> <p style="text-align: center;">H h</p> |
|---|--|

- Oculorum dolores solvit*, vj, 31.
Ejus noxa, v, 28.
Cepiæua.
Experimentum circa prægnationem, v, 59.
 FRIGUS.
Ætas, iij, 14.
Ubi juvet, v, 21, 23, 25.
Nocet, v, 18, 20, 22, 23, 24.
Morbi à frig. v, 17, 20, 24.
Particulare, quid notet, iv, 39.
Progn. mala, viij; ij, 12, 14.
Extremarum.
progn. vij, 1, 26.
In febre progn. iv, 48, 7, 69.
Mutati, progn. iv, 40; vij, 60.
Mortis imago, viij, 18.
Cura, calor, ij, 22; v, 19.
 FUROR. Vid. in Delirio Rabies.
 G.
 GEMELLI.
Alterutrius abortus, v, 38.
 GENA. *Tenuis particula dissecta non coalescit*, vj, 19.
 GENITALIUM.
putredines.
Tempus, iij, 21.
 GENUUM *gravitas.*
Purgatio curat, iv, 20.
 GIBBUS. *Progn.* vj, 46.
 GINGIVÆ. Pru-

- | | |
|--|--|
| <p>ritus. Vid.</p> <p>Pruritus.</p> <p>GRACILIS. Vid.</p> <p style="padding-left: 2em;">in Pingui.</p> <p>GRAVEDO.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Tempus</i>, iij, 13,</p> <p style="padding-left: 4em;">20, 23.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Progn. in sene</i>,</p> <p style="padding-left: 4em;">ij, 40.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Diurnæ tempus</i>,</p> <p style="padding-left: 4em;">ij, 14.</p> <p>GRAVIDA.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Sign.</i> v, 41, 51,</p> <p style="padding-left: 4em;">61.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Fœtus locus</i>, v,</p> <p style="padding-left: 4em;">38, 48.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Progn. à mam-</i></p> <p style="padding-left: 4em;"><i>mis</i>, v, 37,</p> <p style="padding-left: 4em;">38, 52, 53.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A menstruis</i>, v,</p> <p style="padding-left: 4em;">60.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A colore</i>, v. 42.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A V. S.</i> v, 31.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A diarrhœâ</i>, v,</p> <p style="padding-left: 4em;">34.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A tenesmo</i>, vij,</p> <p style="padding-left: 4em;">27.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Ab erysipellate</i>,</p> | <p style="padding-left: 2em;"><i>in utero</i>, v,</p> <p style="padding-left: 4em;">43.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A febre</i>, v, 55.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>A morbo acuto</i>,</p> <p style="padding-left: 4em;">v, 30.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Ab extenuatione</i>,</p> <p style="padding-left: 4em;">p. n. v, 44.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Purgatio</i>, iv, 1;</p> <p style="padding-left: 4em;">v, 29.</p> <p style="text-align: center;">H.</p> <p>HABITUS.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Progn.</i> ij, 34.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Athleticus</i>, i, 15.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Periculosus</i>, j, 3.</p> <p>HÆMOPTOE.</p> <p style="padding-left: 2em;">Vid. Sanguinis sputum.</p> <p>HÆMORRHA-</p> <p style="padding-left: 2em;">GIA. Vid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Sanguinis flu-</p> <p style="padding-left: 4em;">xus.</p> <p>HÆMORRHOI-</p> <p style="padding-left: 2em;">DES.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Ætas</i>, iij, 30.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Bona</i>, iv, 25;</p> <p style="padding-left: 4em;">vj, 11.</p> |
|--|--|

- Curæ cautio*, vj,
 21.
Solvunt deli-
rium, vj, 21.
 HEPAR.
Dolorem 'febris
solvit, vij, 52.
Inflammati symp-
tomata, sive
sign. v, 58.
Progn. vij, 17.
Suppurati cura
progn. vij, 45.
Hydropis, progn.
 vij, 55.
Vulnus, lethale,
 vj, 18.
 HERPES exedens.
Juvatur calore,
 v, 22.
 HORROR.
Tempus, iij, 5.
A sudore malus,
 vij, 4.
Vinum | solvit,
 vij, 56.
 HUMIDA NA-
 TURA, sive
 Corpus.
Ætas, iij, 31.
Sign. sudor, iv,
 56; vij, 61.
Progn. vj, 2.
Cura, fames, vij,
 59.
Evacuatio, vij,
 61.
Juvat siccitas,
 iij, 14.
Morbi, iij, 11.
 HUMORES ALII.
Progn. vij, 69,
 70.
 HYDROA. Tem-
 pus, iij, 21.
 HYDROPS.
Tempus, iij, 22.
Causa, ab hæ-
 morrhoidibus
curatis, vj,
 12.
A liene, vj, 43.
Ab hepatis hy-
drope, vij, 55.
A leucophlegma-
tiâ, vij, 74.

INDEX.

325

Progn à causis,
vj, 43; vij,
55.

A tempore, viij,
8.

Tussis desperata
est, vj, 35;
vij, 47.

Bona in delirio,
vij, 5.

Curæ cautio, vj,
27.

Solutio, vj, 14.

Ulcus difficile,
vj, 8.

Sicca, unde, iv,
11.

HYEMS. Vide.
Tempestas.

HYPERCATHARSIS.

Vid. Purgatio.

HYPOCHONDRIA.

Murmuris, progn.
iv, 73.

Diæta, v, 64.

Doloris progn. vj,
40.

Duritiei in Ictero
progn. iv, 64.

HYPOGASTRIUM.

Dolor, quid notet.
iv, 80; vij, 39.

HYSTERICA.

Sternutatio ju-
vat, v, 35.

I.

ICTERUS.

Non est flatu-
lentus, v, 72.

Prog. ab hepate,
vj, 42; iv, 64.

Progn. quando
noxius, iv, 62.

Utilis, iv, 64.

JEJUNIUM. Vid.
Fames.

IGNIS. *Curæ prog.*
viij, 6.

ILEUS.

Tempus, iiij, 22.

I i

- Progn. à stranguria*, vj, 44.
A variis, vij,
 10.
 IMBECILLITAS.
Sign. ij, 28.
 IMPETIGINES. L.
Tempus, iiij, 20.
 INFLAMMATIO. LABIA.
Recens, frigore Prog. viij, 13.
curatur, v, 23. *In febre continua*, vj, 49;
 INSANABILIA. viij, 73.
 viij, 6.
 INSTABILIA, quæ LAC.
 ij, 27, 52. *In menstruis deficientibus*, v,
 39.
 INTESTINUM. *In gravida*, prog.
Tenuis vulnus lethale, vj, 18. v, 52.
Non coalescit, Quibus conveniat, v, 64.
 vj, 24.
 Recti inflammata. LACRYMÆ.
 symptoma, v, 59. *Ætas*, iiij, 31.
 ISCHIADICUS *Progn. in morbis*.
 DOLOR. iv, 52; viij, 2.
Tempus, iiij, 22. LASSITUDO.
Progn. vj, 59, *Sign. ex urina*,
 60. v, 74.

I N D E X. 327

- | | |
|---|--|
| <p><i>Progn. in febre,</i>
iv, 31.
<i>Cura quies,</i> ij,
48.
<i>Spontaneæ.progn.</i>
ij, 5.
LATUS. <i>Dolor.</i>
Vid. <i>Dolor.</i>
LEPRA. <i>Tempus,</i>
iij, 20.
LETHALE VUL-
NUS. vid.
Vulnus.
LETHARGUS.
<i>Tempus,</i> iij, 23.
<i>Ætas,</i> iij, 30.
LEUCOPHLEG-
MATIA.
<i>Progn.</i> vij, 74.
<i>Solvitur diar-</i>
<i>rhæâ,</i> vij, 29.
LICHENES. <i>Tem-</i>
<i>pus,</i> iij, 20,
LIENOSUS.
<i>Tempus,</i> iij, 22.
<i>Progn.</i> vj, 43;
viij, 8.
<i>Dysenteriâ uti-</i></p> | <p><i>lis,</i> vj, 48.
LIENTERIA.
<i>Tempus,</i> iij, 22.
<i>Ætas,</i> iij, 30.
<i>Causa in Lie-</i>
<i>nosis,</i> vj, 43.
<i>A dysenteriâ,</i> vij,
76.
<i>Progn. à ructu,</i>
vj, 1.
<i>Cautio in pur-</i>
<i>gatione,</i> iv,
12.
LINGUA.
<i>Progn.</i> vij, 40;
viij, 9.
LOCUS. vid. <i>Re-</i>
<i>gio,</i>
LUMBUS. <i>Dolor.</i>
vid. <i>Dolor.</i>

<div style="text-align: center;">M.</div>
MAMMÆ.
<i>Progn. à lacte,</i>
v, 39.
<i>A sanguine,</i> v,
40.
Ii ij</p> |
|---|--|

- In gravidâ , ab
extenuatione ,
v , 37 , 53 .
A lacte , v . 52 .*
- MANIA.** Vid. in
Delirio.
- MELANCHOLIA.**
*Tempus , iij , 14 ,
20 , 22 .
Sign. vij , 40 .
Causa. Timor &
mæstitia , vj ,
23 .
Progn. vj , 11 ,
56 .
Purgatio , iv , 9 .*
- MENS.**
*Progn. ij , 23 ;
viii , 16 .
Laborantis sign.
ij , 6 .*
- MENSTRUUA.**
*Erumpentia , mor-
bos pueritiæ
solvunt , iij ,
28 .
Vomitum san-*
- guinis curant ,
v , 32 .*
- Sistuntur in gra-
vidâ , v , 61 .*
- Fluentium progn.
v , 60 .*
- Deficientia.
Sign. v , 39 .
Progn. v , 57 ;
vj , 29 .
Sanguis è nari-
bus juvat , v ,
23 .
Cura suffitus , v ,
38 .*
- Nimia.
Progn. v , 57 .
Cura , v , 50 .*
- Coloris vitiiati Cu-
ra , v , 36 .*
- MORBUS.**
*Coctio in morbo ,
1 , 2 .
Progn. i , 12 ;
ij , 33 , 34 , 35 ;
iij , 3 ; viij , 1 .*
- MORBI SEDES ,
sive Focus ,**

iv, 33, 38,
39.

MORBUS FUTU- RUS.

Tempus, iij, 1,
19.

Sign. ij, 5.

*Causa. Cibi co-
pia*, ij, 17.

MORBI PRINCI- PIUM.

Remissius est,
ij, 30.

*Ab atrabile, le-
thale*, iv, 22.

*Rarò purgan-
dum.* j, 22, 24.

*Si quid moven-
dum, statim
move*, ij, 29;
iv, 10.

Morbi Vigor.

Vehementior est,
ij, 30.

Diæta tenuis,
j, 8, 20.

Nil movendum,
ij, 29.

Morbi Finis.

Remissior est,
ij, 30.

MORBUS ACU- TUS.

Tempus, iij, 9.

Sign. j, 7.

Ab urinâ, vij,
32, 35.

*Prædictio incer-
ta*, ij, 28.

Progn. viij, 10.

*Mala, à suspi-
riis*, vj, 54.

*Frigore extrema-
rum*, vij, 1.

*Lethalis ab ex-
crementis*, iv,
23.

In gravidâ, v,
30.

Diæta, j, 4, 7.

Purgatio, j, 24;
iv, 10.

*Crisis in XIV
diebus*, ij, 23.

MORBUS LON- GUS.

Futuri sign. j, 12;
ij, 18; iv, 40;
vij, 60.

A sudore, iv, 36,
37, 56.

Ab urinâ, vij,
31, 34.

Ab abscessu, iv,
51.

Existentis progn.
ab appetitu
prostrato, vij,
6.

Ab excrementis,
iv, 23; viij, 6.

Ab alvi fluxu,
viij, 5.

Diæta tenuis pe-
riculosa, 1, 4.

MORBUS PERI-
CULOSUS.

In genere, ij, 34;
viij, 1, 8.

Remedium quale,
j, 6.

MORBUS.

Judicatu facilis,
j, 12; iij, 8.

Difficilis, j, 12;
iij, 8; iv, 29,
30.

MORBUS RECI-
DIVUS.

Causa, ij, 12.

Futuri sign. iv,
36, 61.

MORBUS INSA-
NABILIS.

viij, 6.

MORS.

Propinqua.

Sign. à variis.
vj, 38; viij,
11 ad 18.

Ab excrementis,
iv, 23.

In feb. contin.
iv, 49; vij,
73.

Certa, vj, 27.

Subita. Sign. ij,
41, 44.

MORTIFERUM,
lethale.

Θάσιμον, Θανατη-
δες. ij, 1, iij,

9; iv, 22, 24,
26, 34, 39,
37, 46, 48,
50; v, 1, 2,
11, 14, 22,
30, 43; vj,
18, 27, 52;
vij, 25, 72,
73, 79; viij,
11, 13, 14,
15, 16, 17,
18.

MOTUS, QUIES.

*Se invicem cu-
rant*, ij; 22,
48.

Effectus in purg.
ij, 14, 15.

Progn.

MULIER,

*Non est ambi-
dextra*, vij,
43.

*Fœcundæ tem-
peramentum*,
v, 62.

Sign. v, 59.

Infœcunda, crassa

p. n. v, 46.

MUTATIONES.

Subitarum progn.

ij, 51.

*Caloris, Coloris,
Tempestatis.*

Vid. Calor,

*Color, Tem-
pestas, &c.*

MUTUS.

Causa, vij, 58,

Progn. vj, 51.

Ab ebrietate, v,
5.

N.

NARES.

Progn. in feb.

contin. iv, 49;

vij, 73.

Humidarum ætas,
iij, 31.

Et Siccarum

progn. vj, 2.

*Hæmorrhagiæ in
quartanâ progn.*
viij, 3.

Pus, solvit dolorem Capitis, vj, 10.

Compressarum vis, v, 49.

NATURA.

Inimicum. Vid. Nimium.

Differentia, iij, 1.

Progn. ij, 34; vj, 2; viij, 1, 8.

NEPHRITIS.

Ætas, iij, 31.

Sign. ab urinâ, vij, 34, 35.

Progn. vj, 36.

In senibus, vj, 6.

Hæmorrhoides utiles, vj, 11.

NERVUS.

Calor juvat, v, 18.

Frequentior debilitat, v, 16.

Resectus non coa-

lescit, vj, 19; vij, 28.

NIGROR.

Causa frigus, v, 17, 20.

NIMIUM, Naturæ est inimicum.

In omnibus, ij, 51.

In cibo, j, 4, ij, 4, 17.

In somno, vig. ij, 3, vij, 71.

O.

OCCASIO. Celeris, j, 1.

OCULI.

Progn. iv, 52; viij, 2.

In febre continuâ, iv, 49; vij, 73.

In vomitu, vij, 3.

In somno, vj, 52.

- Ophthalmia.
Tempus, iij, 11,
 14, 16, 21.
Solutio, vj, 17.
 Doloris, *cura*,
 vj, 31; vij,
 46.
 Tarditatis *et*
 Morsus *tempus*,
 iij, 17.
 Hebetudinis.
 Glaucomatis *et*
 Humiditatis *atas*,
 iij, 31.
 Cæcitas, *in me-*
lancholicis,
 vj, 56.
 OFFICIUM Me-
 dici, ægri, &c.
 j, 1.
 OMENTUM.
 Crassius, *infæ-*
cundam facit,
 v, 46.
 Excidens *putres-*
cit, vj, 58.
 ORGASMUS.
 Vid. Turgens
 materia.
 OS.
 Ulcerationum,
tempus, iij,
 21.
Ætas, iij, 24.
 Amari, *cura*, iv,
 17.
 OSCITATIO.
Solvitur vino,
 vij, 56.
 OSSA.
Frigus ledit, v,
 18, 22.
 Laborantis *progn.*
 vij, 2.
 Nudati *progn.* vij,
 19.
Cura, calor ju-
vat, v, 22.
 Dissectum, *non*
coalescit, vj,
 19, vij, 28.
 Fracta calor ju-
vat, v, 22.
 Abscessus, *in ul-*
cere diuturno,
 vj, 45.
 Kk

- Asphacelo*, vij, 77.
P.
Παραγασί.
PAROXYSMUS.
Sign. j, 12; ij, 13.
Progn. iv, 30.
Cibus nocet, j, 11, 19.
PARTUS DIFFICILIS.
In tenuitate p. n. à feb. v, 55.
Sternutatio iuvat, v, 35.
PECTEN. Dolor quid notet, vij, 39.
PECTUS. Frigus lædit, v, 24.
Dolor. Vid. Dolor.
PERINÆUM.
Dolor quid notet, iv, 80; vij, 39.
PERIPNEUMONIA, vid. in Pleuritide.
PERVERSA, sive Distorta pars.
Progn. in feb. iv, 35, 49; vij, 58, 73.
PHLEBOTOMIA. Vid. V. S.
PHRENITIS. Vid. Delirium.
PHTHISIS.
Tempus, iij, 13, 16, 22.
Ætas, iij, 29; v, 9; viij, 7.
Causa, à pleuritide, v, 15.
A sputo sanguinis, vij, 15, 56, 78.
Puris, vij, 16, 78.
Ab hæmorrhoidibus, vj, 12.
Progn. lethalis.

- A tempore*, iij, 10.
A naturá, viij, 8.
A diarrhæâ, v, 12, 14, viij, 78.
A sputo, v, 11; viij, 16; 78.
Puris purgatio sursùm, viij, 78.
Diætâ, v, 64.
Purgatio, iv. 8.
 PINGUES, Crassi.
Progn. 11, 35.
Mortis, 11, 44.
Purgatio, ij, 35; iv, 7.
 Gracilis.
Purgatio, ij, 35; iv, 6.
Gravidæ; p. n. *progn.* v. 44.
 PITUITA.
Conclusæ solutio, viij, 74.
Fluxus à capite, viij, 30.
- PLEURITIS:
Tempus, iij, 23.
Ætas, iij, 30.
Qui minus obnoxii, vj, 33.
Progn. viij, 11.
A sputo, quoad *tempus*, j, 12; v, 8, 15.
Diarrhæa lethalis, vj, 16.
 Dolor. Vid. Dolor. Lateris.
 Peripneumonia.
Tempus, iij, 23.
Ætas, iij, 30.
Progn. viij, 12.
Mala à pleuritide, viij, 11.
Diarrhæa lethalis, vj, 16.
 PLUVIA, vid. in Tempestate.
 PODAGRA.
Tempus, iij, 56, 20; vj, 55.
Ætas, iij, 31.

- Causa*, vj, 29, 30.
Qui non obno-
xii, vj. 28,
 29, 40.
Progn. vj, 49.
Dolorem frigida
solvit, v, 25.
- POTUS.
Consuetus præ-
fertur, ij, 38.
Effectus, ij, 11.
Multi progn. vij,
 7.
- PRÆDICTIO.
Acutorum incer-
ta, ij, 19.
- PRÆGNANS.
Vid. Gravida.
- PRÆPUTIUM.
Resectum non
coalescit, vj,
 19.
- FRURITUS.
Gingivarum ætas,
 iij, 25.
Corporis totius
ætas, iij, 31.
- PURGATIO PER
 ALVUM.
Purgandum.
Vere, vj, 47.
Hyeme, iv, 4.
Non purgandum.
Æstate, 1, 7, 9.
Sub Cane, &c.
 iv, 5.
In vigore morbi,
 ij, 29.
In extenuatis, ij,
 35; iv, 6.
Qui purgandi, ij,
 8; iv, 18, 20;
 vij, 67.
Quæ purgandæ,
 v, 36.
Purgandi.
Difficulter vo-
mentes, iv, 7.
Melancholici, iv,
 9
Tabidi, iv, 8.
Oculis dolentes,
 vj, 31.
Debilis sudans,
 vij, 61.

- Gravida*, *quando*. iv, 1; v, 29.
- Purganda*.
Concocta. j, 22.
Turgentia, iv, 1, 10; v, 29.
- Quâ viâ purgandum*, j, 21; vij, 61.
- Præparatio ad purgationem*, ij, 9; iv, 13; vij, 70.
- Quantâ purgatione opus*, j, 23.
- Juvanda*, *aut Sistenda*, *quomodo*, iv, 14, 19.
- Finis sign.* iv, 12.
Progn. ab excrementis, iv, 21.
- A spasmò*, v, 1; vij, 25.
- Bonæ purgationis sign.* j, 2, 23, 25; iv, 2, 3.
- Noxia*.
In genere, j, 2, 25; iv, 2, 3.
- Sub Cane*, &c. iv, 5.
- In sanis*, ij, 36, 37; iv, 16.
- In Crisi*, j, 20.
- Spontaneæ progn.* j, 1, 2.
- Hypercatharsis*.
Progn. v, 4; vij, 41.
- PUS.
Generationis sign. ij, 47.
- Calor juvat*, v, 22.
- Frigus impedit*, v, 20.
- Progn.* vj, 41; vij, 8.
- Boni nota*, vij, 44, 45.
- Curæ cautio*, vj, 27.
- Puris sputum.*
L I

- Causa à sanguinis sputo*, vij, 15, 18.
- A vomitu sanguinis*, vij, 78.
- E capite effluens, ejus dolorem solvit*, vi, 10.
- In ventre, Causa.* vij, 20; vij, 22.
- In urina, quid notet*, iv, 75, 81.
- In utero, Cura*, v, 47.
- PUSTULÆ.
- Ulcerosæ. Vere fiunt*, iij, 20.
- Datae, quales sint*, vj, 9.
- PUTREDINES.
- Tempus*, iij, 16, 21.
- Q.
- QUIES. Vid. in Motu.
- R.
- RABIES. Vid. in Delirio.
- RAUCEDO.
- Tempus*, iij, 13, 20, 23.
- Progn. in sene*, ij, 40.
- RATIO. Vid. Mens.
- Rationi fidendum.* ij, 27, 52.
- RECIDIVUS MORBUS.
- Vid. Morbus recidivus.
- REFECTIO. Vid. Cibus.
- REGIO.
- Cautio in Dieta*, j, 17.

- In Medicamentis*, j, 2.
Mutatio, quos juvet, ij, 45.
REMEDIIUM.
Quali opus, j, 6.
Gradus, vij, 6.
RENES.
Sanguinis profluentis sign. iv, 57, 78.
Suppuratorum symptomata, v, 58.
Ulceris, sign. iv, 75.
Pili, et Carunculæ, iv, 76.
REPLETIO.
Differentia, ij, 11.
Extrema periculosa, j, 3, 4; ij, 4, 17, 51; vj, 39.
Cura, ij, 22.
RESPIRATIO, difficilis. *Dyspnoea.*
Ætas, ij, 31.
Progn. in febre, iv, 68.
In feb. contin. iv, 50.
RIGOR.
Causa, frigus, v, 17, 20.
Focus, v, 62.
Signum est quotidianæ feb. iv, 63.
Solvit feb. ardentem, iv, 58.
Progn. in febre, iv, 29, 46.
Malus à multo potu, vij, 7.
Cura, calor mitigat, v, 22.
RUCTUS ACIDUS.
Progn. vj, 33.
Bonus in lienteria quando, vj, 1.
 Ll ij

S.

SANGUIS.

Collecti in mam-
mas progn. v,
40.

Fluxus tempus, iij
20.

Causa, calor, v,
16.

Frigus, v, 23.

Progn. in feb. iv,
27.

A convulsione,
&c. v, 3; vij,
9.

Malus in ulce-
re, viij, 21.

Dieta, v, 64.

Cura, frigus, v,
19, 23.

E capite progn.
vj, 10.

Per nares.

Ætas, iij, 27.

Progn. in quar-
tana, viij, 3.

Bonus in mens-
truis deficien-
tibus, v, 33.

Solvit surdita-
tem, vj, 60.

Capitis dolorem,
vj, 10.

Abscessum, iv,
74.

In ventrem progn.
vj, 20.

Sputum.

Ætas, iij, 29.

Progn. vij, 15,
78.

In feb. contin.
iv, 27.

Spumans, è pul-
mone, v, 13.

Vomitum.

Progn. Bonus si-
ne febre, vij,
37.

Malus, ij, 25.

Cum febre, vij,
37.

Tabes sequitur,
vij, 78.

- Cum urina, *quid* in Tempesta-
nocet, iv, 78, te.
 80, 81; vij, **SIGNA.** Vid. Af-
 39. fectus, *cujus*
 Per alvum. sunt.
Niger bonus, iv, **SINGULTUS.**
 25. *Causa*, vj, 39.
Malus, iv, 21, *Ab hepate in-*
 22. *flammato*, v,
SANITAS. *Sign.* 58.
 vj, 2. *Progn. malus in*
SATIETAS. *Quæ* *hæmorrhagia*,
mala, ij, 4. v, 3.
 Vid. Repletio. *In hypercathar-*
SATYRIASIS. *si*, v, 4; vij,
Ætas, iij, 26. 41.
SECUNDÆ. *A vomitu*, vij,
Sternutatio ex- 3.
pellat, v, 49. *Ab Ilco*, vij,
SEMEN. *Progn.* iv, 10.
 2. *Ab hepate in-*
SENEX. Vid. in *flammato*, vij,
Ætate. 17.
SEPTUM TRAN- *Cura, sternuta-*
SVERSUM. *tio*, vj, 13.
Vulnus lethale, **SITIS.**
 vj, 18. *Non magna ubi.*
SICCITAS. Vid. *Progn. noctur-*

- na*, v, 27.
In purgante, iv, 19.
In feb. Leipyria, iv, 48; vij, 72.
Diæta. Lac nocet, v, 64.
Expletur citius, quàm fames, ij, 11.
 SOMNUS VIGILÆ.
Mali, ij, 3; vij, 71.
 Somnus.
Progn. ij, 1.
In febre, iv, 62.
In vertigine, viij, 15.
Bonus, in delirio, ij, 1.
Post sitim, v, 27.
Effectus, iv, 14, 15.
Longi tempus, j, 15.
Vigiliæ.
Ætas, iij, 24, 31.
Prognosis mala, vij.
 SPASMUS, Convulsio.
Ætas, iij, 25.
Causa, Frigus, v, 17, 20.
Repletio, aut Inanitio, vj, 39.
In melancholicis, vj, 56.
In ulcere, quando, v, 65.
Futuri in febre sign. iv, 68.
Progn. in febr. ij, 26.
Malus in febre, iv, 66, 67.
In vigiliis, vij, 18.
In ardore, vij, 13.
In hæmorrhagia,

- v, 3, vij, 9.
In Ileo, vij,
 10.
Ab Elleboro, iv,
 16.
Ab hypercathar-
si, v, 4.
In fluore mulie-
bri, v, 56.
Lethalis. In fe-
bre cont. iv,
 49.
A purgante, vij,
 25.
Ab Elleboro, v,
 1.
In ebrio, v, 5.
In teste dextro,
 viij, 11.
In vulnere, v, 2.
Cura. Calor mi-
tigat, v, 22.
Frigus levat, v,
 25.
Solvitur à feb.
 iv, 57.
A quartana, v,
 70.
- Tetanus.*
Causa, frigus,
 v, 17, 20.
In ulcere quan-
do, v, 65.
Progn. v, 6.
Malus in ardore,
 vij, 13.
Cura, frigida, v,
 21.
Calor mitigat, v,
 22.
Solvitur à febr.
 iv, 57.
- SPIRITUS. Vid.
 Respiratio.
- SPUMA.
Oris, progn. ij,
 43.
In sputo sangui-
nis, unde, v,
 13.
In alvi excremen-
tis, unde, vij,
 30.
Bullæ in urina,
quid notent,
 vij, 34.

SPUTUM.

*Progn. in feb.**contin. iv, 47;**vij, 69.**In pleuritide, j,**12.**In phthisi, v,**11; vij, 78.*

Sanguinis. Vid.

Sanguinis spu-
tum.Puris. Vid. Puris
sputum.

STATURA COR-

PORIS. ij,

54.

STERILIS.

*Mas, v, 61.**Mulier. Vid. Mu-*
lier.

STERNUTA-

TIO.

*Causa, vij, 1.**Solvit singul-*
*tum, vij, 1.**Juvat partum dif-*
*ficilem, v, 35.**Expellit secun-**das, v, 49.*

STRANGULA-

TIO.

Progn. ij, 43.

STRANGURIA.

*Tempus, iij, 16,**20, 22.**Ætas, iij, 31.**Symptomatica, iv,**80; v, 58;**vij, 39.**Progn. ab Ileo,**vj, 44.**Cura. V. S. et**vinum, vij,**48.*STRUMA. *Ætas,**ij, 26.*

STUPOR.

Malus in vulne-
*re Capitis, vij,**14.*

SUDOR.

In febre, tempus,
*ij, 6.**In morte, cui, v,**71.**Particularis, mor-*

- bi sedem no-* Hydroa, *Tempus,*
tat, iv, 38. *iiij, 2.*
Progn. j, 12 ; SUFFITUS. Vid.
vij, 79. Fetus.
In febre, iv, 36. SUFFOCATIO.
Malus in feb. *Progn. in febre,*
contin. iv, 56. *iv, 34.*
In crisi, qualis, SUPERCILIUM.
vij, 4. Distorti, *in feb.*
Horror malus, *contin. progn.*
vij, 4. *iv, 49 ; vij,*
Calidus, quid no- 73.
tet, iv, 42. SURDITAS.
Frigidus, malus, *In febre contin.*
iv, 42 ; viij, *lethalis, iv,*
4. *49 ; vij, 73.*
Progn. in feb. *Solutio per al-*
iv, 37. *vum, iv, 28.*
Multus et Conti- *In febre, iv, 60.*
nuus, quid SUSPIRIA.
notet, iv, 42 ; *In acutis, cum*
vij, 61. *feb. mala, vj,*
A somno, unde, 54.
iv, 41. Vid. Respiratio.
Ubi malus, viij,
4. T.
Cura, iv, 41 ; TABES. Vid.
vij, 61. M m

- Phthisis. iiij, 18.
TEMPESTAS *Diæta*, j, 15,
ANNI. 18.
Concedendum *Medicina facien-*
da, vj, 47;
ei, j, 2, 17. vij, 53.
Morbos indicat, *Morbi*, iiij, 20;
vj, 55.
j, 12. *Progn.* iiij, 11,
12.
In alia alii mor-
bi fiunt, iiij, *Æstas.*
Senibus utilis,
iiij, 18.
Diæta, j, 18.
Purgatio, iv, 4,
6.
Morbi, ij, 25;
iiij, 6, 21.
Progn. iiij, 2, 6,
13, 14; viij, 8.
Autumnus.
Ætas media va-
let, iiij, 18.
Diæta, j, 18.
Periculosus est,
iiij, 9.
Malus tabi, iiij,
10.
Progn. ij, 34;
viij, 8.
Mutatio.
Morbi causa, iiij,
i, 4, 8.
Quos juret, ij,
45.
Siccitas.
Salubris, iiij, 11.
Morbi, iiij, 7,
16.
Pluvia.
Minus salubris,
iiij, 15.
Morbi, iiij, 16.
Ver.
Salubris, iiij, 9.
Pueris conducit,

- Morbi* , ij , 25 ;
 ijj , 4 , 22 ; vj ,
 55.
Progn. iij , 4 , 13 ,
 14.
Hyems.
 Mediæ ætati
 commoda , iij ,
 18.
Diæta , j , 15 , 18.
Purgatio , iv , 4 ,
 7 , 9 , 12.
Morb. ij , 25 ; iij ,
 23.
Progn. iij , 2 , ij ,
 12 , viij , 8.
TENESMUS.
 Progn. in gra-
 vida , vij , 27.
TERROR.
 Ætas , iij , 24.
 Malus in febre ,
 iv , 67.
TESTES.
 Progn. à convul-
 sione , vij , 11.
TETANUS. *Vid.*
 in Spasmo.
- TIMOR.** *Longi*
 Effectus , vj ,
 23.
TONSILLÆ.
 Inflammationis
 ætas , iij , 26.
TORPOR.
 Effectus , v , 25.
TRANSPIRATIO
 Progn. vij , 79 ;
 viij , 18.
 In Viro , v , 63.
TREMOR.
 Solutio in feb.
 ardente , vj ,
 26.
TRISTITIA. *Lon-*
 gæ
 Effectus , vj , 23.
TUBERCULA ,
 τύματα.
 Tempus , iij , 20.
 Ætas , iij , 26.
 Progn. à ruptio-
 ne , vij , 8.
 Curæ Cautio , ij ,
 15.
 In articulis in feb.

- longis*, iv, 44;
 vij, 63.
Causa, *Cibi copia*. iv, 45;
 vij, 64.
Cura, *frigida levat*, v, 25.
 In urethra.
Solutio, iv, 82;
 vij, 57.
 Εξανθήματα, vj,
 9.
TUMOR.
Progn. mollis bonus, v, 67.
Evanescentis progn. v, 65.
 In ulcere *progn.*
 v, 66.
TURGENS *materia ubique et semper educenda*, j, 22;
 iv, 1, 10; v,
 29.
TUSSIS.
Tempus, iiij, 5,
 13, 20, 23.
- Ætas*, iiij, 24,
 31.
Causa, *frigus*,
 v, 24.
Progn. in hydrope desperata,
 vi, 35; vij,
 47.
Siccæ in feb. ardente progn.
 iv, 54.
Gibbi à tusse,
progn. vj, 46.
 V.
VARICES.
Calvis non fiunt,
 vj, 34.
Solvunt delirium, vj, 21.
VENÆ SECTIO.
Vere instituenta, vj, 47;
 vij, 53.
Quanta opus, j,
 23.
Juvat in Capi-

I N D E X. 349

- | | |
|--|--|
| <p><i>tis dolore</i>, v, 68.</p> <p><i>Solvit oculorum dolorem</i>, vj, 31; vij, 46.</p> <p><i>Dysuriam</i>, v, 36.</p> <p><i>Stranguriam</i>, vij, 48.</p> <p><i>Fluxiones</i>, vj, 22.</p> <p><i>Nocet gravidæ</i>, v, 31.</p> <p>VENTRICULUS.</p> <p><i>Æstus et Dolor</i>, in feb. malus, iv, 65.</p> <p><i>Cura</i>, purgatio, iv, 17.</p> <p><i>Vulnus</i>, lethale, vj, 18.</p> <p>VENTUS.</p> <p><i>Auster. Morbi</i>, iiij, 5, 17.</p> <p><i>Progn.</i> iiij, 12, 13.</p> <p><i>Boreas. Morbi</i>, iiij, 5, 17.</p> | <p><i>Progn.</i> ij, 11, 12, 13, 14.</p> <p>VENTRIS. Mutatio. Vid. Alvi Mutatio.</p> <p><i>Partes</i>, vid. Pinguis.</p> <p><i>Dolor.</i> Vid. Dolor.</p> <p><i>Calor.</i> Vid. Calor.</p> <p><i>Ventris turbatio.</i></p> <p><i>Solvit surditatem</i>, iv, 60.</p> <p><i>Spontanæ progn.</i> j, 2.</p> <p>VER. Vid. in Tempestate.</p> <p>VERATRUM.</p> <p><i>Vid. Elleborus.</i></p> <p>VERMES et</p> <p>VERRUCÆ. <i>Ætas</i>, iiij, 26.</p> <p>VERTICULUM.</p> <p><i>Luxationis ætas</i>, iiij, 26.</p> <p>VERTIGO.</p> <p style="text-align: center;">N n</p> |
|--|--|

- Tempus*, iiij, 17, 23.
Ætas, iiij, 31.
Tenebricosa, mala, viij, 15.
Cura, purgatio, iv, 17.
VESICA.
Laborantis, sign. iv, 80; viij, 39.
Progn. in senē, vj, 6.
Calor juvat, v, 22.
Calculi, ætas, iiij, 26.
Sign. iv, 79.
Vulnus, lethale, vj, 18.
Ulceris, sign. iv, 75, 81.
Scabiei, sign. iv, 77.
VIGILIÆ. Vid. in Somno.
VIGOR. Vid. Morbi Vigor.
VINUM *Curat.*
- Θαριξίς*, *fames*, ij, 21.
Ἀκρίτων, *oculorum dolores*, vj, 31; viij, 46.
Ἰσχυρᾶτες, *affectus varios*, viij, 56.
VISCERA *Dolor.*
Vid. Dolor.
VISUS.
Progn. in febre contin. iv, 49; viij, 73.
Hebetis, tempus, iiij, 5.
Ætas, iiij, 31.
VITA.
A calore est, viij, 18.
Brevis est, j, 1.
ULCUS.
Tempus, iiij, 10, 21.
Progn. vj, 4.
A pulsu, viij, 21.
A tumore, v, 65.

I N D E X. 351

- | | |
|--|---|
| <p><i>In hydropē, vj, S.</i>
 <i>Juvat calor, v,</i>
 22.
 <i>Nocet frigus, v,</i>
 20, 22.
 <i>Diurni, progn.</i>
 vj, 45.
 <i>Opis. Vid. oris</i>
 <i>ulceratio.</i>
 UMBILICUS.
 <i>Inflammationis</i>
 <i>ætas, iij, 24.</i>
 <i>Doloris progn.</i>
 iv, 11.
 UNGUES.
 <i>Nigrorum progn.</i>
 viiij, 12.
 VOMITUS.
 <i>Tempus, iij, 21.</i>
 <i>Ætas, iij, 24.</i>
 <i>A tuberculo rup-</i>
 <i>to, vij, 8.</i>
 <i>Ubi opus, iv,</i>
 17, 18; vij, 61.
 <i>Ætate convenit,</i>
 iv, 4, 6.
 <i>Præparatio, vij,</i>
 70.</p> | <p><i>Progn. j, 23;</i>
 vij, 3.
 <i>Malus in Ileo,</i>
 vij, 10.
 <i>In Lienteria hye-</i>
 <i>me, iv, 12.</i>
 <i>Spontaneus, prog.</i>
 j, 2.
 <i>Solvit diarrhæ-</i>
 <i>am, vj, 15.</i>
 <i>Sanguinis.</i>
 <i>Progn. vij, 78.</i>
 <i>A febr. vij, 37.</i>
 <i>Malus, iv, 25.</i>
 <i>Cura, vij, 37.</i>
 <i>Solutio, per</i>
 <i>menstrua, v, 32.</i>
 <i>Bilis in Cerebro di-</i>
 <i>viso, vj, 50.</i>
 <i>Ab atrabile, le-</i>
 <i>thalis, iv, 22.</i>
 URETHRA.
 <i>Tuberculi, solu-</i>
 <i>tio, iv, 82;</i>
 vij, 57.
 URINA.
 <i>Alba, pellucida,</i>
 <i>mala, iv, 72.</i></p> |
|--|---|

- Alba, multa crassa, *abscessu liberat*, iv, 74.
- Crassæ, grumossæ, paucæ, *progn.* iv, 69.
- Multa, *noctu quid notet*, iv, 83.
- Solvit morbum*, vj, 54; vij, 73.
- Nubeculæ, *progn.* iv, 71.
- Sedimentum. *Progn.* iv, 69.
- Biliosum*, *quid notet*, vij, 32.
- Divulsa, *quid notet*, vij, 33.
- Turbata, *quid notet*, iv, 70.
- Fœtida, *quid notet*, iv, 81.
- Bullarum, *progn.* vij, 34.
- Pinguedo, *quid notet*, vij, 35.
- Sanguis, *ex renibus aut vesicâ*, iv, 75.
- Ex renibus*, iv, 78.
- Ex vesicâ*, iv, 80, 81; vij, 39.
- Sanguis et grumi, *quid notent*, iv, 80; vij, 39.
- Grumosæ, *progn.* iv, 69.
- Pus, *unde*, iv, 75, 81.
- Carunculæ, *et*
- Pili, *unde*, iv, 7.
- Farinam crassiorem *referentis progn. in feb.* vij, 31.
- Furfures, *quid notent*, iv, 77.
- Squammæ, *quid notent*, iv, 81.
- Arena, *calculi sign.* iv, 79.
- Progn. in genere*, j, 12; vij, 66, 79.
- In feb. contin.* iv

I N D E X. 353

47; vij, 69.	<i>vida lethale</i> ,
UTERUS.	v, 43.
Temperies, <i>moderata</i> , <i>fœcunditatis causa</i> ,	VULNUS.
v, 62.	<i>Progn. à tumore</i> ,
<i>Calor juvat</i> , v, 22.	v, 65.
Os <i>durum</i> , <i>clausum</i> , v, 54.	<i>Spasmus lethalis</i> , v, 2.
<i>Ingravida</i> , <i>clausum est</i> , v. 51.	<i>Atra bilis per alvum lethalis</i> ,
Inflammati , <i>sign.</i> v, 58.	iv, 23.
Suppuratus , <i>Cura</i> , v, 47.	Non coalescens ,
Erysipelas <i>in gra-</i>	vj, 19 , 24 ,
	vij, 28.
	Lethale , vj, 18.
	Cerebri. Vid. Cerebrum.

Finis Indicis.

È Typographiâ MONSIEUR.

O o

